



# Plasticité musculaire au stress mécanique: du fascicule à la performance sportive

Gaël Guilhem

## ► To cite this version:

Gaël Guilhem. Plasticité musculaire au stress mécanique: du fascicule à la performance sportive. Physiologie du sport. Université Paris Descartes (Paris 5), 2017. tel-03176311

HAL Id: tel-03176311

<https://insep.hal.science//tel-03176311>

Submitted on 24 Mar 2021

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

INSTITUT NATIONAL DU SPORT, DE L'EXPERTISE ET DE LA PERFORMANCE

UNIVERSITE PARIS DESCARTES

Dossier de candidature © l'Habilitation © diriger des Recherches

2<sup>e</sup> partie

**PLASTICITÉ MUSCULAIRE AU STRESS MÉCANIQUE :  
DU FASCICULE À LA PERFORMANCE SPORTIVE**

Pr<sup>o</sup>sent<sup>o</sup>e par Ga<sup>3</sup>l GUILHEM le 22 septembre 2017, devant le jury composé de:

**Guillaume Millet**, Professeur, Université de Calgary

**Truls Rasstad**, Professeur, Ecole Norvégienne des Sciences du Sport

**Pierre Portero**, Professeur, Université Paris-Est Créteil

**Arnaud Guével**, Professeur, Université de Nantes

**François Hug**, Professeur, Université de Nantes

**Christine Hanon**, Responsable Recherche, Fédération Française d'Athlétisme

Laboratoire Sport, Expertise et Performance

équipe d'accueil 7370

École Doctorale 566, Sciences du Sport, de la Motricité et du Mouvement Humain

INSTITUT NATIONAL DU SPORT, DE L'EXPERTISE ET DE LA PERFORMANCE  
11, AVENUE DU TREMBLAY - 75 012 PARIS / TÉL. +(0)33 1 41 74 41 00 - FAX. +(0)33 1 41 74 41 00  
[www.insep.fr](http://www.insep.fr)



## Avant-propos

J'adresse mes remerciements sincères et respectueux aux membres du jury messieurs les Professeurs Guillaume MILLET, Truls RAASTAD, Pierre PORTERO, Arnaud GUÉVEL, François HUG et madame Christine HANON qui me font l'honneur d'i valuer ce travail.

La recherche est un sport d'i quipe sans limite de joueurs. Ce m°moire est donc aussi celui de toutes celles et ceux qui m'accompagnent de pr+s ou de loin au quotidien. Je tiens à leur témoigner ma profonde reconnaissance et à les remercier chaleureusement pour leur contribution, leur soutien et leur soutien. Mes remerciements s'adressent tout particulièrement :

à François HUG. Marcher dans tes pas est à la fois une source d'inspiration inextinguible (scrabble !) et un défi chaque jour plus difficile (impossible ?) à relever. Merci de m'avoir donné l'envie de chercher et appris à ne pas être seul de trouver. Ton amitié m'est précieuse. à tout de suite pour soutenir ta dernière blague sur le zinc.

à Arnaud GUÉVEL. Pour avoir veillé sur moi toutes ces années, pour tes conseils clairs, ta droiture et ta franchise. Notre groupe d'amis, chercheurs à nos heures perdues, te doit beaucoup. Vivement de t'entendre parler de tes projets futurs à sur le zinc évidemment.

à Joseph (Guiseppe, sans faute de frappe) RABITA. Pour le cadeau que tu m'as fait en acceptant de me prendre sous ton aile. Pour notre complicité. Pour m'avoir levé dans le vaisseau amiral à grandes envolées de sagesse planeuse et rigolarde. à tout de suite autour du zinc pour soutenir où il y a une boîte. Je te garde près de moi.

à Antoine COUTURIER, qui nous rappelle chaque jour ce qu'il expert dans son domaine à veut dire et nous renvoie ainsi à nos limites et au travail qu'il reste à accomplir. Merci de nous rappeler aussi quand il est temps de rejoindre le zinc. C'est plus à que jidis.

à Christine HANON. Pour m'avoir fait confiance et pour m'apporter tous les jours ton expérience. Pour les valeurs communes que nous cultivons. J'espère avoir un jour ta capacité à faire tant de choses différentes avec autant de succès. Je te souhaite le meilleur dans les années à venir, si possible pas trop loin de nous et du zinc.

à mes plus proches collaborateurs et amis Sylvain DOREL, Antoine NORDEZ, Lilian LACOURPAILLE et Marc JUBEAU pour les projets que nous avons imaginés ensemble et ceux à venir. C'est une chance de vivre de telles collaborations. Je suis très heureux que vous ne vous lassiez pas car ce n'est que le début ! Essayons de ne pas oublier l'tape du zinc lors de nos rencontres.

à mes ainés et mentors Jacques DUCHATEAU et Nicola MAFFIULETTI pour leur soutien et leur bienveillance. Chacun de nos évolutions me fait grandir. C'est un honneur de pouvoir travailler avec vous.

Aux étudiants qui m'ont donné la chance d'apprendre et grandir à leurs côtés à Nantes et à Paris. Sans vous je n'aurais eu que peu de choses à écrire dans les pages qui suivent. Un merci très appuyé à Caroline GIROUX, Robin HAGER, Enzo HOLLVILLE et Simon AVRILLON. Je suis verni depuis longtemps à sur vous. Je vous souhaite (et prédis) un bel avenir. Merci aussi de votre compréhension quand je ne suis pas loin d'avoir une bonne excuse pour ne pas vous retrouver au zinc de la TAL.

Aux Nantais Valentin DOGUET, Hugo HAURAIX et Mathieu PLAUTARD pour avoir manifesté votre intérêt pour la Terre de Champion(ne)s. Il était temps que le MIP réalise où se trouve l'excellence ! Merci pour votre bonne humeur communicative et pour avoir ringardisé notre génération de thésards à tous les niveaux. Bon vent à vous et à l'ensemble du bureau au fond du couloir à gauche avant l'ascenseur. Je ne vous dis pas RDV au zinc à

Aux collègues du laboratoire Sport, Expertise et Performance passés et actuels qui ont accepté de me donner du temps pour rédiger ce m°moire. Je suis honoré de construire avec vous ce projet d'équipe.

à Audrey PARUSIN pour ses encouragements dans ma démarche de soutenir cette HDR et pour son soutien envers l'action conduite avec notre équipe de recherche au service de la performance.

à Vihra. Pour ton efficacité discrète et ta disponibilité sans lesquelles tout aurait été plus compliqué.

à toutes celles qui font tourner la boutique en assumant des importantes responsabilités administratives. Je tiens ici à exprimer ma sincère reconnaissance à Françoise, Isabelle, Alexia et Vanessa pour la qualité et l'efficacité de leur travail, reconnues de tous.

à tous celles et ceux que j'ai eu plaisir à croiser, en particulier les étudiant(e)s du SEP, et qui ont eu la chance de ne pas travailler avec moi.

Aux entraîneurs, préparateurs physiques, directeurs techniques nationaux, staffs médico-chirurgicaux qui m'ont apporté leur confiance et avec qui j'ai eu l'immense chance de collaborer sur les différents sites d'entraînement, de stages et au plateau technique. Je tiens à saluer et remercier particulièrement Myriam BAVEREL, Mehdi BEN SAFI, Bruno GAJER, Guy ONTANON, Renaud LONGUEVRE, Stéphane MARCELLIN, Cyril TAHON et tous ces technicien(ne)s exceptionnel(le)s qui ont partagé avec moi cette envie d'avancer ensemble. Merci pour votre amitié.

Aux sportifs qui nous ont fait confiance, avec une mention spéciale à Ladj, Kaf, Jimmy, Abou, Elo, Flo, Anne-Caro, Muriel, Sandra, Phara, Pierre-Ambroise, Arnaud, Guy-Elphège, Yas, Vinciane, Maeva, Maeiva, Stéphanie, Alison, Haby, Marion, Cécilia, Nana, Floria, Pascal, Vanessa, Astrid, Erwann, Marcel, Kevin, Môbar, Guillaume, Brigitte, Pierre, Harold, Benjamin, Wilhem, et toutes celles et ceux avec qui j'ai partagé des moments rares. Merci à vous de porter haut les couleurs du sport français et de nous faire rire.

Aux fédérations sportives (Athlétisme, Escrime, Taekwondo et Disciplines Associées, Cyclisme, Natation, Tennis, Basketball, Handball) et à nos partenaires industriels (Actech, Eraclis-Technology, Natural Grass) qui ont largement contribué à laboutissement de ces travaux.

à lensemble des collègues de l'INSEP des différents départements, missions, unités, cellules, directions et autres postes. Les projets construits entre nos entités ont toujours été très enrichissants. Merci de faire de l'INSEP ce qu'il est. Des remerciements spéciaux à Alain FREY et toute son équipe. Longue vie à notre collaboration.

à mes frères de vestiaire et de bus que j'ai quittés cette saison pour pouvoir relever d'autres défis. Vous me manquez. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté.

à ma famille et mes amis qui j'espérai pigeront plus facilement le titre de ce mémoire que celui de ma thèse.

à mes parents et mon frère pour leur soutien infaillible depuis toujours.

Et par-dessus tout : à Romane, pour avoir choisi de concentrer ses nuits difficiles sur ses premiers mois et à Cécile pour avoir embrassé une carrière exigeante. Vos emplois du temps et votre présence ont largement contribué à accélérer la rédaction de ce manuscrit. Merci de me rappeler chaque jour ce qui compte. Vous êtes ma fierté et mon bonheur.

## Table des matières

Présentation du mémoire .....	7
Chapitre 1 – Titres et travaux .....	13
1.1 Curriculum Vitae.....	14
1.2 Activit° de recherche.....	15
1.3 Activit° p°dagogique .....	24
1.4 Responsabilit°s administratives .....	25
1.5 Contribution © l'accompagnement scientifique de la performance .....	25
Chapitre 2 – Synthèse des travaux de recherche.....	27
2.1 Introduction .....	28
2.2 Comportement du système neuromusculaire en contraction excentrique.....	30
2.2.1 état de la question .....	30
2.2.2 Effet de la tâche sur le comportement du muscle en contraction excentrique .....	35
2.2.3 Influence des interactions muscle-tendon sur les dommages musculaires .....	36
2.2.4 Modulations de la commande nerveuse au cours d'un exercice traumatisant.....	40
2.3 Plasticit° du système neuromusculaire © l'exercice excentrique.....	44
2.3.1 état de la question .....	44
2.3.2 Quantification des dommages musculaires induits par l'exercice excentrique .....	46
2.3.3 Effet de l'chauffement sur la raideur musculaire.....	51
2.3.4 Impact du froid sur la fonction musculaire .....	52
2.3.5 Adaptations neuromusculaires induites par l'entraînement excentrique .....	55
2.4 Relations entre propriét°s musculaires et performance © haute-intensit° .....	57
2.4.1 état de la question .....	57
2.4.2 Validit° de méthodes d'évaluation innovantes des capacités musculaires .....	58
2.4.3 Facteurs musculaires influençant la performance explosive.....	59
2.5 Analyse des déterminants musculaires de la performance sportive de haut-niveau.....	62
2.5.1 état de la question .....	62
2.5.2 Profil athlétique optimal en sport de haut-niveau .....	63
2.5.3 Identification des déterminants musculaires de la performance .....	65
Chapitre 3 – Animation de la recherche .....	69
3.1 Conception et direction de travaux.....	70
3.2 Coordination d'une équipe de recherche .....	71
Chapitre 4 – Projets de recherche .....	75
4.1. Compréhension des mécanismes lésionnels .....	76
4.1.1 Contributions musculaire et tendineuse © la dissipation d'énergie .....	77
4.1.2 Répartition de la contrainte au sein d'un groupe musculaire .....	78
4.1.3 Propriét°s élastiques et blessure musculaire .....	83
4.2 Évaluation et optimisation des propriét°s contractiles .....	86
4.2.1 Contributions fasciculaire et tendineuse aux mouvements explosifs.....	87
4.2.2 Solutions innovantes d'optimisation des interactions muscle-tendon .....	89
4.2.3 Adaptations © la modalité de résistance : du muscle © la cellule .....	91
4.3 Application © la compréhension et © l'amélioration de la performance en sprint.....	92
4.3.1 Coordinations musculaires en sprint résist° et assist° .....	93
4.3.2 Relations entre propriét°s musculaires et performance en sprint.....	96
Références .....	99
Annexes .....	107



# Présentation du mémoire |

La rédaction de ce m<sup>o</sup>moire d'Habilitation à Diriger des Recherches intervient 6 mois après les Jeux Olympiques 2016 de Rio et 7 mois avant la désignation de la ville organisatrice des Jeux Olympiques de 2024. La ville de Paris, où je vis et exerce mon métier de chercheur en sciences du sport depuis 8 ans, est candidate à l'organisation de ces JO 2024. Il serait intéressant de connecter directement notre travail quotidien aux enjeux colossaux associés à ces événements planétaires. Néanmoins ce contexte particulier est une opportunité de mettre en perspective le travail conduit sur la période au regard de ce que sera le sport de haut-niveau dans les années futures. Ainsi, ce m<sup>o</sup>moire a pour vocation de synthétiser les apports de connaissances issus de nos travaux depuis mon doctorat, ainsi que les projets de recherche engagés ou à venir, dans le cadre de mes recherches et de la coordination scientifique de l'équipe d'Accueil Sport, Expertise et Performance (n°7370), que je dirige depuis près d'un an. Une attention particulière est portée aux liens effectifs ou envisageables avec la performance sportive. Cette démarche s'inscrit dans une volonté permanente de proposer des transferts de savoirs et de technologies pour les acteurs du sport de haut-niveau, en collaboration avec nos partenaires fondamentaux, académiques et industriels.

Ce manuscrit est organisé en quatre parties. La première partie présente mon parcours académique, mon activité scientifique, pédagogique et administrative, ainsi que mes expériences d'animation de la recherche. Après un diplôme de Master en Biologie et Physiologie (stage de Master 2 dirigé par le Dr. François Hug et le Dr. Sylvain Dorel), j'ai obtenu en février 2010 un doctorat en Sciences des Activités Physiques et Sportives à, au laboratoire Motricité, Interactions, Performance (MIP - EA 4334) de l'Université de Nantes, sous la direction du Pr. Arnaud Guivel et du Pr. Christophe Cornu. J'occupe depuis mars 2009 un poste de chercheur au laboratoire Sport, Expertise et Performance (SEP - EA 7370) de l'Institut National du Sport (INSEP, Paris), au sein duquel j'ai coordonné un thème de recherche, centré sur l'analyse des facteurs neuromusculaires et biométriques du geste sportif de septembre 2013 à avril 2016, date à laquelle j'ai pris la responsabilité de Directeur du Laboratoire SEP. Les travaux conduits au sein de ces équipes ont donné lieu à la publication de 34 articles dans des revues internationales indexées ISI. Une partie de ces productions est le fruit d'une collaboration étroite que j'ai naturellement entretenue entre les deux laboratoires (SEP, MIP). La deuxième partie de ce m<sup>o</sup>moire dresse une synthèse de ces travaux, organisés en quatre thèmes de recherche, articulés autour d'une démarche qui a visé à manipuler la contrainte mécanique à des fins d'évaluation de la performance musculaire et/ou de caractérisation du comportement du système neuromusculaire. Ces études mécanistiques ont conduit à considérer la plasticité neuromusculaire du point de vue des altérations tissulaires aigues (dommages musculaires), des adaptations chroniques induites par l'entraînement et leurs liens avec la performance sportive de haut-niveau (Fig. 1). La troisième partie synthétise l'expérience acquise en matière d'encadrement et d'animation de la recherche depuis 8 ans. La quatrième partie est consacrée aux projets de recherche qui se proposent de tenter de répondre à une partie des limites rencontrées et de contribuer à l'avancement des connaissances dans la continuité des travaux déjà réalisés. Les deux perspectives de recherche majeures envisagées à la fin de ce m<sup>o</sup>moire concernent l'étude des mécanismes liaisonnels et des propriétés contractiles, avec une application à la compréhension de la performance motrice en sprint.




Fig. 1. Repr<sup>o</sup>sentation de la d<sup>o</sup>marche de recherche globale adopt<sup>o</sup>e au cours des travaux pr<sup>o</sup>sents dans ce m<sup>o</sup>moire.

### Démarche de recherche

Les travaux d<sup>o</sup>crits dans ce manuscrit ont ét<sup>o</sup> réalis<sup>o</sup>s depuis mon recrutement à l'INSEP et s'inscrivent dans le cadre du programme scientifique du laboratoire Sport, Expertise et Performance qui vise à construire et promouvoir la connaissance scientifique et technologique sur la performance sportive de haut niveau. Ils concernent plus particulièrement le thème 3 du laboratoire intitulé « analyse des facteurs neuromusculaires et biométriques du geste sportif ». Si la performance sportive est un processus minemment complexe et multifactoriel, le mouvement nécessaire à la réalisation de cette performance est le résultat de la contraction du muscle et/ou de l'énergie transmise par les tissus élastiques (en particulier les tendons) aux leviers osseux. Le muscle représente ainsi le véritable moteur du mouvement humain et possède également de formidables capacités d'adaptation à son environnement. La compréhension du fonctionnement du système neuromusculaire et de sa plasticité au stress mécanique apparaît dès lors comme une des portes d'entrée évidentes de l'optimisation de la performance sportive.

Mes travaux de thèse se sont inscrits dans le prolongement d'une veine de recherche initiée par le laboratoire MIP au début des années 2000 qui consiste à développer des méthodes permettant de comparer des modalités de résistance utilisées en entraînement (résistance isoinertielle) et en rééducation fonctionnelle (résistance isocinétique), dans des conditions contrôlées (Frost et al., 2010). À partir de cette méthodologie, je me suis intéressé à la réponse neuromusculaire lors de contractions excentriques, impliquées dans les actions musculaires frénatrices (e.g. réception de saut, course en descente, descente d'escalier) et qui ont la particularité d'associer des niveaux de force élevés à un allongement de l'unité muscle-tendon. Cette contrainte mécanique représente donc un stress important pour le tissu musculaire qui peut alors subir des dommages musculaires (altérations à court terme). Si l'exercice excentrique est répété, le complexe muscle-tendon peut s'adapter. Il devient alors plus résistant vis-à-vis de ces contraintes excentriques et sa capacité de production de force augmente (adaptations à moyen-long-terme). Les travaux engagés lors de ma thèse ont ainsi posé les bases d'une démarche de recherche qui a finalement structuré l'ensemble de mon parcours et qui pourrait se résumer en deux questions majeures :

- comment le système neuromusculaire est affecté par un exercice contraignant ? (diminution temporaire de la performance)
- comment s'adapte-t-il à la contrainte mécanique ? (amélioration de la performance)

Les collaborations tiss<sup>°</sup>es avec le milieu sportif depuis mon arriv<sup>°</sup>e à l'INSEP m<sup>o</sup>nt ensuite conduit à m<sup>o</sup>ntresser deux autres probl<sup>o</sup>matiques fortes :

- quels sont les liens entre les propriétés musculaires et la performance lors de mouvements rapides à haute intensité et à haute vitesse (performance explosive) ?
- quels sont les déterminants musculaires de la performance sportive de haut-niveau ?

Les premières expérimentations initiées au cours de ma thèse se sont basées sur l'utilisation de (i) l'électromyographie de surface pour quantifier le niveau d'activité des muscles sollicités par l'exercice et (ii) de l'échographie classique pour caractériser le comportement des fascicules musculaires lors de la contraction. Les méthodes mobilisées dans ce cadre comportaient cependant plusieurs limites. D'une part, l'EMG utilisant des électrodes simples ne représente qu'une partie du tissu musculaire actif. D'autre part, la fréquence d'acquisition réduite (25 Hz) des échographies classiques ne permet pas l'étude de phénomènes courts ou de mouvements rapides, comme ceux rencontrés dans la plupart des actions sportives. De plus, les outils d'analyse des images échographiques, et notamment de la longueur des fascicules musculaires, essentielle lorsqu'il s'agit d'étudier l'allongement de ceux-ci en contraction excentrique, étaient alors limités à des mesures manuelles fastidieuses, image par image.

Les outils d'analyse auxquels j'ai eu accès à mon arrivée à l'INSEP associés aux avancées technologiques dans le domaine ont permis de répondre progressivement à ces limites. Afin de mieux apprécier les dommages musculaires induits par l'exercice excentrique, nous avons d'abord mobilisé l'imagerie par Résonance Magnétique pour quantifier l'endommagement au sein de l'ensemble du muscle par mesure du demi-temps de relaxation ( $T_2$ ), dans le cadre d'une collaboration étroite avec le service de radiologie du Département Médical de l'INSEP. De plus, le laboratoire SEP étant équipé d'un système EMG haute-densité (64 voies), nous avons pu étudier l'impact de l'exercice excentrique maximal sur l'activation de l'ensemble du muscle *biceps brachii*. Parallèlement à ce travail, nous avons acquis au laboratoire SEP un échographe ultrarapide qui nous a permis d'enregistrer des images à haute fréquence (jusqu'à 10 kHz) et d'explorer ainsi plus finement le comportement du muscle et des tissus tendineux lors de contractions excentriques. Le développement de méthodes de suivi automatique des fascicules musculaires en contraction a également accéléré l'analyse de l'allongement des tissus musculaires et tendineux face à ce type de contrainte (Cronin et al., 2011; Farris et Lichtwark, 2016).

Si ces travaux ont permis de mieux cerner les interactions muscle-tendon en contraction excentrique et leur impact sur la fonction musculaire, ils n'ont pas déterminé les effets des dommages sur les propriétés mécaniques des différents muscles sollicités, c'est-à-dire leur capacité à stocker et restituer de l'énergie mécanique lors de leur déformation (e.g. allongement induit par une contraction excentrique). Afin d'avancer sur cette question, jusqu'alors principalement appréhendée au travers de méthodes globales (i.e. mesure du couple de force résultant d'un tirage passif du muscle), nous avons utilisé la méthode d'ulastographie à Supersonic Shear Imaging (SSI) (Bercoff et al., 2004). Cette technologie développée à l'Institut Langevin et dont l'applicabilité aux tissus musculaire et tendineux a été prouvée dans différentes conditions expérimentales,

notamment par l'équipe du laboratoire MIP (Hug et al., 2015b), permet d'accéder à l'elasticité (ou à la raideur) du tissu considéré. Les résultats issus de nos travaux ont montré que les dommages induisent une augmentation très précoce de la raideur, pouvant persister jusqu'à 3 semaines post-exercice excentrique.

Ces résultats nous ont amenés à nous intéresser à l'impact de l'actions plus importantes (blessure) sur l'elasticité du muscle, ainsi qu'aux relations existant entre ces propriétés élastiques, le risque de blessure et de récidive<sup>1</sup>. Plus récemment, nous avons obtenu un contrat doctoral<sup>2</sup> dont le but sera de contribuer à la compréhension des mécanismes qui peuvent conduire à une lésion musculaire. Ce projet se trouve donc à l'intersection de nos études visant à explorer les interactions muscle-tendon et celles caractérisant les altérations induites par l'exercice.

Si les évolutions technologiques nous ont permis de mieux apprendre la réponse neuromusculaire à l'exercice, elles offrent également la possibilité de moduler la contrainte mécanique et de déterminer les effets de modalités d'exercice innovantes. Ainsi, nous avons cherché à valider de nouvelles modalités de résistance (e.g. pneumatique), en vue de développer des protocoles innovants permettant l'évaluation et le développement des capacités musculaires. Ces procédures sont ensuite mobilisées pour déterminer les profils athlétiques des sportifs de haut-niveau. Quand cela est matériellement possible, les critères de performance principaux, tels que les capacités de production de force, de vitesse et de puissance maximale extraits de ces évaluations, sont ensuite confrontés à la performance mesurée en situation spécifique. Ce travail a, par exemple, été conduit avec l'équipe de France de sabre féminin, ce qui a permis d'identifier des potentiels d'optimisation de la performance, mais aussi de prévention du risque de blessure.

Les variables issues de ces protocoles sont également centralisées dans des bases de données permettant d'identifier des critères de performance par discipline sportive, par genre ou par catégorie d'âge. Ces éléments peuvent être exploités par les staffs techniques pour conduire leurs procédures de détection, en vue par exemple d'identifier les collectifs é relativement ou encore la génération 2024 qui participera aux Jeux Olympiques que souhaite organiser la ville de Paris. Toujours dans une logique d'optimisation des performances musculaires, nous avons caractérisé chez ces sportifs l'équilibre optimal entre leurs capacités de force et de vitesse pour un deuxième niveau de puissance maximale (Samozino et al., 2012). Cette méthode développée par l'Université de Savoie a soulevé des sources d'amélioration des performances musculaires de sportifs de haut-niveau dans des disciplines variées.

Afin de pouvoir équilibrer les déficits potentiels identifiés à l'aide de cette méthode, il semble intéressant de déterminer quelle modalité de résistance sera la plus efficace pour augmenter les capacités de production de force ou de vitesse. Dans ce contexte, nous nous sommes attachés à développer des collaborations avec des partenaires privés spécialisés dans la conception d'ergomètres innovants (e.g. ergomètre

<sup>1</sup> Projet BLESSI : à Caractérisation des propriétés élastiques musculaires par l'ostéographie : une nouvelle approche de la blessure. Ce projet, mené en collaboration avec le Département Médical de l'INSEP et l'Université de Nantes, est financé par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports à hauteur de 26 k€ dans le cadre de l'appel à projet recherche et développement 2015.

<sup>2</sup> Projet HamInB : à Exploration biomécanique des mécanismes lésionnels du muscle en course à pied - contrat doctoral de Simon Avrillon (Université Paris Saclay).

m<sup>o</sup>c<sup>at</sup>ronique<sup>3</sup>). Les projets initia<sup>l</sup>s actuellement au sein du laboratoire doivent permettre à la fois de valider les mesures effectu<sup>é</sup>s par ces appareils et de déterminer leur pertinence vis à vis des objectifs d'entraînement<sup>4</sup>. En particulier, la résistance m<sup>o</sup>c<sup>at</sup>ronique nous a permis de reproduire un protocole d'évaluation de la vitesse de raccourcissement maximale du muscle [i.e. *slack test* de Edman (1979)]. Nous avons aussi couplé cette méthode à l'échographie ultrarapide pour mesurer cette vitesse maximale de raccourcissement *in vivo*. Ce type de protocole pourrait *in fine* être mobilisé pour objectiver les effets de programmes d'entraînement orientés vers l'amélioration de la vitesse maximale, par exemple chez des sportifs pour lesquels un déficit de cette capacité aurait été initialement identifié.

**Mots-clés :** système neuromusculaire ; dommages musculaires ; propriétés contractiles ; propriétés élastiques ; performance sportive.

---

<sup>3</sup> Ergomètre co-conçu avec la société Eracès-Technology (Compiègne, France), permettant de régler de manière dissociée la force et l'inertie de la résistance appliquée à l'articulation.

<sup>4</sup> Co-direction de la thèse de doctorat de Robin Hager intitulée « Solutions ergométriques innovantes pour l'exploration des interactions muscle-tendon et le développement des qualités puissance-vitesse », réalisée en partenariat avec la société Actech (Portange, Luxembourg).

# Chapitre 1 – Titres et travaux

## 1.1 Curriculum Vitae

**GUILHEM Gaël**

N° le 7 septembre 1982, © Belfort (90)  
Nationalit° fran°aise  
Mari°, 1 enfant

Coordonnées professionnelle

Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance  
Pôle Performance, Unit° Recherche  
Laboratoire Sport, Expertise et Performance (EA 7370)  
11, av du Tremblay - 75012 Paris  
[gael.guilhem@insep.fr](mailto:gael.guilhem@insep.fr)

### Situation actuelle

---

2016 - présent    **Directeur du Laboratoire Sport, Expertise et Performance (SEP - EA 7370)**  
Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance (INSEP), Paris  
Pôle Performance, Unit° Recherche  
13 chercheurs, 3 ing°nieurs, 2 assistantes, 13 doctorants

### Expériences professionnelles

---

2014 - 2016    **Responsable du thème scientifique « Geste Sportif » du Laboratoire SEP**  
INSEP, Paris  
Direction de la Performance Sportive, D°partement de la Recherche

2009 - 2014    **Chercheur**  
INSEP, Paris  
Direction de la Politique Sportive, Mission Recherche

2006 - 2009    **Allocataire de recherche du Réseau Recherche et Sport en Pays de la Loire (RSPDL)**  
Universit° de Nantes  
UFR STAPS, Laboratoire Motricit°, Interactions, Performance (EA 4334)

Juillet 2005    **Technicien de laboratoire vacataire au sein de l'équipe INSERM U755, Hôpital-Dieu, Paris**

### Formation

---

2006 - 2010    **Doctorat Sp°cialit° Physiologie & Biom°canique, Universit° de Nantes**  
Mention Très Honorable avec Félicitations du Jury  
Titre de la thèse : é Adaptations structurales et nerveuses du système neuromusculaire induites par l'exercice excentrique isotonique versus isocin°tique è  
Sous la direction du Pr Arnaud GUVEL (PU) et du Dr Christophe CORNU (MHC ñ HDR)

2005 - 2006    **Master 2 Entraînement sportif, Nutrition & Sant°, Universit° R. Descartes Paris V**  
Mention AB, Major de promotion  
Titre du m°moire : é Effets d'un exercice préalable sur l'apparition des seuils ventilatoires è  
Sous la direction du Dr François HUG et du Dr Sylvain DOREL  
Laboratoire de Biom°canique & Physiologie, INSEP

2004 - 2005    **Master 1 Biologie Int°grative & Physiologie, Universit° P. et M. Curie Paris VI, Mention B**  
Titre du m°moire : é Caract°risation de la pathologie du tissu adipeux au cours de l'ob°sit° »  
Sous la direction du Pr Karine CLMENT (PU) et du Dr Raphaella CANCELLA  
Laboratoire de Nutriomique (INSERM U755), Hôpital-Dieu, Paris

2003 - 2004    **Licence Biologie des Organismes, Universit° P. et M. Curie Paris VI**

2000 - 2003    **DEUG SV mention Biologie, Universit° de Bretagne Occidentale, Brest, mention AB**

## 1.2 Activité de recherche

### Prix, distinctions

---

- 2014 Prix Jean Vivès d°cern° par l'Acad°mie Nationale Olympique Fran°aise
- 2010 Thèse Remarquable de l'Universit° of Nantes
- 2008 Prix Meilleur Poster du Forum des Doctorants de l'Universit° of Nantes
- 2007 Prix Jeune Chercheur du II Congrès Sport et Recherche en Pays de la Loire

### Articles en révision ou soumis dans des revues indexées (ISI)<sup>5</sup>

---

- AS5. Beaumatin N, Hauraix H, Nordez A, Hager R, Rabita G, Guilhem G, Dorel, S. Maximal muscle shortening velocity in vivo: effects of pre-activity and initial stretching of the muscle-tendon unit. Under review.
- AS4. Avrillon S, Hug F, Guilhem G. Coactivation of thigh muscles revisited using elastography. Under review.
- AS3. Doguet V, Nosaka K, Guilhem G, Gu°vel A, Jubeau M. Spinal excitability enhancement after a single bout of eccentric exercise. Under review.
- AS2. Hollville E, Couturier A, Guilhem G, Rabita G. Minimax player load as an index of the center of mass displacement? A validation study. Under review.
- AS1. Lacourpaille L, Nordez A, Doguet V, Andrade R, Hug F, Guilhem G. Supersonic shear imaging as a non-invasive technique to early detect exercise-induced muscle damage. Under review.

### Articles publiés dans des revues indexées (ISI)

---

- ACL34. Point M, Guilhem G, Hug F, Nord ez A, Frey A, Lac ourpaille L. Cryotherapy induces an increase in muscle stiffness. Scand J Med Sports Sci. 2017;[Epub Ahead of Print] [AERES STAPS ñ 2e] [ISI-IF: 3.025]
- ACL33. Morales-Artacho A, Lacourpaille L, Guilhem G. Effects of warm-up on hamstring muscles stiffness: cycling vs. foam rolling. Scand J Med Sports Sci. 2017;00:1ñ11. doi:10.1111/sms.12832. [AERES STAPS ñ 2e] [ISI-IF: 3.025]
- ACL32. Friesenbichler B, Item-Glatthorn JF, Neunstöcklin F, Casartelli N, Guilhem G, Maffiuletti NA. Differences in trunk and thigh muscle strength, endurance and thickness between elite sailors and non-sailors. Sports Biomech. [Epub ahead of print] [AERES STAPS ñ 3e] [ISI-IF: 1.209]
- ACL31. Hauraix H, Dorel S, Rabita G, Guilhem G, Nordez A. Muscle fascicle shortening behavior of vastus lateralis during a maximal force-velocity test. [Epub ahead of print] [AERES STAPS ñ 2e] [ISI-IF: 2.328]
- ACL30. Plautard M, Guilhem G, Fohanno V, Nordez A, Cornu C, Gu°vel A. Comparison of two methodological approaches for the mechanical analysis of isometric single-joint movement. Sports Biomech. [Epub ahead of print] [AERES STAPS ñ 3e] [ISI-IF: 1.209]
- ACL29. Doguet V, Rivière V, Gu°vel A, Guilhem G, Chauvet L, Jubeau M. Specific muscle length dependency of voluntary activation during eccentric contractions. Muscle Nerve. [Epub ahead of print] [AERES STAPS ñ 2e] [ISI-IF: 2.713]

<sup>5</sup> Les étudiants encadr°s sont indiqu°s en gras non-soulign°. Ces publications sont disponibles en version pdfs sur la page [www.researchgate.net/profile/Gael\\_Guilhem/contributions](http://www.researchgate.net/profile/Gael_Guilhem/contributions).

- ACL27. Avrillon S, Jidotseff B, Hug F, Guilhem G. Influence of isoinertial-pneumatic resistance balance on force-velocity relationship. *Int J Sport Physiol Perform.* [Epub ahead of print] [ISI-IF: 3.042]
- ACL26. Doguet V, Jubeau M, Dorel S, Couturier A, Lacourpaille L, Gu°vel A, Guilhem G. Time-course of neuromuscular changes during and after maximal eccentric contractions. *Front Physiol.* 2016;16(7):137. [AERES STAPS n° 1] [ISI-IF: 4.031]
- ACL25. Lacourpaille L, Nordez A, Doguet V, Hug F, Guilhem G. Effect of exercise-induced muscle damage on electromechanical delay. *Muscle Nerve.* 2016; 54(1):136-141. [AERES STAPS n° 2] [ISI-IF: 2.713]
- ACL24. Guilhem G\*, Doguet V\*, Hauraix H, Lacourpaille L, Jubeau M, Nordez A, Dorel S. Muscle force loss and soreness subsequent to maximal eccentric contractions depend on the amount of fascicle strain in vivo. *Acta Physiologica.* 2016;217(2):157-163. [AERES STAPS n° 2e] [ISI-IF: 4.382]
- ACL23. Slawinski J, Termoz N, Rabita R, Guilhem G, Dorel S, Morin JB, Samozino P. How 100-m event analyses improve our understanding of world-class men's and women's sprint performance. *Scand J Med Sports Sci.* [Epub ahead of print] [AERES STAPS n° 2e] [ISI-IF: 3.025]
- ACL22. Guilhem G, Hanon C, Gendreau N, Bonneau D, Gu°vel A, Chennaoui M. Salivary hormones response to preparation and pre-competitive training of world-class level athletes. *Frontiers Physiol.* 2015;6:333. [AERES STAPS n° 1e] [ISI-IF: 4.031]
- ACL21. Giroux C, Rabita R, Chollet D, Guilhem G. Optimal balance between force and velocity differs among world-class Athletes. *J Appl Biomech.* 2016;32(1):59-68. [AERES STAPS n° 2e] [ISI-IF: 1.010]
- ACL20. Hauraix H, Nordez A, Guilhem G, Rabita G, Dorel S. In vivo maximal fascicle-shortening velocity during plantar flexion in humans. *J Appl Physiol.* 2015;119(11):1262-71 [AERES STAPS n° 1e] [ISI-IF: 3.004]
- ACL19. Plautard M, Guilhem G, Cornu C, Gu°vel A. Time-course of performance changes and underlying mechanisms during and after repetitive moderately weight-loaded knee extensions. *J Electromyogr Kinesiol.* 2015;25(3):488-94. [AERES STAPS n° 1e] [ISI-IF: 1.530]
- ACL18. Giroux C, Guilhem G, Chollet D, Rabita G. Is muscle coordination affected by loading condition in ballistic movements? *J Electromyogr Kinesiol.* 2015;25:69-76. [AERES STAPS n° 1e] [ISI-IF: 1.530]
- ACL17. Giroux C, Rabita G, Chollet D, Guilhem G. What is the best method for assessing lower limb force-velocity relationship? *Int J Sports Med.* 2015;36:143-149. [AERES STAPS n° 3e] [ISI-IF: 2.528]
- ACL16. Guilhem G, Giroux C, Couturier A, Maffiuletti NA. Validity of trunk extensor and flexor torque measurements using isokinetic dynamometry. *J Electromyogr Kinesiol.* 2014;24(6):986-93. [AERES STAPS n° 1e] [ISI-IF: 1.725]
- ACL15. Giroux C, Guilhem G, Chollet D, Rabita R. Muscle coordination in loaded squat jump. *Comput Methods Biomed Engin.* 2014;17 Suppl 1:158-9. [AERES STAPS n° 1e] [ISI-IF: 1.793]
- ACL14. Lacourpaille L, Nordez A, Hug, F, Couturier A, Dibie C, Guilhem G. Time-course effect of exercise-induced muscle damage on localized muscle mechanical properties assessed using elastography. *Acta Physiol.* 2014;211(1):135-46. [AERES STAPS n° 2e] [ISI-IF: 4.251]
- ACL13. Guilhem G, Giroux C, Couturier A, Chollet D, Rabita R. Mechanical and muscular coordination patterns during a high-level fencing assault. *Med Sci Sports Exerc.* 2014;46(2):341-50. [AERES STAPS n° 1e] [ISI-IF: 4.459]

- ACL12. Guilhem G, Hug F, Couturier A, Regnault S, Bournat L, Filliard JR, Dorel S. Effects of air-pulsed cryotherapy on neuromuscular recovery subsequent to exercise-induced muscle damage. *Am J Sports Med.* 2013;41(8):1942-51. [AERES STAPS ñ 1e] [ISI-IF: 4.699]
- ACL11. Guilhem G, Cornu C, Maffiuletti NA, Gu°vel A. Neuromuscular adaptations to isoload versus isokinetic eccentric resistance training. *Med Sci Sports Exerc.* 2013;45(2):326-35. [AERES STAPS ñ 1e] [ISI-IF: 4.459]
- ACL10. Plautard M, Cornu C, Guilhem G, Guevel A. Specific neuromuscular fatigue induced by repetitive isoload concentric knee extension. *Comput Methods Biomech Biomed Engin.* 2012;15 Suppl 1:165-6. [AERES STAPS ñ 2e] [ISI-IF: 1.393]
- ACL9. Dorel S, Guilhem G, Couturier A, Hug F. Adjustment of Muscle Coordination during an All-Out Sprint Cycling Task. *Med Sci Sports Exerc.* 2012;44(11):2154-64. [AERES STAPS ñ 1e] [ISI-IF: 4.475]
- ACL8. Guilhem G, Gu°vel A, Cornu C. A methodologic approach for normalizing angular work and velocity during isotonic and isokinetic eccentric training. *J Athl Train.* 2012;47(2):125-9. [ISI-IF: 1.682]
- ACL7. Guilhem G, Cornu C, Gu°vel A. Muscle architecture and EMG activity changes during isotonic and isokinetic eccentric exercises. *Eur J Appl Physiol.* 2011;111(11):2723-33. [AERES STAPS ñ 2e] [ISI-IF: 2.66]
- ACL6. Cancello R, Rouault C, Guilhem G, Bedel JF, Poitou C, Di Blasio AM, Basdevant A, Tordjman J, Cl°ment K. Urokinase plasminogen activator receptor in adipose tissue macrophages of morbidly obese subjects. *Obes Facts.* 2011;4(1):17-25. [ISI-IF: 1.856]
- ACL5. Guilhem G, Cornu C, Nordez A, Gu°vel A. A new device to study isoload eccentric exercise. *J Strength Cond Res.* 2010;24(12):3476-83. [ISI-IF: 1.848]
- ACL4. Guilhem G, Cornu C, Gu°vel A. Neuromuscular and muscle-tendon system adaptations to isotonic and isokinetic eccentric exercise. *Ann Phys Rehabil Med.* 2010;53(5):319-41.
- ACL3. Guilhem G, Gu°vel A, Cornu C. A standardization method to compare isotonic vs. isokinetic eccentric exercises. *J Electromyogr Kinesiol.* 2010;20(5):1000-6. [AERES STAPS ñ 1e] [ISI-IF: 2.372]
- ACL2. Guilhem G, Dorel S, Hug F. Effect of a prior short simulated training session on the subsequent occurrence of ventilatory thresholds. *J Sci Med Sport.* 2009;12(2):273-9. [AERES STAPS ñ 3e] [ISI-IF: 1.57]
- ACL1. Cancello R, Tordjman J, Poitou C, Guilhem G, Bouillot J-L, Hugol D, Coussieu C, Basdevant A, Bar Hen, Bedossa P, Guerre-Millot M, Cl°ment K. Increased infiltration of macrophages in omental white adipose tissue associates with marked hepatic lesions in human morbid obesity. *Diabetes.* 2006;55(6):1554-61. [ISI-IF: 7.955]

## Évaluation de l'impact des articles publiés

Position	N°	Année	Revue	Facteur d'impact <sup>6</sup>	Rang AERES <sup>7</sup>	Citations <sup>8</sup>
2/6	ACL34	2017	Scand J Med Sports Sci	3.025	2	0
3/3	ACL33	2017	Scand J Med Sports Sci	3.025	2	0
5/6	ACL32	2017	Sports Biomech	1.209	3	0
4/5	ACL31	2017	Eur J Appl Physiol	2.328	2	0
2/6	ACL30	2017	Sports Biomech	1.209	3	0
4/6	ACL29	2016	Muscle Nerve	2.713	2	0
5/7	ACL28	2016	Med Sci Sport Exerc	4.041	1	0
4/4	ACL27	2016	Int J Sport Physiol Perform	3.042	2	0
7/7	ACL26	2016	Frontiers Physiol	4.031	1	0
5/5	ACL25	2016	Muscle Nerve	2.713	2	0
1/7	ACL24	2016	Acta Physiologica	4.382	2	4
4/7	ACL23	2016	Scand J Med Sports Sci	3.025	2	6
1/6	ACL22	2016	Frontiers Physiol	4.031	1	1
4/4	ACL21	2016	J Appl Biomech	1.01	2	2
3/5	ACL20	2015	J Appl Physiol	3.004	1	2
2/4	ACL19	2015	J Electromyogr Kinesiol	1.530	1	0
2/4	ACL18	2015	J Electromyogr Kinesiol	1.530	1	3
4/4	ACL17	2015	Int J Sports Med	2.528	3	7
1/4	ACL16	2014	J Electromyogr Kinesiol	1.725	1	4
2/4	ACL15	2014	Comput Methods Biomech Biomed Engin	1.793	1	0
6/6	ACL14	2014	Acta Physiol	4.251	2	16
1/5	ACL13	2014	Med Sci Sports Exerc	4.459	1	7
1/7	ACL12	2013	Am J Sports Med	4.699	1	15
1/4	ACL11	2013	Med Sci Sports Exerc	4.475	1	18
3/4	ACL10	2012	Comput Methods Biomech Biomed Engin	1.393	2	0
2/4	ACL9	2012	Med Sci Sports Exerc	4.475	1	27
1/3	ACL8	2012	J Athl Train	1.682	-	2
1/3	ACL7	2011	Eur J Appl Physiol	2.66	2	23
3/9	ACL6	2011	Obes Facts	1.856	-	7
1/4	ACL5	2010	J Strength Cond Res	1.848	-	8
1/3	ACL4	2010	Ann Phys Rehabil Med	-	-	42
1/3	ACL3	2010	J Electromyogr Kinesiol	2.372	1	9
1/3	ACL2	2009	J Sci Med Sport	1.570	3	1
4/12	ACL1	2006	Diabetes	7.955	1	427
Moyenne				2.90	18	

Les articles publiés en premier, deuxième ou dernier auteur sont indiqués en noir (25/34).

Les contributions comme co-auteur sont indiquées en gris (9/34).

Facteur H au 03/03/2017 : 8.

<sup>6</sup> Facteur d'impact : source ISI.

<sup>7</sup> Liste des revues AERES pour le domaine STAPS (Mise à jour le 5 avril 2012)

<sup>8</sup> Nombre de citations : sources Scopus, Research Gate et Publish or Perish au 03/03/2017.

**Conférences invitées**

- C-INV3. Guilhem G. (2015) Elastography: a new tool to further study muscle damage? XXXIII<sup>th</sup> International Conference on Biomechanics in Sport. Poitiers, June.
- C-INV2. Guilhem G. (2014) Causes and influence factors of muscle strain injuries: which targets for prevention? INSEP Conference ñ Enhancing muscle capacities: force, power, velocity. Paris, May.
- C-INV1. Guilhem G. (2013) Contribution of innovative resistance modalities and associated technologies in the periodization of muscle training. INSEP Conference ñ Training periodization. Paris, October.

**Communication dans un congrès international avec actes**

- C-ACTI12. Guilhem G, Doguet V, Hauraix H, Lacourpaille L, Jubeau M, Nordez A, Dorel S. (2015) Relationship between muscle fascicles behavior during maximal eccentric exercise and subsequent muscle damage. XXIII<sup>th</sup> Congress of the International Society of Biomechanics. Glasgow, July.
- C-ACTI11. Hauraix H, Dorel S, Guilhem G, Rabita G, Nordez A. (2014) Biomechanical features are involved in muscle fascicle velocity during plantar flexions. XX<sup>th</sup> Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology. Rome, July.
- C-ACTI10. Plautard M, Cornu C, Guilhem G, Gu°vel A. (2014) Neuromuscular adaptations to fatigue: comparison between isoload versus isokinetic concentric training. XX<sup>th</sup> Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology. Rome, July.
- C-ACTI9. Guilhem G, Lacourpaille L, Hug F, Dibie C, Nordez A. (2013) Changes in localized mechanical properties and edema following exercise-induced muscle damage. XXIII<sup>th</sup> Congress of the International Society of Biomechanics. Natal, August.
- C-ACTI8. Guilhem G, Hug F, Couturier A, Regnault S, Bournat L, Filliard JR, Dorel S. (2012) Effects of local cryotherapy on muscle recovery subsequent to strenuous eccentric exercise: a multi-channel EMG and MRI study. XIX<sup>th</sup> Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology. Brisbane, July.
- C-ACTI7. Guilhem G. (2011) Effects of local cryotherapy on muscle recovery subsequent to strenuous eccentric exercise. VII<sup>th</sup> ACPS International Forum on elite sport. Paris, August.
- C-ACTI6. Guilhem G, Cornu C, Gu°vel A. (2010) Muscle adaptations induced by two eccentric training modes. XV<sup>th</sup> European Congress of Sports Science. Antalya, June.
- C-ACTI5. Guilhem G, Cornu C, Gu°vel A. (2009) Muscle activity and muscular architecture variation during lengthening contractions in isotonic and isokinetic modes. XXII<sup>th</sup> Congress of the International Society of Biomechanics. Cape Town, July.
- C-ACTI4. Guilhem G, Cornu C, Gu°vel A. (2009) Isotonic and isokinetic eccentric trainings: standardization applied methodology. XXXIV<sup>th</sup> Congress of the French Society of Biomechanics. Toulon, September.
- C-ACTI3. Guilhem G, Cornu C, Gu°vel A. (2009) Effet de l'intensité sur la standardisation des modalités isocinétique et isotonique en régime de contraction excentrique. Theme day of the French Society of Biomechanics. Poitiers, May.
- C-ACTI2. Guilhem G, Nordez A, Lafoux A, Gu°vel A. and C. Cornu. (2008) Development of a methodology for the standardization of isotonic vs. isokinetic eccentric contraction modes. XXXIII<sup>th</sup> Congress of the French Society of Biomechanics. Compiègne, September.
- C-ACTI1. Guilhem G, Dorel S, Hug F. (2007) [Effets d'un exercice préalable sur l'apparition des seuils ventilatoires]. XII Congrès de l'Association des Chercheurs en Activités Physiques et Sportives. Leuven, November.

---

### Communication dans un congrès national avec actes

---

- C-ATN4. **Guilhem G, Dorel S, Couturier A, Filliard JR., Hug F.** (2011) Effects of local cryotherapy on muscle recovery subsequent to strenuous eccentric exercise: a multi-channel EMG and MRI study. INSEP Conference ñ Prevention and management of injury. Paris, June.
- C-ATN3. **Guilhem G, Cornu C, Gu°vel A.** (2010) Comparison of neuromuscular adaptations induced by isotonic and isokinetic eccentric training. II<sup>th</sup> Comettis Conference. Dijon, September.
- C-ATN2. **Guilhem G, Cornu C, Gu°vel A.** (2009) Effects of eccentric training on neural inhibition. II<sup>th</sup> Scientific day of the University of Nantes. Nantes, June.
- C-ATN1. **Guilhem G, Dorel S, Hug F.** (2007) Use of ventilatory thresholds to evaluate exercise intensity distribution during a training or a competition. II<sup>th</sup> Conference on Sport and Research in Pays De la Loire. Le Mans, October.\*Young investigator award\*

---

### Communications affichées

---

- C-AFF2. **Guilhem G, Cornu C, Gu°vel A.** (2009) Effects of eccentric training on neuromuscular system. IIIth Conference on Sport and Research in Pays De la Loire. Angers, October.
- C-AFF1. **Guilhem G, Cornu C, Gu°vel A.** (2008) Comparison of isotonic and isokinetic eccentric contractions : methods and perspectives. PhD Forum of Chemistry-Biology Doctoral School. Nantes, June. \*Poster award\*

---

### Articles de vulgarisation

---

- PV-A4. **Hager R, Dorel S, Nordez A, Guilhem G.** L'innovation technologique, clef de l'entraînement de la puissance et de la vitesse. R°flexions Sport. 2016;14:4-19.
- PV-A3. **Guilhem G, Frey A, Avrillon S, Lacourpaille L.** Blessure musculaire: zoom sur les ischio-jambiers. R°flexions Sport. 2016;13:4-29.
- PV-A2. **Guilhem G.** L'entraînement musculaire © la crois°e des chemins. R°flexions Sport. 2014;9:58-81.
- PV-A1. **Guilhem G.** L'effet de la cryoth°rapie locale sur la r°cup°ration musculaire subs°quente © un exercice excentrique fatigant. R°flexions Sport. 2012.

---

### Ouvrages, chapitres d'ouvrage

---

- OS-C2. **Dorel S, Guilhem G.** (2013) Applications thermiques locales en m°decine sportive. In R°cup°ration et performance sportive. ed. INSEP.
- OS-C1. **Guilhem G, Hug F, Couturier A, Filliard JR, Dibie C, Dorel S.** (2013) Evaluation of cold-air application on muscle recovery following exercise induced muscle damage. In Recovery for performance in sport. ed. Champaign: Human Kinetics.

## Expérience dans l'animation de recherche

---

- 2015 - Présent Co-direction de la thèse de M. Simon Avrillon, soutenance envisagée en Septembre 2018.  
Titre de la thèse : Exploration biométrique des mécanismes lésionnels en course à pied  
Financement : contrat doctoral de l'Université Paris-Saclay  
Directeur de thèse : Pr François Cottin
- 2015 - Présent Co-direction de la thèse de M. Robin Hager, soutenance envisagée en Février 2019.  
Titre de la thèse : Solutions ergométriques innovantes pour l'exploration des interactions muscle-tendon et le développement des qualités puissance-vitesse  
Financement : partenariat ACTECH (36 k€)  
Directeur de thèse : Dr Christine Hanon
- 2015 - 2016 Accueil du séjour de recherche international de Beatriz Bachero Mena, doctorante à l'Université de Séville (ESP), durée : 5 mois  
Titre du projet : Analyse des coordinations musculaires mises en jeu lors de séances d'entraînement spécifiques chez des coureurs de 800 mètres  
Financement : bourse du Ministère Espagnol de la Science et de l'Education  
  
Accueil du séjour de recherche international d'Antonio Morales-Artacho, doctorant à l'Université de Grenade (ESP), durée : 7 mois  
Titre du projet : Effects of warm-up on hamstring muscles stiffness: cycling vs. foam rolling  
Financement : bourse du Ministère Espagnol de la Science et de l'Education (FPU 13/04801)  
Article publié : ACL33
- 2015 - Présent Co-direction du post-doctorat de Sasa Vuk, enseignant-chercheur à l'Université de Zagreb, Croatie, durée : 3 mois.  
Titre de la thèse : Relations force-vitesse fasciculaire et articulaire en saut vertical allégé et chargé  
Financement : fonds propres INSEP et Université de Zagreb  
Renseigné à l'Université de Zagreb : Goran Markovic
- 2012 - 2016 Co-encadrement de la thèse de M. Mathieu Plautard, soutenue le 18 Mars 2016  
Titre de la thèse : Effet de la modalité de résistance sur les adaptations neuromusculaires - Comparaison d'un entraînement en endurance de force isoinertielle vs. isocinétique  
Financement : contrat doctoral de l'Université de Nantes  
Directeur de thèse : Pr Arnaud Guérin  
Articles publiés : ACL15, ACL19, ACL30
- 2011 - 2013 Co-direction de la thèse de Caroline Giroux, soutenue le 13 novembre 2013.  
Titre de la thèse : Analyse des déterminants biométriques et neuromusculaires de la performance dans les activités sportives explosives  
Financement : contrat doctoral de l'Université de Rouen  
Directeur de thèse : Pr Didier Chollet  
Articles publiés : ACL17, ACL18, ACL21
- 2009 - Présent Directions et co-directions de stage de 7 étudiants de Master 2  
Articles publiés : ACL27, AS1
- 2009 - Présent Directions et co-directions de stage de 6 élèves ingénieurs

## Collaborations scientifiques

---

Schulthess Clinic, Zürich, Dr. N. Maffuletti

Université Libre de Bruxelles, Pr. J. Duchateau

Université de Liège, Dr. Boris Jidovsteff

Université de Nantes, Pr. François Hug, Pr. A. Gu°vel, Dr S. Dorel, Dr. A. Nordez, Dr. M. Jubeau, Pr. C. Cornu

Université de Rouen, Pr. Didier Chollet

ESIEE Paris, école de l'Innovation Technologique, Pr Hugues Talbot

Institut de Recherche Biomédicale des Armées, Br°tigny (FRA), Dr. M. Chennaoui

#### **Participation à des contrats de recherche**

---

2015 – 2017	<b>Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (BLESSI - n°15-i-009)</b> Titre du projet : é Caract°risation des propri°t°s °lastiques musculaires par °lastographie : une nouvelle approche de la blessure ê Financement : 26 kù Porteurs du projet : Ga°l GUILHEM et Lilian LACOURPAILLE
2014 – 2016	<b>Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (MecatronEs - n°14-i-015)</b> Titre du projet : é Analyse biom°canique et musculaire de l'exercice m°catronique: une innovation capitale pour l'entraînement musculaire? ê Financement : 40 kù Porteurs du projet : Ga°l GUILHEM
2014 – 2016	<b>Région des Pays de la Loire (ANOPACy - n°14-i-009)</b> Titre du projet : é Analyse et optimisation des performances en Aviron et Cyclisme : l'impact de nouvelles technologies de recherche et d'aide à l'entraînement. ê Financement : 431 kù Porteur du projet : Arnaud GU°VEL Articles publi°s : ACL24, ACL25, ACL26, ACL28, ACL29, AS4
2010 – 2012	<b>Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (SBCE - n°10-i-007)</b> Titre du projet : é tude des paramètres biologiques et fonctionnels associés à l'apparition de la fatigue chez l'athlète °lite ê Financement : 25 kù Porteur du projet : Ga°l GUILHEM Article publi° : ACL22

#### **Expertise scientifique**

---

Éditeur pour la revue PLoS One

Éditeur pour la revue Frontiers in Physiology

- Expert pour les revues :
- BMC Central (1)
  - Clinical Physiology and Functional Imaging (1)
  - European Journal of Applied Physiology (6)- European Journal Sports Science (1)
  - Frontiers in Physiology (5)
  - International Journal of Sports Medicine (1)
  - International Journal of Sports Physiology & Performance (2)
  - Journal of Applied Physiology (2)
  - Journal of Applied Biomechanics (1)
  - Journal of Biomechanics (1)
  - Journal of Electromyography & Kinesiology (2)

- Journal of Physical Education (1)
- Journal of Sports Sciences (3)
- Medicine & Science in Sports & Exercise (1)
- Physical Therapy in Sport (1)
- PLoS One (16)
- Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports (1)
- Science & Sports (3)
- SciTechnol (1)
- Sports Medicine (2)

Jury de thèse :

- Invit° de la th±se de Valentin Doguet (2016, Universit° de Nantes)
- Invit° de la th±se de Mathieu Plautard (2016, Universit° de Nantes)
- Invit° de la th±se de Hugo Hauraix (2015, Universit° de Nantes)
- Examinateur de la th±se de Marcela Munera (2014, Universit° de Reims)
- Examinateur de la th±se de Roland Julianne (2010, Universit° de Caen)

Sociétés savantes, réseaux

---

Membre de l'International Society of Biomechanics (ISB)

Membre de l'International Society of Electrophysiology and Kinesiology (ISEK)

Membre de la Societ° de Biom°canique (SB)

Membre du r°seau Recherche et Sport en Pays de la Loire (RSPDL)

Médias

---

Le dunk est une forme de saut en hauteur. L'Équipe. 20 Février 2017.

Visites priv°es : L'amour du sport. France 2. 2016 Octobre 5.

INSEPTION : Dans la foul°e de Jimmy Vicaut. L'Équipe 21 TV. 2016 Juin 23.

Pourquoi ils peuvent courir plus longtemps. L'Équipe. 2016 Juin 9.

Au cœur de la ruche olympique. Le Parisien. 14 Avril 2016.

La NASA du sport. L'Equipe Magazine. 13 Février 2016.

Stade 2 - L'INSEP enbullition avant Rio. France 2. Décembre 2015.

On n'est pas que des cobayes ! France 4. Décembre 2014.

La bande à Elo : le biom°canicien. L'Équipe. Août 2014.

Air-pulsed cryotherapy: no effect on long-term recovery of damaged muscles. OrthoEvidence. 2014 July.

Rapid cooling does little for strained muscles. Reuters Health. 2013 June.

Friday interview ñ Dr. Gaël Guilhem Ph.D discusses cryotherapy. SwimmingScience.net. 2013 June.

Djokovic, l'homme °lastique. L'Équipe. 7 Juin 2013.

Un champion au scanner. 100% Badminton. Août 2012.

Athl°tisme : le muscle cl° de la performance. Les Échos. Juillet 2012.

C'est pas sorcier ! France 3. 2012.

### 1.3 Activité pédagogique

2015 – 2016	Enseignant, INSEP, Paris Enseignant-vacataire CM, UFR STAPS, Universit° de Nantes Enseignant-vacataire CM, UFR STAPS, Universit° de Poitiers Enseignant-vacataire CM, Facult° de M°decine et de Ma-eutique, Universit° de Lyon Sud 35 h CM (soit 52 h eq TD)
2014 – 2015	Enseignant, INSEP, Paris Enseignant-vacataire CM, UFR STAPS, Universit° de Nantes Enseignant-vacataire CM, UFR STAPS, Universit° de Poitiers Enseignant-vacataire CM, Facult° de M°decine et de Ma-eutique, Universit° de Lyon Sud 35 h CM (soit 52 h eq TD)
2013 – 2014	Enseignant, INSEP, Paris Enseignant-vacataire CM, UFR STAPS, Universit° de Nantes Enseignant-vacataire CM, Institut de formation en °ducation physique et en sport d'Angers/Les Ponts de C° Enseignant-vacataire CM, UFR STAPS, Universit° de Poitiers Enseignant-vacataire CM, Facult° de M°decine et de Ma-eutique, Universit° de Lyon Sud 35 h CM (soit 52 h eq TD)
2012 – 2013	Enseignant, INSEP, Paris Enseignant-vacataire CM, UFR STAPS, Universit° de Nantes Enseignant-vacataire CM, Institut de formation en °ducation physique et en sport d'Angers/Les Ponts de C° 40 h CM (soit 60 h eq TD)
2011 – 2012	Enseignant, INSEP, Paris Enseignant-vacataire TD/TP, UFR STAPS, Universit° de Nantes Enseignant-vacataire CM, Institut de formation en °ducation physique et en sport d'Angers/Les Ponts de C° 27 h CM (soit 40 h eq TD)
2010 – 2011	Enseignant, INSEP, Paris 15 h CM (soit 22 h eq TD)
2009 – 2010	Enseignant-vacataire TD/TP, UFR STAPS, Universit° de Nantes Enseignant, INSEP, Paris 11 h CM (soit 16 h eq TD)
2008 – 2009	Enseignant-vacataire TD/TP, UFR STAPS, Universit° de Nantes Enseignant, INSEP, Paris 3 h CM, 22 h TD, 54 h TP (soit 62 h eq TD)
2007 – 2008	Enseignant-vacataire TD/TP, UFR STAPS, Universit° de Nantes 33 h TD, 18 h TP (soit 45 h eq TD)

#### 1.4 Responsabilités administratives

- 2016 – Présent Directeur du Laboratoire Sport, Expertise et Performance, Unit° Recherche de l'INSEP  
2014 – Présent Membre élu au Conseil Scientifique Médical et de Formation de l'INSEP  
2007 – 2009 Membre élu au Conseil Scientifique de l'UFR STAPS de l'Universit° de Nantes

#### 1.5 Contribution à l'accompagnement scientifique de la performance

- 2010 – Présent Fédération Française d'Escrime : accompagnement scientifique et recherche  
2012 – 2016 Fédération Française d'Aviron : accompagnement scientifique  
2012 – 2015 Fédération Française de Canoë-Kayak : accompagnement scientifique  
2010 – Présent Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées : accompagnement scientifique et recherche  
2009 – Présent Fédération Française d'Athlétisme : accompagnement scientifique et recherche  
2009 – Présent INSEP : °valuation et suivi des qualit°s musculaires



## Chapitre 2 – Synthèse des travaux de recherche |

## 2.1 Introduction

Le cœur des travaux présentés dans ce mémoire concerne l'*exploration in vivo* des propriétés musculaires et leurs liens avec la performance sportive. L'originalité majeure de nos travaux réside principalement dans l'utilisation de techniques non-invasives pour mieux comprendre les interactions muscle-tendon lors de la contraction et les adaptations induites par la contrainte mécanique. Les méthodes mobilisées dans cette optique ont franchi les portes du laboratoire, afin notamment d'identifier des paramètres innovants des capacités musculaires, de mieux comprendre l'activité sportive et optimiser la performance.

Ce mémoire d'habilitation à diriger des recherches s'inscrit ainsi dans le cadre de la biomécanique et de la physiologie neuromusculaire et comprend quatre axes principaux.

Le premier axe intitulé « comportement du système neuromusculaire en contraction excentrique » vise à décrire le fonctionnement du système neuromusculaire et le comportement de l'unité muscle-tendon lors de contractions excentriques maximales. Dans le prolongement de ma thèse de doctorat, ce travail s'est appuyé sur les méthodes d'électromyographie de surface, d'échographie haute-fréquence et d'électrostimulation, couplées à un ergomètre isokinétique Con-Trex MJ acquis par le Laboratoire SEP à mon arrivée en 2009. Les études mises en place dans ce contexte ont donc représenté le développement d'un nouveau thème de recherche au sein de l'équipe. Les logiciels de suivi automatique des fascicules musculaires et les outils de stimulations automatisées développés par Antoine Couturier, ingénieur de recherche au sein du laboratoire ont significativement accéléré la conduite de ces projets. Cet axe continue d'être développé au travers de la thèse de doctorat de Simon Avrillon intitulée « Exploration biomécanique des mécanismes fonctionnels du muscle en course à pied ».<sup>9</sup>

Le deuxième axe de recherche consiste à la plasticité du système neuromusculaire à l'exercice excentrique aigu (dommages) et chronique (entraînement). Notre équipe s'est attachée également à valuer les effets du froid sur la fonction musculaire, contre-mesure largement proposée dans la littérature pour améliorer la récupération après un exercice traumatisant. Le développement de ces travaux s'est adossé à un financement du ministère chargé des sports<sup>10</sup> et un financement de la Région des Pays de la Loire<sup>11</sup>. Les études réalisées dans le cadre de ces deux premiers axes ont été réalisées en collaboration avec plusieurs membres de l'équipe du Laboratoire MIP de l'Université de Nantes (en particulier Sylvain Dorel, Arnaud Guével, François Hug, Marc Jubeau et Antoine Nordez). Elles ont donné lieu à plusieurs accueils d'étudiants en thèse que j'ai co-encadrés à cette occasion, principalement sur le site de l'INSEP (Valentin Doguet, Hugo Hauraix, Lilian Lacourpaille, Mathieu Plautard).

<sup>9</sup> Contrat doctoral obtenu au concours de l'ED 566, Université Paris Saclay.

<sup>10</sup> Projet 07-i-006 intitulé « Effets de la cryothérapie sur la récupération musculaire subséquente à un exercice excentrique fatigant : étude par EMG et IRM ». Montant de la subvention : 55 k€.

<sup>11</sup> Projet ANOPACy (contrat n°14-i-009) intitulé « Analyse et optimisation des performances en Aviron et Cyclisme : l'impact de nouvelles technologies de recherche et d'aide à l'entraînement ». Montant de la subvention : 431 k€.

Le troisième axe porte sur les relations entre propriétés musculaires et performance à haute-intensité. Il vise à prouver l'intérêt de méthodes d'évaluation innovantes des capacités musculaires et l'impact de la pratique sportive de haut-niveau sur ces facteurs. Une partie des travaux a été menée en collaboration avec le Dr. Nicola Maffiuletti (Clinique Schälthess de Zürich, Suisse). Une partie importante de ce travail a été menée dans le cadre de la thèse de Caroline Giroux<sup>12</sup> intitulée « Analyse des déterminants biomécaniques et neuromusculaires de la performance dans les activités sportives explosives », co-dirigée avec Giuseppe Rabita (INSEP) et Didier Chollet (Université de Rouen) et la thèse de doctorat de Hugo Hauraix (Université de Nantes), en collaboration avec Giuseppe Rabita, Antoine Nordez et Sylvain Dorel. Nous avons constitué ainsi un groupe de recherche qui s'intéresse depuis quatre ans aux facteurs mécaniques et neuromusculaires qui influencent les capacités force-puissance-vitesse. Résultats en collaboration avec de nombreux partenaires France des fédérations sportives basés à l'INSEP (par les France d'Athlétisme, de Cyclisme, d'Escrime, de Natation, de Taekwondo et Disciplines Associées), ces études permettent de contribuer à la compréhension de la haute performance dans des mouvements simples mono- (e.g. flexion de cheville, extension de genou) et pluri-articulaires (e.g. saut vertical). Ce thème de recherche a été alimenté par trois stages internationaux effectués par Antonio Morales-Artacho (Université de Grenade, Espagne), Beatriz Bachero-Mena (Université de Séville, Espagne) et Sasa Vuk (Université de Zagreb, Croatie) à l'INSEP. Notre groupe poursuit actuellement ses efforts sur cette thématique à travers la thèse de doctorat de Robin Hager intitulée « Solutions ergométriques innovantes pour l'exploration des interactions muscle-tendon et le développement des qualités puissance-vitesse ».

Le quatrième axe consiste en l'analyse des déterminants musculaires de la performance sportive de haut-niveau. Il s'est matérialisé principalement à travers la mise en œuvre d'un projet financé par le ministère chargé des sports<sup>13</sup> et la thèse de doctorat de Caroline Giroux. Mises en œuvre dans les conditions réelles de pratique, ces études ont visé à décrire l'activité afin d'identifier précisément les besoins des sportifs de haut-niveau en matière d'entraînement musculaire dans des disciplines dites explosives. Un financement du ministère chargé des sports nous permet de poursuivre aujourd'hui le développement de cet axe<sup>14</sup>.

Pour des raisons de cohérence et de clarté du manuscrit, une partie des publications issues de mes travaux depuis l'obtention de la thèse ne sont pas présentes dans ce mémoire (4 articles sur les 28 publiés depuis la thèse).


<sup>12</sup> Contrat doctoral obtenu au concours de l'ED 556, Université de Rouen.

<sup>13</sup> Projet SBCE - n°10-i-007 intitulé « Étude des paramètres biologiques et fonctionnels associés à l'apparition de l'état de fatigue chez l'athlète valide ».

<sup>14</sup> Projet Sprint - n°14-i-029 intitulé « Analyse mécanique et neuromusculaire du sprint en résistance et assistance (survitesse) : mieux caractériser pour améliorer les performances ».

## 2.2 Comportement du système neuromusculaire en contraction excentrique

### 2.2.1 État de la question



Le mouvement humain est le résultat de la transformation d'énergie chimique en énergie mécanique au niveau du muscle (production d'énergie active) ou de l'utilisation d'énergie mécanique emmagasinée dans les structures élastiques du muscle et surtout du tendon, lorsque ces tissus sont mis en tension (stockage-restitution d'énergie passive) (Lieber et Ward, 2011). Lorsque la force est produite dans la direction du mouvement, le muscle contribue au déplacement de la charge mobilisée (contraction concentrique, e.g. extension de la jambe). À l'inverse, lorsque les processus de production d'énergie active et d'absorption d'énergie passive sont associés, le muscle se contracte tout en étant soumis à un allongement des fibres qui le composent, lors d'une contraction excentrique (e.g. au niveau des quadriceps lors de la réception d'un saut). Les premières études sur le travail frénateur effectué lors des contractions excentriques datent de la fin du 19<sup>e</sup> siècle (Chauveau, 1896). Le physiologiste et anatomiste français Auguste Chauveau, montrait notamment une consommation d'oxygène et une dépense énergétique plus faibles lors du travail résistant par rapport au travail moteur (Fig. 2).




Fig. 2. Extrait des Comptes-rendus des Séances de l'Académie des Sciences publiés en 1896 par Auguste Chauveau portant sur la dépense énergétique respectivement engagée dans le travail positif et le travail négatif des muscles. Source en accès libre [www.gallica.bnf.fr](http://www.gallica.bnf.fr).

Si les mécanismes qui régissent les contractions concentriques sont relativement bien expliqués dans la littérature (i.e. formation des ponts actine-myosine), ces modèles ne sont pas parfaitement transposables à la compréhension des propriétés du muscle en contraction excentrique. Pourtant, ce mode d'action musculaire associé aux actions frénatrices est présent dans plusieurs tâches de la vie quotidienne (e.g. marche, course à pied en descente), voire essentiel à la performance motrice dans de nombreuses activités physiques et sportives (e.g. changements de direction, prise d'impulsion, réception d'un saut).

De nombreux auteurs ont montré que les contractions excentriques produisent des couples de force supérieurs à ceux résultant de contractions concentriques ou isométriques (contractions statiques, i.e. sans changement de longueur des fibres musculaires), notamment en raison de la force passive issue de la mise en tension des structures élastiques. Ce mécanisme avait déjà été observé par Chauveau (1896) comme un des facteurs expliquant la moindre dépense d'énergie lors du travail frénateur. A. V. Hill (1938) a décrit cette propriété du muscle comme résultant d'un étirement plus important des ponts actine-myosine qui produisent donc plus de force en contraction excentrique. Pourtant, le modèle classique du cycle de formation des ponts actine-myosine ne permet pas d'expliquer certains phénomènes mécaniques, notamment l'augmentation de la force résiduelle, qui fait référence à une force musculaire supérieure lorsqu'une contraction isométrique est précédée d'une contraction excentrique, par rapport à une contraction isométrique isolée (Abbott et Aubert, 1952). À travers une série de publications récentes, Herzog et al. (2016) proposent ainsi un nouveau modèle de la contraction musculaire faisant intervenir des interactions entre les protéines d'actine et de titine, dont les prédictions de niveau de contrainte s'approchent des valeurs mesurées expérimentalement (Fig. 3).




Fig. 3. Modèle de contraction musculaire incorporant la titine comme le troisième filament contribuant à la régulation de la force avec l'actine et la myosine. (A) Image de microscopie électronique d'une myofibrille isolée (haut) et représentation schématique des 3 filaments du sarcomère (bas). (B) Proposition schématique de contraction musculaire incluant la titine comme une protéine de régulation de la force. Dans la partie supérieure, deux sarcomères sont présentés avec une longueur initiale raccourcie (gauche) et allongée (droite). Si ces deux sarcomères sont étirés passivement à partir de ces deux configurations initiales, la longueur du sarcomère et la force passive sont équivalentes (centre du schéma ; étirement passif). En revanche, si ces sarcomères sont d'abord activés (haut du schéma), la titine se lie à l'actine à un site plus proximal (longueur initiale courte) ou distal (longueur initiale élevée), induisant ainsi un étirement plus important de la partie libre lorsque la longueur initiale du sarcomère est courte que lorsqu'elle est élevée. Dans le deuxième temps, le calcium se fixe sur des sites spécifiques de la titine lors de l'activation du sarcomère, augmentant ainsi la raideur au fragment libre, ajoutant ainsi une force additionnelle due à la titine lorsque les sarcomères sont étirés activement par rapport à un étirement passif. (C) Relations force-longueur du sarcomère en conditions active et passive. FE, augmentation de la force (force enhancement). D'après Herzog (2014).

Si ce m<sup>o</sup>moire n'a pas vocation à aborder la question des m<sup>o</sup>canismes mol<sup>o</sup>culaires de la contraction excentrique, ces donn<sup>o</sup>es montrent l'int<sup>r</sup>êt de l'étude de la contraction excentrique pour mieux comprendre les propriétés physiologiques et biom<sup>o</sup>caniques fondamentales du muscle. Elles mettent également en exergue l'effervescence actuelle autour du fonctionnement du muscle face à ces sollicitations sp<sup>c</sup>ifiques.

*In vivo*, l'exploitation du potentiel de production de force sup<sup>o</sup>rieur en condition excentrique par rapport aux autres régimes de contraction dépend de la commande transmise par le système nerveux aux muscles. Le niveau d'activation musculaire dépend en effet du nombre d'unités motrices (ensemble constitué du motoneurone et des fibres musculaires innervées par son axone) recrutées et de leur fréquence de charge, i.e. le nombre de potentiels d'actions qu'elles génèrent par unité de temps (Duchateau et Enoka, 2011). La force musculaire accrue en contraction excentrique a régulièrement tendance à être associée à des niveaux d'activation électromyographique (EMG) plus faibles en comparaison de contractions concentriques ou isométriques (Babault et al., 2001; Westing et al., 1991). De manière similaire, le niveau d'activation mesuré par la surimposition d'une stimulation électrique simple ou d'un train de stimulations sur le muscle ou le nerf lors d'une contraction maximale est souvent inférieur en excentrique (Beltman et al., 2004). Le nombre d'unités motrices recrutées et leur fréquence de charge enregistrée lors du contrôle de la charge sont également plus faibles que celles utilisées pour soulever cette charge (Del Valle et Thomas, 2005; Nardone et al., 1989) (Fig. 4).




Fig. 4. Modifications de la longueur des fascicules musculaires (A) et de la fréquence de charge des unités motrices (B) lors de contractions dynamiques. Données enregistrées sur le *tibialis anterior* lors de contractions concentriques et excentriques des fléchisseurs dorsaux de la cheville sur 20 degrés d'amplitude articulaire autour de la position neutre (0°). \*P<0.05, \*\*P<0.01, \*\*\*P<0.001: différences significatives entre les deux régimes de contraction. D'après Pasquet et al. (2006).

Ce recrutement sous-maximal des unités motrices met en évidence un contrôle nerveux spécifique de la contraction excentrique (Enoka, 1996), qui a souvent été considéré comme un mécanisme de régulation de la tension au sein des tissus visant à protéger l'unité muscle-tendon de contraintes excédant ses capacités de

résistance (Del Valle et Thomas, 2005; Westing et al., 1991). À l'inverse, d'autres études suggèrent qu'une activation volontaire réduite permettrait de réduire le stress mécanique sur un ensemble plus réduit d'unités motrices. Ce processus favoriserait les dégradations des tissus musculaire et tendineux (Moritani et al., 1987), interrogeant ainsi la réalité d'un contrôle inhibiteur relié à la tension (Pinniger et al., 2000). Au-delà de ces débats, la fréquence de charge plus faible observée lors de contractions excentriques maximales et sous-maximales suggère l'implication de structures spinale (e.g. facilitation pré-synaptique et inhibition post-synaptique) et supra-spinale (e.g. augmentation de l'excitabilité corticale) qui limitent la commande nerveuse transmise au muscle (Duchateau et Baudry, 2014a).

Afin de s'affranchir des limites méthodologiques associées aux exercices incluant des variations de vitesse, la plupart des auteurs ont utilisé des ergomètres isokinétiques pour étudier les contractions excentriques (Duchateau et Enoka, 2008). Toutefois, l'application de charges constantes (exercice isoinertiel) et de mouvements à vitesse constante (exercice isokinétique) sont indistinctement utilisés dans les programmes d'entraînement musculaire, de prévention ou de rééducation fonctionnelle sans que la réponse neuromusculaire induites par ces deux modalités d'exercice soit clairement identifiée. Les travaux de Duchateau et Enoka (2008) montrent en effet que les caractéristiques de la tâche motrice peuvent influencer la commande nerveuse lors de la contraction.

Les hauts niveaux de tension associés à l'allongement forcé de l'unité muscle-tendon lors des contractions excentriques peuvent induire des microlésions au sein du muscle (Clarkson et Hubal, 2002). Les altérations fonctionnelles conséquentes à ces dommages musculaires sont bien connues : perte de force, inflammation, œdème (accumulation de liquide intra-musculaire) et sensation de douleur (Lieber et Friden, 2002). Pour autant, notre compréhension des processus mécaniques qui régissent le niveau de dommages musculaires reste incomplète *in vivo*. Les connaissances relatives aux mécanismes des dommages musculaires sont principalement issues d'études réalisées *in vitro* (Butterfield, 2010). Selon la théorie du « sarcomere popping » (Morgan, 1990), l'allongement actif induit un étirement rapide des sarcomères et augmente la tension au sein des myofibrilles voisines, conduisant à la rupture des sarcomères les moins résistants. Cependant, la plupart de ces travaux effectués *in vitro* imposaient un étirement induit électriquement, à un niveau d'activation constant (i.e. stimulation à haute fréquence), à un faible nombre de fibres et au-delà des amplitudes physiologiques (Brooks et al., 1995). En conditions *in vivo*, en raison de l'activation du muscle et de la participation des tissus élastiques, le comportement de l'unité muscle-tendon est plus complexe (Cronin et Lichtwark, 2013). Aussi, les processus conduisant aux dommages musculaires ne peuvent être extrapolés des ruptures induites sur une ou quelques fibres, rendant difficile le transfert de ces travaux chez l'homme.

En effet, les contractions excentriques sont souvent considérées comme un allongement de l'unité muscle-tendon alors que le muscle est activé. Toutefois, il semble plus adapté de considérer une contraction excentrique non pas comme l'allongement de l'ensemble muscle-tendon, mais plutôt comme l'allongement des fibres ou des fascicules musculaires en contraction. Ainsi, l'exploration de ces sollicitations devient plus complexe et nécessite un équipement permettant d'analyser le comportement de la machinerie contractile en conditions

dynamiques. Au cours des dernières années, les progrès de l'ochographie ont largement exploités pour analyser les interactions muscle-tendon au cours du mouvement et améliorer notamment notre compréhension de la biomécanique de la locomotion (Fig. 5). Lors de tâches énergétiques telles que la marche, il semble que l'allongement des fléchisseurs plantaires est complètement supporté par les tissus tendineux (i.e. apophysites, tendons) (Fukunaga et al., 2001). Ainsi, les interactions muscle-tendon réduisent l'amplitude et la vitesse de l'étirement appliquée aux fibres actives en conditions naturelles, comparativement aux fibres isolées, le tendon agissant alors comme un véritable amortisseur.




Fig. 5. Changements de la longueur des fascicules musculaires (trait épais), de l'unité muscle-tendon (trait pointillé) et des tissus tendineux (trait fin) du *gastrocnemius medialis* (GM) enregistrés par échographie (fréquence d'acquisition : 30 Hz) au cours d'un cycle de marche. AP : apophysite profonde ; AS : apophysite superficielle. Diaprés Fukunaga et al. (2001).

D'autres travaux ont montré un allongement parallèle du *vastus lateralis* et du tendon patellaire lors de la phase de réception d'un saut en contrebas, confortant le rôle fondamental de l'élasticité du tendon dans la réduction du stress appliquée aux fibres musculaires lors de contractions excentriques intenses (Ishikawa et al., 2003). Les travaux du groupe d'Azizi et Roberts (2014) ont par ailleurs suggéré que la rotation des fascicules (i.e. *architectural gear ratio*) pourrait amoindrir l'étirement subi directement par les fibres soumises à des contractions excentriques. Il reste cependant à déterminer si ces mécanismes contribuent effectivement à atténuer les conséquences physiologiques des dommages musculaires induits par l'exercice chez l'homme.

Dans ce contexte, deux études se sont intéressées à cette question *in vivo* (Hoffman et al., 2014; Penailillo et al., 2015). Lors d'un exercice de marche en arrière, en descente (inclinaison de 13°) et chargé (10% de la masse corporelle), Hoffman et al. (2014) ont montré un allongement actif des fascicules du *gastrocnemius medialis* représentant en moyenne 18% de la longueur optimale (i.e. correspondant au pic de force musculaire).

Cependant, les auteurs ne rapportent aucune corr°lation significative entre ce niveau d'allongement et le niveau de dommages musculaires. De la m<sup>2</sup>me mani±re, Penailillo et al. (2015) n'imputent pas la diminution de force post-exercice excentrique à l'amplitude de l'allongement des fascicules du *vastus lateralis*. Toutefois, ces deux études ont analys° des t°ches pluri-articulaires complexes impliquant une variabilit° inter-individuelle importante des coordinations, des amplitudes articulaires et des vitesses de mouvement. Ces protocoles n'ont donc pas permis d'isoler la contrainte appliqu°e aux fascicules parmi les facteurs qui pourraient influencer les dommages musculaires. De plus, les t°ches analys°es étaient sous-maximales, avec un impact mod°r° sur la force musculaire (i.e. -23% et -7% après l'exercice). Aussi, les liens entre les interactions muscle-tendon lors de sollicitations excentriques maximales et le niveau de dommages induits restent à explorer.

### 2.2.2 Effet de la tâche sur le comportement du muscle en contraction excentrique



Guilhem G, Cornu C, Gu°vel A.

Muscle architecture and EMG activity changes during isotonic and isokinetic eccentric exercises.

Eur J Appl Physiol. 2011;111(11):2723-33.

Cette étude fait partie de mes travaux de fin de th°se de Doctorat et fait le lien avec ceux pr°sent°s en vue d'obtenir l'Habilitation à Diriger des Recherches.

Si les modalit°s de r°sistance isocin°tique et isoinertielle sont utilis°es indistinctement pour analyser les contractions excentriques, la r°ponse neuromusculaire à ces sollicitations peut être influenc°e par la t°che (Duchateau et Enoka, 2008). Dans le cadre de travaux men°s lors de ma th°se, nous avons par exemple montré un effet de la modalit° de r°sistance sur les relations couple de force-angle et vitesse-angle qui pourrait avoir des r°percussions sur la r°ponse neuromusculaire lors de la contraction (Guilhem et al., 2010). Nous nous sommes donc int°ress°s à : (i) caract°riser l'activit° musculaire et le comportement des fascicules des muscles extenseurs du genou lors de contractions excentriques maximales et (ii) déterminer l'influence de la modalit° de r°sistance (isoinertielle vs. isocin°tique) sur ces r°ponses.

Le couple de force produit, la vitesse articulaire de mouvement, l'activit° EMG de trois muscles extenseurs et deux muscles fl°chisseurs du genou et l'architecture musculaire du *vastus lateralis*, en particulier la longueur des fascicules musculaires, ont été mesur°s auprès de 17 participants effectuant des contractions excentriques maximales face aux deux modalit°s d'exercice. Les variations de ces paramètres ont caract°ris°es en fonction de l'amplitude articulaire et compar°es entre les deux modalit°s de r°sistance. Les résultats ont montré un allongement de 20% des fascicules musculaires du *vastus lateralis* à partir de 70° (0° = extension complète de la jambe) jusqu'à 90° (longueur maximale = 128 mm, i.e. 47% d'allongement ; Fig. 6). Il est intéressant de noter que malgr° les différences de force et de vitesse précédemment observ°es entre les deux modalit°s, celles-ci ont induit un allongement similaire des fascicules musculaires. En revanche, l'activit° musculaire des extenseurs du genou et du *biceps femoris* était sup°rieure en condition isoinertielle en début de mouvement (longueur fasciculaire courte), certainement en raison des niveaux de couple de force et de vitesse sup°rieurs en début de mouvement (Babault et al., 2003; Pasquet et al., 2006). En effet, un tirement plus rapide

peut induire une augmentation de la fréquence de charge et donc du niveau d'activité EMG. Toutefois, la méthodologie utilisée (analyse manuelle des images échographiques) et les limites technologiques (fréquence d'acquisition des images échographiques limitée à 25 Hz) ne permettaient pas d'investiguer finement les variations de vitesse d'allongement au cours de la contraction, nous empêchant de tester cette hypothèse. De manière similaire, la vitesse d'extension induit une augmentation de la tension passive (Nordez et al., 2008), ce qui pourrait contribuer au couple de force supérieur en isoinertiel en début de mouvement. À la lumière de cette première étude, il apparaissait donc nécessaire de poursuivre ce travail en explorant le rôle du tendon et des interactions muscle-tendon au cours du travail frénateur. Les résultats issus de cette étude suggèrent par ailleurs que les adaptations induites par l'entraînement excentrique pourraient être spécifiques à la modalité de résistance utilisée.




Fig. 6. Variations de l'épaisseur musculaire (a), de l'angle de pennation (b), de la longueur fasciculaire (c) et de l'activité EMG exprimée en pourcentage du Root Mean Square (RMS) maximal enregistré en contraction isométrique maximale (MVC) du muscle *vastus lateralis* lors de contractions excentriques isoinertielles (IT) et isocinétiques (IK). \*Différences significatives entre les modes ( $*P < 0.05$ ;  $***P < 0.001$ ); # Différences significatives avec la valeur mesurée à 30° ( $*P < 0.05$ ). D'après Guilhem et al. (2011).

### 2.2.3 Influence des interactions muscle-tendon sur les dommages musculaires

**Guilhem G\*, Doquet V\*, Hauraux H, Lacourpaille L, Jubeau M, Nordez A, Dorel S.**  
Muscle force loss and soreness subsequent to maximal eccentric contractions depend on the amount of fascicle strain in vivo.  
*Acta Physiologica*. 2016;217(2):157-163.

La plupart des études *in vitro* montrent un lien étroit entre l'allongement des fibres musculaires et le niveau de dommages induits (Butterfield, 2010). Pourtant, les premières études réalisées chez l'homme n'ont pas montré d'influence directe de l'allongement des fascicules musculaires induit par des contractions excentriques

globales (i.e. marche, pédalage) et sous-maximales sur le niveau de dommages, principalement °valu° au travers de la force musculaire (Hoffman et al., 2014; Penailillo et al., 2015). Cette °tude avait donc pour objectif (i) de décrire avec précision le comportement des fascicules musculaires et des tissus tendineux lors de contractions excentriques maximales ; (ii) de déterminer les relations potentielles entre le niveau d'allongement des fascicules musculaires lors de la contraction et les dommages musculaires (i.e. perte de force, douleurs © effet retard°).

Ce projet couvre une série de publications issues d'un contrat de recherche associant l'INSEP, l'Université de Nantes et le ministère en charge des sports (contrat n°07-006). Il a été rendu possible par l'acquisition d'un °chographe permettant d'enregistrer des images © haute fréquence (jusqu'à 10 kHz ; Aixplorer, version 5.0; Supersonic Imagine, Aix-en-Provence, France) par le laboratoire SEP en 2012. Cette technologie permet l'analyse de phénomènes très brefs comme ceux associés © des mouvements rapides. Elle offre l'opportunité d'accéder de manière fiable, non plus uniquement aux changements de longueurs des structures qui composent l'unité muscle-tendon comme dans notre étude précédente, mais aussi aux vitesses de raccourcissement et d'allongement exprimant les variations instantanées de longueurs des fascicules musculaires. À partir de données anthropométriques simples et de la mesure des angles articulaires, nous avons pu également accéder aux variations de longueur des tissus tendineux (Grieve et al., 1978). De plus, l'évolution des méthodes d'analyse, en particulier la validation d'un programme de suivi automatisé des fascicules musculaires au cours du mouvement (Cronin et al., 2011) a largement contribué © la faisabilité de ce travail. Enfin, l'accueil © l'INSEP de 3 étudiants en thèse au sein du Laboratoire MIP, que j'ai co-encadrés © cette occasion avec les collègues de l'Université de Nantes, nous a permis de rassembler une équipe de recherche dimensionnée aux objectifs expérimentaux visés.

Ainsi, nous avons mesuré, auprès de 17 participants, l'activité EMG, la longueur de l'unité muscle-tendon, des fascicules musculaires et des tissus tendineux du *gastrocnemius medialis*, ainsi que le couple de force produit lors de 10 séries de 30 contractions excentriques maximales des fléchisseurs plantaires effectuées en moyenne de 18° de flexion plantaire © -42° de flexion dorsale (0° = position neutre) © 45°.s⁻¹ sur ergomètre isokinétique (Fig. 7). Nous avons formulé l'hypothèse que la perte de force et le niveau de douleur musculaire seraient corrélés © l'amplitude de l'allongement des fascicules du *gastrocnemius medialis* induit par ces contractions excentriques maximales.

Nos résultats ont montré un allongement de l'unité muscle-tendon (4.44 © 0.33 cm, des fascicules musculaires (2.31 © 0.64 cm) et des tissus tendineux (1.92 © 0.61 cm), avec une variabilité des comportements notable entre les sujets (Fig. 8). En accord avec des données antérieures (Wakahara et al., 2009), l'allongement des fascicules a représenté plus de la moitié de l'allongement de l'unité muscle-tendon. Après un étirement constant en début de contraction (de 18° © -20°), les tissus tendineux restaient ensuite © une longueur quasi-constante en fin de mouvement. L'allongement des fascicules est intervenu de manière prépondérante en fin de contraction, avec une vitesse maximale d'étirement de 2.29 © 0.74 cm.s⁻¹ contre 4.26 © 1.43 cm.s⁻¹ pour les

tissus tendineux. L'amplitude des allongements mesuré lors de ces contractions excentriques maximales dépassait par ailleurs celles observées en sous-maximal au cours de la marche (Hoffman et al., 2014) et du pédalage (Penailillo et al., 2015).




Fig. 7. Avant (Pre), immédiatement après (Post) et 48h après l'exercice excentrique, le couple de force en flexion plantaire de la cheville (A) était mesuré lors d'une contraction isométrique maximale volontaire. La slack length ( $L_s$ ) du muscle *gastrocnemius medialis* était déterminée sous contrôle de l'activité EMG à partir de la relation entre le module d'élasticité mesuré par ostéographie (x) et l'angle articulaire (C). Lors des contractions excentriques, le couple de force (A), l'activité EMG de surface (B) et la longueur des fascicules musculaires (C) étaient mesurées en continu par échographie. Chaque lettre indique une correspondance entre le site de mesure présent sur la photographie centrale (dispositif expérimental) et les données collectées présentes dans les parties gauche (Tests) et droite (Exercice). © Guilhem et al. (2016).

Conformément à notre hypothèse, la longueur maximale d'étirement était significativement corrélée à la diminution de force (coefficients de corrélation  $r$  de Pearson de 0.51) et l'amplitude d'étirement était significativement corrélée à la sensation de douleur ( $r = 0.47$ ). Il est intéressant de noter que le travail négatif réalisés par les fascicules musculaires était encore plus fortement corrélé à la baisse de force à 48h ( $r = 0.68$ ). De plus, ces corrélations étaient également significatives lorsque l'allongement était exprimé relativement à la longueur correspondant à l'augmentation de la tension passive (slack length). Ce résultat montre que les altérations tissulaires induites par l'exercice résultent d'une contrainte qui dépasse les capacités d'élasticité du tissu considéré, en l'occurrence les fascicules musculaires. L'analyse de l'architectural gear ratio (AGR) confirme des changements de longueur plus importants dans la ligne d'action du muscle que dans celle du fascicule (AGR = 1.09), contribuant ainsi à rendre l'étirement de ce dernier. Pour autant, ce facteur n'était pas relié à la baisse de force ou au niveau de douleur post-exercice, suggérant un rôle limité de ce processus dans l'atténuation des dommages musculaires.




Fig. 8. Couple de force (A), longueur des fascicules musculaires (C) et activité EMG (D) du *gastrocnemius medialis* lors des séries 1 (en rouge) et 10 (en bleu) de contractions excentriques maximales des fléchisseurs plantaires. Le graphique B présente les courbes moyennes (0 ° cart-type en abscisses et en ordonnées) de la relation entre le couple de force et la longueur des fascicules musculaires. La ligne pleine représente l'angle au pic de couple de force et la ligne pointillée correspond à la *slack length* ( $L_s$ ). Les variations de longueur (E) et de vitesse d'allongement (F) de l'unité muscle-tendon (MTU), des fascicules musculaires, des fascicules dans la direction horizontale (HF) et des tissus tendineux (TT) sont présentées sans les cartes-types par souci de clarté. \*, effet significatif de l'angle. †, différence significative entre les séries 1 et 10. a, différence significative avec l'unité muscle-tendon. b, différence significative avec les tissus tendineux. c, différence significative avec les fascicules musculaires. ( $P < 0.05$ ). Diapason Guilhem et al. (2016).

En fin de contraction, alors que le couple de force est levé, le tendon est plus raide et la majeure partie de l'allongement est supportée par les fibres musculaires, qui sont à ce moment-là actives, comme le montrent nos données EMG. Ces données amènent trois conclusions : (i) les tissus tendineux agissent comme un tampon mécanique qui atténue le stress appliqué aux fibres et donc le niveau de dommages ; (ii) les interactions muscle-

tendon sont fortement influencés par les propriétés mécaniques individuelles tout comme les caractéristiques de la tâche (Hicks et al., 2013) ; (iii) la dernière phase de la contraction explique en grande partie les altérations subséquentes à l'exercice. Il apparaît cependant nécessaire de confirmer ces conclusions sur des tâches plus complexes réalisées à haute intensité et induisant des stress de nature différente comme le sprint, les sauts avec contre-mouvement, ou les sauts en contrebas. Ces travaux ont fait l'objet de prolongements publiés dans un numéro spécial coordonné par le Pr. Marco Narici, centré sur les effets de l'exercice excentrique<sup>15</sup>.

#### 2.2.4 Modulations de la commande nerveuse au cours d'un exercice traumatisant



Doguet V, Jubeau M, Dorel S, Couturier A, Lacourpaille L, Guével A, **Guilhem G.**  
Time-course of neuromuscular changes during and after maximal eccentric contractions.  
Front Physiol. 2016;16(7):137.

Bien que les dénements fonctionnels (e.g. perte de force, douleur) et physiologiques (e.g. ruptures de fibres musculaires, processus inflammatoires) soient bien décrits dans la littérature (Paulsen et al., 2012), les causes neuromusculaires des dommages induits par l'exercice restent mal comprises. Les recherches siétant intéressées à l'effet de répartition de session, qui fait référence aux moindres dommages induits à l'occasion d'une deuxième session d'exercice comparativement à la première, mettent en avant l'influence des facteurs nerveux sur l'amplitude des dommages musculaires (McHugh, 2003). Ainsi, les unités motrices de type I, plus résistantes aux dommages (Friden et al., 1983), sont recrutées en plus grand nombre lors de la seconde séance d'exercice. Des adaptations nerveuses peuvent être également observées au sein du membre controlatéral non sollicité pendant l'exercice excentrique (Starbuck et Eston, 2012), tandis que d'autres études ne rapportent aucune modification de la commande nerveuse au cours de contractions excentriques reportées (Hubal et al., 2007). Force est de constater par ailleurs que la plupart des travaux ont étudié les effets retardés des exercices traumatisants sur la fonction nerveuse, sans explorer les modifications des propriétés nerveuses au niveau central et périphérique pendant l'exercice. Mis en œuvre dans le cadre d'un contrat de recherche financé par la Région des Pays de la Loire (projet ANOPACy n°14-i-009) en collaboration avec Valentin Doguet, Arnaud Guével et Marc Jubeau (Université de Nantes), ce travail visait à quantifier l'activation volontaire et le couple de force «voqué», respectivement moins des altérations centrales et périphériques induites pendant et après des contractions excentriques maximales des fléchisseurs plantaires. Nous avons formulé l'hypothèse que le niveau de dommages était relié à l'activation volontaire mesurée pendant les contractions excentriques. Parallèlement, nous nous attendions à ce que les altérations périphériques soient reliées aux symptômes des dommages musculaires.

Au cours du deuxième protocole que celui présentement procédemment, le couple de force maximal volontaire, le couple de force «voqué» et l'activation volontaire ont été mesurés avant (Pre), pendant, immédiatement après (Post) et 48h après l'exercice excentrique (Fig. 9). Le couple de force excentrique volontaire a diminué (jusqu'à -36%) parallèlement à une baisse significative du couple de force «voqué» (jusqu'à -34%) et de l'activation volontaire (jusqu'à -13%) au cours de l'exercice. Il est à noter que le protocole utilisé lors de cette étude (300

<sup>15</sup> Physiology and clinical potential of eccentric exercise. Research topic in Frontiers Physiol. Edited by Narici M. Feb 2017.

contractions r<sup>°</sup>p<sup>°</sup>t<sup>°</sup>es) a n<sup>o</sup>cessairement induit des perturbations au niveau m<sup>°</sup>tabolique. Il est donc probable que dommages et fatigue musculaire aient contribu<sup>°</sup> de mani<sup>ère</sup> concomitante aux alt<sup>°</sup>rations de la fonction neuromusculaire (e.g. couplage excitation-contraction, excitabilit<sup>°</sup> spinale). Aussi les modifications observ<sup>°</sup>es au niveau central et p<sup>°</sup>riph<sup>°</sup>rique doivent <sup>2</sup>tre analys<sup>°</sup>es avec pr<sup>°</sup>caution.




Fig. 9. Tracés de couple de force obtenus lors de contractions maximales volontaires isométriques avant et immédiatement après un exercice excentrique maximal et pendant des contractions excentriques maximales. Les doubles-flèches indiquent les doublets de stimulations surimposées lors de la contraction et voqués au repos après une contraction isométrique (doublet potentialisé) ou pendant un cycle d'extension passif (doublet imposé en passif). D'après Doguet et al. (2016).

Contrairement à notre hypothèse, ni les changements p<sup>°</sup>riph<sup>°</sup>riques, ni l'activation centrale mesurée lors de l'exercice n'étaient reliés à l'apparition progressive des dommages musculaires. Ainsi, il semble que le système nerveux central ait une influence limitée sur l'altération de la fonction musculaire induite par l'exercice (Hubal et al., 2007). Toutefois, il est important de rappeler que l'activation volontaire peut refléter des mécanismes de régulation (e.g. facilitation des voies inhibitrices spinales) associés à la fatigue centrale, ce qui pourrait écorner l'existence d'un tel phénomène limitant la tension au sein des fibres (voir partie 2.2.1). En revanche, la réduction du couple de force potentialisé mesuré deux jours après l'exercice était significativement corrélée à la diminution de l'activation volontaire mesurée juste après l'exercice, montrant que plus l'activation volontaire est faible après l'exercice, moins les dommages musculaires sont importants. Ces résultats suggèrent

qu'un phénomène de préservation du muscle provenant des structures centrales serait à même d'atténuer les conséquences retardées de contractions excentriques intenses. D'autres investigations portant sur les régimes concentriques et isométriques semblent cependant nécessaires pour distinguer les contributions respectives des dommages (composante mécanique) et de la fatigue musculaire (composante physiologique) sur les réponses post-exercice excentrique. De telles investigations pourraient trouver un écho, par exemple dans les activités nécessitant des capacités de force et de résistance à la fatigue.

## Points clés

- ✓ Les travaux réalis°s au sein de ce premier axe ont permis de d°crire le comportement de l'unit°-muscle-tendon et les modulations de la commande nerveuses mises en jeu lors de contractions excentriques maximales.
- ✓ Nous avons d'abord montré un effet de la modalit° de r°sistance impos°e sur ces deux r°ponses, sugg°rant des adaptations neuromusculaires sp°cifiques lorsque l'exercice est r°p°t°.
- ✓ L'allongement et le travail fr°nateur effectu° par les fascicules musculaires lors de contractions maximales excentriques sont des facteurs d°terminants du niveau de dommages musculaires induits.
- ✓ Des m°canismes de r°gulation intervenant au niveau central semblent contribuer à pr°server le muscle des cons°quences d°l°t±res de l'exercice excentrique maximal.



6 articles publi°s dans des revues index°es ISI



2 contrats de recherche

Ministère charg° des sports, contrat n°07-006  
R°gion des Pays de la Loire, projet ANOPACy, contrat n°14-i-009



3 encadrements d°tudiants de niveau Doctorat

## 2.3 Plasticité du système neuromusculaire à l'exercice excentrique

### 2.3.1 État de la question

Intenses ou inhabituelles, les contractions excentriques peuvent induire une déorganisation et des microlésions du tissu musculaire. Au niveau cellulaire, ces dommages se caractérisent par une déorganisation de certains sarcomères et une perturbation de la ligne Z, associées à des lésions au niveau du sarcolemme, des tubules transverses et du réticulum sarcoplasmique (Lieber et al., 2002). En cas de lésions plus importantes des ruptures complètes de la ligne Z ou de la ligne A peuvent être constatées (Fig. 10). Les études réalisées *in vitro* ont démontré que les dommages musculaires pouvaient altérer le couplage excitation-contraction pendant près d'une semaine (Warren et al., 2001), les dégradations protéiques et de la matrice extracellulaire étant maximales après 5 jours ou plus. Ces altérations du cytosquelette sont classiquement considérées comme les principaux responsables d'une diminution des capacités de production de force (-10 à -60% selon les études), restaurée en une semaine dans la plupart des cas (Paulsen et al., 2012). À notre connaissance cependant, les conséquences des perturbations du couplage excitation-contraction et de la lyse protéique sur les capacités de production et de transmission de force n'avaient pas été investiguées *in vivo*, avant nos travaux.




Fig. 10. Représentation schématique de la cinétique de récupération des dommages musculaires et des processus cellulaires associés. D'après Paulsen et al. (2012).

Ces dégradations du tissu contractile engendrent un phénomène inflammatoire dans la région touchée et une sensation de douleur dans les heures et les jours qui suivent l'exercice. Ce phénomène appelé *Delayed Onset Muscular Soreness* (DOMS) survient dans les 12 à 48 h après l'exercice et connaît un pic entre 24 et 72 h avant de disparaître progressivement en 5 à 7 jours (Friden, 2002). Des limitations fonctionnelles liées à une diminution de l'amplitude articulaire et à une augmentation de la raideur des muscles sollicités peuvent également être constatées (Howell et al., 1993).

Les dommages musculaires induits par l'exercice ont fait l'objet d'une densité de travaux de recherche impressionnante dans les sciences des activités physiques et sportives. Pour autant, plusieurs aspects de notre compréhension de la réponse musculaire à des exercices intenses traumatisants restent incomplets. Nous savons par exemple que le couple de force passif augmente dès les premiers instants et dans les jours qui suivent l'exercice (Proske et Morgan, 2001). Cependant, la force passive résulte de contributions issues de différentes structures musculaires (i.e. agonistes, antagonistes) et non-musculaires comme les tendons, la peau, les structures articulaires et les ligaments (Herbert et al., 2011). Aussi, cette mesure globale ne renseigne pas directement sur les propriétés mécaniques individuelles des muscles sollicités. Les techniques d'ostéographie permettent aujourd'hui de mesurer le module d'élasticité d'un muscle ou d'une région d'un muscle (Gennisson et al., 2010). En utilisant l'ostéographie par résonance magnétique, Green et al. (2012) ont ainsi rapporté une augmentation de la raideur du *gastrocnemius medialis* et du *soleus*, respectivement 1 h et 48 h après un exercice de marche arrière en descente. Ces résultats suggèrent que les dommages induits par l'exercice ne sont pas homogènes entre les muscles, voire au sein d'un même muscle (Hedayatpour et Falla, 2012). Les muscles soumis à un travail frénateur peuvent en effet être tirés de manière hâtive, conduisant ainsi à une variabilité spatiale des dommages musculaires (Cleak et Eston, 1992; Takekura et al., 2001).

Afin de préserver l'unité muscle-tendon des dommages, de nombreux auteurs se sont intéressés à l'intérêt de techniques utilisées en amont (chauffement) ou après l'exercice (recuperation). D'une part, plusieurs études ont montré une augmentation de l'amplitude articulaire de mouvement suite à des protocoles de chauffement actif (e.g. pénétrage, tiralements actifs) ou passif (e.g. tiralements passifs, rouleau de massage) (McNair et Stanley, 1996; Wiktorsson-Moller et al., 1983). Les disciplines sportives sollicitant des mouvements amples pour lesquels les forces passives peuvent contribuer à la performance peuvent bénéficier de ces effets. De plus, le fait que l'amplitude articulaire (Witvrouw et al., 2003) et la raideur musculaire (Watsford et al., 2010) puissent être reliées au risque de blessure encourage l'identification de stratégies de chauffement optimales. Cependant, la littérature montre des effets variables ou contradictoires des méthodes de chauffement, en partie en raison du fait que l'amplitude et la raideur articulaire sont influencées par des facteurs mécaniques et nerveux, qui rendent complexe l'interprétation des résultats concernant les effets relatifs de la chauffement sur la raideur du muscle (Magnusson et al., 2000; McNair et Stanley, 1996).

D'autre part, l'application de froid (i.e. cryothérapie) sur les muscles sollicités a été la technique de récupération la plus souvent proposée pour réduire les conséquences négatives des dommages musculaires (Bleakley et al., 2012). En plus de son effet analgique, la cryothérapie contribue à réduire la formation de l'œdème, ralentit le métabolisme cellulaire et préserve les fibres musculaires qui juxtaposent les sites de microlésions de l'hypoxie locale induite par l'œdème local (Fig. 11) (Schaser et al., 2007). Exploitant ces résultats, plusieurs études ont évalué l'intérêt de l'application de froid pour accélérer la récupération après exercice traumatisant, avec des résultats contradictoires (Swenson et al., 1996). Ces données suggèrent une influence du niveau de dommages et de la technique de cryothérapie utilisée, qui peut conditionner le niveau de refroidissement des tissus, sur l'efficacité du traitement (Bleakley et Hopkins, 2010).




Fig. 11. Immunodétection de la desmine, protéine constitutive du muscle, sur des coupes du muscle *extensor digitorum longus* de rat, 24 h après exercice traumatisant avec ou sans cryothérapie. D'après Schaser et al. (2007).

Bien que les conséquences à court-terme de l'exercice excentrique puissent être délictueuses pour la performance, la répartition de cette forme d'exercice (i.e. entraînement) induit une augmentation de l'activation nerveuse et des adaptations au niveau cellulaire. La surcharge mécanique modifie en effet l'expression génique par les voies de mécanotransduction, induisant une hypertrophie musculaire et une augmentation des capacités de production de force (Franchi et al., 2014; Hentzen et al., 2006; Linke et Kruger, 2010). Dans leur étude, Green et al. (2012) reconnaissent que les caractéristiques de l'exercice sont également un facteur essentiel pouvant influencer la répartition du stress mécanique, la réponse à l'exercice et donc les adaptations musculaires. Dans mes travaux de thèse, nous avons montré que la modalité de résistance utilisée conditionne la réponse neuromusculaire à l'exercice. Sous l'influence de la gravité, l'exercice excentrique réalisée à charge constante applique une surcharge qui induit une activité EMG plus élevée qu'en isokinétique et stresse les structures élastiques de l'unité-muscle-tendon à des longueurs musculaires courtes, en début de mouvement (Guilhem et al., 2011). Aussi, il semble intéressant de considérer la modalité de résistance comme une variable d'entraînement à même de moduler les adaptations neuromusculaires visées.

### 2.3.2 Quantification des dommages musculaires induits par l'exercice excentrique

	Lacourpaille L, Nordez A, Hug F, Couturier A, Dibie C, <b>Guilhem G</b> . Time-course effect of exercise-induced muscle damage on localized muscle mechanical properties assessed using elastography. <i>Acta Physiol</i> . 2014;211(1):135-46.
	Lacourpaille L, Nordez A, Doguet V, Andrade R, Hug F, <b>Guilhem G</b> . Supersonic shear imaging as a non-invasive technique to early detect exercise-induced muscle damage. Under review in <i>J Appl Physiol</i> .
	Lacourpaille L, Nordez A, Doguet V, Hug F, <b>Guilhem G</b> . Effect of exercise-induced muscle damage on electromechanical delay. <i>Muscle Nerve</i> . 2016; 54(1):136-141.

Cette série de publications est issue d'une collaboration étroite avec Lilian Lacourpaille et son encadrement de thèse (François Hug, Antoine Nordez). Ces travaux avaient pour objectif de :

- quantifier les modifications des propriétés mécaniques dans différentes régions musculaires après exercice excentrique maximal, et évaluer la mesure du module de cisaillement par elastographie, et leur relation avec la longueur musculaire ;
- déterminer si le module de cisaillement pouvait refléter l'amplitude de la baisse de force et donc des dommages post-exercice ;
- évaluer l'impact d'un exercice traumatisant sur le délai électromécanique.

### Effets des dommages sur les propriétés mécaniques du muscle

La faisabilité de cette étude reposait en grande partie sur les possibilités techniques offertes par l'échographe Aixplorer acquis par le laboratoire SEP, en particulier la technique d'elastographie Supersonic Shear Imaging (SSI) (Bercoff et al., 2004). À l'image simpliste d'un caillou jeté dans l'eau, la technique d'elastographie consiste à exciter le tissu (i.e. muscle) par une impulsion mécanique brève induisant la formation de deux types d'ondes mécaniques : (i) les ondes de compression qui se déplacent très vite (1500 m/s) dans les tissus en les comprimant de proche en proche et (ii) les ondes de cisaillement qui se déplacent plus lentement (de 1 à 10 m/s). La vitesse des ondes de cisaillement est directement reliée à la dureté du tissu selon l'équation  $\mu = \rho V_s^2$ , où  $\mu$  est le module de cisaillement,  $\rho$  la masse volumique du milieu et  $V_s$  la vitesse de propagation des ondes de cisaillement. Briefement, la technique SSI consiste à focaliser les ultrasons successivement à des profondeurs différentes pour créer des poussées par pression de radiation (pushes). En régime supersonique (quand la source se déplace plus vite que les ondes qu'elle génère), les ondes de cisaillement s'ajoutent de manière cohérente le long d'un cône de Mach entier (Fig. 12). Le second principe de la méthode SSI repose sur la mesure du déplacement de ces ondes de cisaillement par échographie ultrarapide (fréquence d'acquisition jusqu'à 20 000 Hz). L'hypothèse d'un matériau linéaire est bien acceptée dans les études utilisant cette technique pour étudier les propriétés du muscle (Bercoff et al., 2004; Hug et al., 2015b). Des cartes représentant le module de cisaillement sont ensuite obtenues à une fréquence d'une carte par seconde (1 Hz) avec une résolution spatiale de 1 à 1 mm.




Fig. 12. Principe de la technique é Supersonic Shear Imaging (SSI). Les ultrasons sont focalisés successivement à des profondeurs différentes pour créer des poussées par pression de radiation ("pushes"). Les interférences constructives des ondes de cisaillement forment un cône de Mach supersonique dans lequel la vitesse de la source est supérieure à celle de l'onde générée et une onde plane de cisaillement est créée. L'échographe passe ensuite en mode d'imagerie ultrarapide pour suivre l'onde de cisaillement qui se propage dans le milieu. D'après la thèse de T. Deffieux (2008).

Ainsi, nous avons mesuré en conditions statique et passive le module de cisaillement du *biceps brachii* et du *brachialis* de 16 participants avant, 1h, 48h et 21 jours après 3 séries de 10 contractions excentriques maximales des fléchisseurs du coude effectuées sur ergomètre isokinétique à  $120^{\circ}\text{s}^{-1}$ . L'édème induit par l'exercice pouvant contribuer à augmenter la pression intramusculaire locale, nous avons utilisé l'imagerie par résonnance magnétique pour mesurer en parallèle le niveau de  $T_2$ , reflétant la quantité de liquide au sein du tissu (i.e. l'édème, Fig. 13). Afin d'apprendre la distribution spatiale des effets de l'exercice, ces deux variables ont été mesurées dans différents sites du *biceps brachii* (i.e. régions proximale, médiale, distale). L'effet de la longueur musculaire sur les variations du module d'elasticité a été appréhendé par des mesures à différents angles du coude et lors de cycles d'étirement passif.

Nos résultats ont montré une augmentation précoce du module de cisaillement (+46% en moyenne) en l'absence de variation significative du  $T_2$ , démontrant ainsi que les modifications précoces de la raideur musculaire ne peuvent être imputées à l'édème intramusculaire (Whitehead et al., 2001). L'augmentation du module de cisaillement était plus élevée et durable (jusqu'à 21 jours) aux longueurs musculaires élevées. Ces effets étaient observés dans des proportions similaires dans les différents sites du *biceps brachii* et au sein du *brachialis*, infirmant l'hypothèse d'une variabilité spatiale des dommages musculaires sur la base de cet indicateur.




Fig. 13. Exemple typique de mesures du  $T_2$  par IRM (a) et du module de cisaillement par la technique SSI (b) sur le *biceps brachii* avant (PRE), 1 h, 48 h et 21 jours post-exercice excentrique des fléchisseurs du coude. L'augmentation du niveau de gris observable à 48 h par l'IRM indique la présence d'un édème. La région en couleurs représente la carte d'elasticité (échelle en kPa à droite). D'après Lacourpaille et al. (2014).

Ces adaptations s'inscrivent dans la ligne des travaux ayant mis en avant une perturbation de l'homéostasie calcique post-exercice excentrique (Chen et al., 2007). En effet, les dommages infligés notamment aux membranes induisent une libération de calcium dans le milieu intramusculaire, pouvant provoquer : (i) une activation de faible intensité responsable d'une augmentation de la tension passive (Morgan et Allen, 1999) et (ii) le phénomène titine-dépendant d'augmentation de la force résiduelle à l'étirement (Herzog et al., 2014). Bien que l'amplitude de ces processus augmente à mesure que le muscle est étiré (Stephenson et Wendt, 1984), notre étude leur confère un rôle significatif dans les modifications de raideur musculaire induites par les dommages.

Nos travaux ont depuis connu des prolongements puisqu'au moins deux études ont analysé les modifications de l'élasticité musculaire par élastographie, après un exercice traumatisant, l'une après des contractions excentriques fléchisseurs plantaires (Yanagisawa et al., 2015), et après le Tor des Géants. Cette course d'ultra-trail de 330 km qui a lieu tous les ans dans la vallée de l'Aoste, inclue 24 km de dénivelé positif et négatif cumulés (Andonian et al., 2016). Si la première étude confirme nos conclusions, la seconde montre des résultats inverses, avec une diminution du module de cisaillement après la course, suggérant des réponses spécifiques à l'exercice réalisées.

### Dtection non-invasive des dommages musculaires

La quantification précise des dommages musculaires requiert l'analyse de biopsies musculaires pour déterminer le nombre de myofibrilles dégradées (Raastad et al., 2010). Cette procédure invasive reste peu adaptée à une utilisation de routine, dans la pratique sportive ou clinique. À l'inverse, la perte de force mesurée à 48 h, bien qu'étant l'indicateur le plus communément utilisé pour mesurer le niveau de dommages global, ne permet pas d'évaluer les altérations induites dans chacun des muscles sollicités par l'exercice. Dans le prolongement de l'étude précédente, ce travail avait pour objectif de déterminer : (i) si les variations de module de cisaillement mesurées 30 min post-exercice permettent de prédire la perte de force musculaire à 48 h et (ii) si les muscles synergistes sont affectés de manière similaire par l'exercice. Cinquante-trois participants ont ainsi effectué des exercices sur ergomètre selon cinq conditions différentes :

- contractions concentriques maximales des fléchisseurs du coude (contrôle) ;
- contractions excentriques maximales des fléchisseurs du coude avec une charge modérée ;
- contractions excentriques maximales des fléchisseurs du coude avec une charge élevée ;
- contractions excentriques maximales des extenseurs du genou avec une charge modérée ;
- contractions excentriques maximales des extenseurs du genou avec une charge élevée.

Nos résultats ont confirmé l'augmentation du module de cisaillement post-exercice, excepté pour le groupe contrôle. L'augmentation relative du module de cisaillement mesurée à 30 min était fortement corrélée à la baisse de force à 48 h pour les fléchisseurs du coude ( $r = 0.80$ ) et les extenseurs du genou ( $r = 0.82$  ; Fig. 14). Ces données viennent conforter l'hypothèse du rôle du calcium dans l'augmentation de raideur post-exercice. La quantité de calcium libéré est conditionnée par le niveau de dégradation des membranes cellulaires et donc par l'amplitude des dommages musculaires (Whitehead et al., 2001). Tenant compte que la baisse de force est reliée au nombre de fibres dégradées (Raastad et al., 2010), il est raisonnable de penser que l'augmentation du module de cisaillement reflète le niveau de dommages. Une analyse complémentaire suggère par ailleurs que le *biceps brachii* et le *rectus femoris* sont plus susceptibles d'être affectés par les dommages comparativement à leurs synergistes. Ces différences peuvent être attribuées aux propriétés anatomiques (bi-articulaires) et structurales (typologie) spécifiques de ces muscles (Kulig et al., 2001). Cette étude montre que le module de cisaillement reflète de manière précoce le niveau de dommages musculaires induits et peut servir d'être un marqueur utile pour les entraîneurs et les cliniciens souhaitant estimer l'impact d'un exercice traumatisant.




Fig. 14. Corr°lations significatives ( $P < 0.05$ ) entre l'augmentation relative du module de cisaillement et la diminution relative de la force isom°trique maximale volontaire.

#### Impact d'un exercice traumatisant sur le d°lai °lectrom°canique

Le d°lai °lectrom°canique correspond au temps compris entre le d°but de l'activation et le d°but de la production de force (Cavanagh et Komi, 1979). Ce d°lai est influenc° par des processus °lectrochimiques (transmission synaptique, couplage excitation contraction) et m°caniques (transmission de la force). A l'aide d'une m°thode innovante bas°e sur l'utilisation de l'imagerie haute-fr°quence, Nordez et al. (2009) ont pu déterminer les contributions relatives des composantes °lectrochimiques (i.e. d°lai entre la stimulation °lectrique et d°but du raccourcissement des fascicules musculaires) et m°caniques (i.e. d°lai entre le d°but du mouvement du fascicule et le d°but de la production de force) au d°lai °lectrom°canique (Fig. 15). Exploitant cette technique, Lacourpaille et al. (2015) ont montré une alt°ration des capacit°s de transmission de force chez des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne, montrant la sensibilit° de la technique aux atteintes tissulaires.




Fig. 15. Repr°sentation sch°matique des d°lays entre la stimulation musculaire et le d°but de la production de force (i.e. le d°lai °lectrom°canique). Diapr±s Nordez et al. (2009).

Aussi, le but de cette °tude °tait de déterminer les effets d'une atteinte fonctionnelle non-pathologique telle que les dommages induits par l'exercice excentrique sur les diff°rentes composantes du d°lai

<sup>°</sup>lectrom<sup>°</sup>canique du *gastrocnemius medialis*. Nous avons fait l<sup>l</sup>hypoth<sup>è</sup>se que le d<sup>o</sup>lai <sup>°</sup>lectrom<sup>°</sup>canique serait augment<sup>°</sup> 1 h apr<sup>s</sup> l<sup>l</sup>exercice, en raison d<sup>u</sup>un allongement des processus de transmission synaptique, du couplage excitation-contraction et de la transmission de force. R<sup>o</sup>alis<sup>°</sup>e aupr<sup>s</sup> de 15 participants dans le cadre du projet ANOPACy, financ<sup>°</sup> par la R<sup>o</sup>gion des Pays de la Loire, cette <sup>°</sup>tude n<sup>o</sup>a montr<sup>°</sup> aucun effet des dommages musculaires sur les diff<sup>erentes</sup> composantes du d<sup>o</sup>lai <sup>°</sup>lectrom<sup>°</sup>canique. Bien que ces r<sup>es</sup>ultats aient <sup>°</sup>t<sup>o</sup> discut<sup>°</sup>s d<sup>u</sup>un point de vue m<sup>é</sup>thodologique (puissance statistique, sensibilit<sup>°</sup> de la m<sup>é</sup>thode), les donn<sup>ées</sup> issues de la litt<sup>érature</sup> ainsi que les travaux de notre groupe sugg<sup>erent</sup> que la technique utilis<sup>°</sup>e est suffisamment sensible pour d<sup>etecter</sup> de faibles modifications des diff<sup>erentes</sup> composantes du d<sup>o</sup>lai <sup>°</sup>lectrom<sup>°</sup>canique. Toutefois, il est possible que le niveau de dommages puisse influencer les alt<sup>erations</sup> des processus <sup>°</sup>lectrochimiques et la transmission de force du muscle vers les leviers osseux.

### 2.3.3 Effet de l'échauffement sur la raideur musculaire



Morales-Artacho A, Lacourpaille L, Guilhem G.

Effects of warm-up on hamstring muscles stiffness: cycling vs. foam rolling.

Scand J Med Sports Sci. 2017;[Epub ahead of print].

Li<sup>l</sup>chauffement actif ou passif est une m<sup>é</sup>thode tr<sup>ès</sup> r<sup>apide</sup> pour accroître la capacit<sup>°</sup> du muscle <sup>à</sup> supporter des contraintes d<sup>u</sup>tirement et le pr<sup>é</sup>server ainsi des dommages musculaires ou r<sup>é</sup>duire le risque de blessure (McGowan et al., 2015; McNair et Stanley, 1996). Cependant, les param<sup>ètres</sup> permettant de quantifier l<sup>l</sup>effet de li<sup>l</sup>chauffement sur les propri<sup>ét</sup>és muscle-tendon sont souvent influenc<sup>és</sup> par des structures musculaires et non-musculaires qui complexifient l<sup>l</sup>identification des effets sur la raideur du muscle (Herbert et al., 2011). Le but de cette <sup>°</sup>tude <sup>à</sup>tait de d<sup>eterminer</sup> les effets de diff<sup>erentes</sup> strat<sup>egies</sup> d<sup>u</sup>chauffement sur la raideur musculo-articulaire globale (refl<sup>o</sup>t<sup>é</sup> par la mesure du couple de force passif) et sur la raideur de trois muscles fl<sup>ochisseurs</sup> du genou (mesur<sup>é</sup> par <sup>°</sup>lastographie SSI, Fig. 16). Nous avons ainsi test<sup>é</sup> les effets de trois m<sup>é</sup>thodes :

- P<sup>o</sup>dalage sous-maximal incluant des sprints ;
- Massage avec rouleau de compression ;
- P<sup>o</sup>dalage suivi du massage avec rouleau de compression.

Nos r<sup>es</sup>ultats ont montr<sup>°</sup> une diminution du module de cisaillement apr<sup>s</sup> p<sup>o</sup>dalage (-10.3%) et la combinaison des deux techniques (-7.7%), confirm<sup>é</sup>e par une diminution du couple de force passif (-7.2% et -6.2% en moyenne) et une augmentation de l<sup>l</sup>amplitude articulaire de mouvement (+2.9 et +3.2% en moyenne). Ces effets <sup>à</sup>taient prolong<sup>s</sup> 30 min apr<sup>s</sup> la combinaison des deux techniques. Le massage avec rouleau de compression a induit une faible diminution du module de cisaillement (-5.4% en moyenne). Notre <sup>°</sup>tude sugg<sup>re</sup> que l<sup>l</sup>addition d<sup>u</sup>un stimulus passif n<sup>o</sup>induit pas d<sup>l</sup>effet sup<sup>érieur</sup> au p<sup>o</sup>dalage, montrant le r<sup>ôle</sup> fondamental de li<sup>l</sup>chauffement actif pour diminuer la raideur musculaire. Par ailleurs, le temps entre la fin de li<sup>l</sup>chauffement et le d<sup>o</sup>but de l<sup>l</sup>exercice doit <sup>être</sup> pris en consid<sup>eration</sup> pour optimiser les routines d<sup>u</sup>chauffement. Cette d<sup>o</sup>marche peut permettre <sup>à</sup> terme de contribuer <sup>à</sup> la r<sup>é</sup>duction du risque de blessure des ischio-jambiers, particuli<sup>erement</sup>

expos°s aux l°sions (Opar et al., 2012). A noter que cette °tude a soulev° un int°r°t certain au sein de la communaut° des sciences appliqu°es au sport<sup>16</sup>, certainement en raison du caract°re actuel du sujet.




Fig. 16. Mesures du module de cisaillement mesur° sur par °lastographie SSI avant (Pre), 5 min et 30 min apr±s un °chauffement en combinant p°dalage et massage avec rouleau de compression sur les muscles *semimembranosus* (A), *semitendinosus* (B) et *biceps femoris* (C). Diapr±s Morales-Artacho et al. (2017).

### 2.3.4 Impact du froid sur la fonction musculaire

**Guilhem G, Hug F, Couturier A, Regnault S, Bournat L, Filliard JR, Dorel S.**  
Effects of air-pulsed cryotherapy on neuromuscular recovery subsequent to exercise-induced muscle damage.  
Am J Sports Med. 2013;41(8):1942-51.

**Point M, Guilhem G, Hug F, Nordez A, Frey A, Lacourpaille L.**  
Does cryotherapy affect muscle stiffness in vivo?  
Scand J Med Sports Sci;[Epub Ahead of Print]

R°alis°s dans le cadre du contrat de recherche n°07-006 associant l°INSEP, l°Universit° de Nantes et le minist°re charg° des sports, ces travaux ont cherch° c° d°terminer les effets de la cryoth°rapie par air froid puls° :

- sur la r°cup°ration musculaire apr±s exercice traumatisant ;
- sur la raideur musculaire au repos.

#### Effet du froid sur la r°cup°ration neuromusculaire

En utilisant les techniques d°IRM et d°EMG haute densit° (64 voies), nous avons °valu° l'effet de l'air froid puls° (-30°C) sur la distribution spatiale de l°d°me et de l°activit° musculaire du *biceps brachii* apr±s trois

<sup>16</sup> Plus de 1000 t°l°chargements en 2 semaines sur le site Researchgate.

s'ries de 20 contractions excentriques maximales des fl°chisseurs du coude (Fig. 17). L'impact sur les dommages musculaires a également été appr°cié par la mesure des DOMS, de la force maximale volontaire et de diff°rents marqueurs plasmatiques (creatine kinase, prot°ine C-r°active, interleukine 6).




Fig. 17. Evolution de l'odème ( $T_2$ ) mesuré par IRM (A) et de la distribution de l'activité EMG de surface du biceps brachii après exercice traumatisant avec (CRYO) et sans (CONT) application d'air froid pulsé (-30°C) immédiatement après et pendant les 4 jours qui suivent l'exercice. D'après Guilhem et al. (2013b).

Bien que certains symptômes des dommages musculaires après exercice excentrique intense (i.e. formation de l'odème local, diminution de l'activité musculaire) aient tardé, nos résultats montrent que l'application répétée d'air froid pulsé ne permet pas d'améliorer la récupération musculaire pendant les deux semaines qui suivent l'exercice traumatisant. Cette étude s'inscrit dans la tendance actuelle des recherches qui questionnent de plus en plus l'intérêt de la cryothérapie pour réduire les conséquences des dommages musculaires (Costello et al. 2012).

#### Effet du froid sur la raideur musculaire

Ce travail a fait l'objet d'un stage de Master 2 co-dirigé avec Lilian Lacourpaille, en collaboration avec Alain Frey, responsable du Département Médical de l'INSEP.

Si l'augmentation de raideur d'un tissu est bien connue dans la littérature, elle a surtout été démontrée par des études *ex vivo* (Sapin-de Brosses et al., 2010). Tenant donc l'utilisation de la cryothérapie pendant les

compétitions (Bleakley et al., 2012), il semblait intéressant de déterminer ses effets sur la raideur musculaire, suggérée comme étant facteur de risque de blessure. Cette étude visait à utiliser la technique d'elastographie SSI afin de déterminer l'impact de l'application de froid sur la raideur musculaire. Le couple de force passif, le module de cisaillement et la température intramusculaire ont donc été mesurés sur le *gastrocnemius medialis* avant, pendant un traitement d'air froid pulsé de 4 fois 4 min, et pendant les 40 min suivant l'application de froid (Fig. 18). Nous avons également vérifié que le muscle restait au repos pendant le traitement en mesurant l'activité EMG.




Fig. 18. Dispositif expérimental permettant de mesurer simultanément la température intramusculaire et le module de cisaillement par elastographie SSI. D'après Point et al. (en révision).

Alors que la température intramusculaire a diminué de 7°C, le module de cisaillement a augmenté significativement de 12% en moyenne après la deuxième application de froid, avec un pic de 35% d'augmentation à 30 min et une valeur toujours supérieure à la valeur initiale en fin de protocole. Ainsi, le niveau d'étirement que le muscle est en capacité de supporter sans lésion est diminué par la cryothérapie. Nos travaux ont montré que la raideur musculaire peut également augmenter si l'exercice réalisée avant cryothérapie est gèneur de dommages (Lacourpaille et al., 2014), réduisant encore la capacité d'étirement du muscle. Après exercice traumatisant, cette méthode de récupération devrait donc être réduite ou proscrite sur les muscles les plus exposés au risque de blessure, ou suivie immédiatement d'un chauffement adapté.

Depuis ces travaux, nous savons également que l'application de froid (i.e. par immersion) n'est pas plus efficace que la récupération active pour réduire la réponse inflammatoire et la réponse au stress après une séance d'entraînement en force (Peake et al., 2017). De plus, lorsque cette technique est utilisée après l'entraînement musculaire de manière répétée (12 semaines), elle peut réduire la réponse anabolique et donc l'hypertrophie musculaire (Roberts et al., 2015). Sans que cela ne remette en cause l'effet analgique du froid (Bleakley et al., 2012; Costello et al., 2012), l'ensemble de ces données à haut niveau d'évidence scientifique

soulèvent la nécessit° de remettre © jour les recommandations pratiques relatives © cette m°thode de r°cup°ration, qui peut parfois ²tre hon°reuse (e.g. cryoth°rapie corps entier)<sup>17</sup>.

### 2.3.5 Adaptations neuromusculaires induites par l'entraînement excentrique



Guilhem G, Cornu C, Maffuletti NA, Gu°vel A.  
Neuromuscular adaptations to isoload versus isokinetic eccentric resistance training.  
Med Sci Sports Exerc. 2013;45(2):326-35.

Cette étude réalis°e en fin de thèse de doctorat visait © d°terminer les adaptations neuromusculaires induites par l'entraînement excentrique isoinertielle vs. isocin°tique, © m°me quantit° de travail et de vitesse moyenne de mouvement. Nos résultats ont montré que la modalit° isoinertielle favorisait les gains de force aux longueurs musculaires courtes (+20%) et la force excentrique © haute vitesse. Ces am°liorations de la performance musculaire ont ²t° accompagn°es d'une augmentation de la largeur (i.e. volume) musculaire et de l'angle de pennation uniquement après entraînement isoinertielle. Les différences de contrainte m°canique entre les deux modalit°s, en particulier l'acc°l°ration et la force plus importantes en isoinertielle © courte longueur musculaire sont ainsi des déterminants des adaptations neuromusculaires © l'entraînement excentrique. Ces résultats présentent des applications importantes dans la programmation de l'entraînement musculaire, © vis°e d'optimisation mais aussi de pr°vention (Isner-Horobeti et al., 2013). En effet, l'entraînement excentrique isocin°tique semble © favoriser en d°but de reprise d'activité, tandis que l'entraînement isoinertielle doit ²tre privil°gi° pour d°velopper la force maximale, en particulier dans les activit°s mobilisant des angles de genou fl°chis.

<sup>17</sup> Cold therapy? Maybe better save your Money. New York Times, édition du 2 Janvier 2017.

## Points clés

- ✓ Les travaux réalisés sur cette thématique ont mis en évidence des altérations des propriétés mécaniques et contractiles du muscle rarement explorées *in vivo*.
- ✓ La raideur du muscle augmente significativement après un exercice traumatisant. Cette augmentation est fortement reliée au niveau de dommages induits. Globalement, nos résultats suggèrent un rôle prépondérant de la perturbation de l'homéostasie calcique et des interactions actine-titine dans les modifications de raideur observées, en particulier lorsque le muscle est étiré.
- ✓ Des dommages musculaires modérés ne semblent pas affecter les différentes composantes du déplacement électromécanique.
- ✓ Lorsque la contrainte excentrique est importante, les adaptations neuromusculaires induites aux longueurs musculaires courtes sont plus marquées lorsqu'une résistance isoinertielle est utilisée comparativement à un entraînement isokinétique.



7 articles publiés dans des revues indexées ISI



2 contrats de recherche  
Ministère chargé des sports, contrat n°07-006  
Région des Pays de la Loire, projet ANOPACy n°14-i-009)



4 encadrements d'étudiants de niveau Doctorat dont un stage international  
1 encadrement d'étudiante de niveau Master

## 2.4 Relations entre propriétés musculaires et performance à haute-intensité

### 2.4.1 État de la question

Les capacités musculaires sont fondamentales pour la santé, les habiletés fonctionnelles, l'amélioration et la préservation de la qualité de vie (American College of Sports, 2009). Dans ce contexte, la force des muscles du tronc (en particulier les fléchisseurs et les extenseurs) est déterminante dans le maintien de la posture, la stabilité du tronc et préserve les structures passives de contraintes excessives (Andersson et al., 1988). L'évaluation de cette capacité, bien que complexe, est essentielle dans la pratique clinique et scientifique © des fins de diagnostic, de détection ou de prédiction des atteintes musculo-articulaires (Yahia et al., 2011). Par ailleurs, la force des extenseurs et fléchisseurs du tronc peut constituer un facteur limitant dans des tâches motrices très utilisées en évaluation (e.g. saut vertical chargé) (Bobbert, 2014) ou lors de la pratique sportive (e.g. maintien de la position en voile) (Maisetti et al., 2006).

Dans la performance sportive, les qualités de puissance et de vitesse, souvent essentielles, ne sont pas toujours appréhendées et leur évaluation pas nécessairement optimisée (Morin et Samozino, 2015). Lors d'un saut vertical, la vitesse atteinte lorsque l'on quitte le sol est reliée © la puissance que le muscle peut générer, définie comme le produit de la force qu'il exerce et de sa vitesse de raccourcissement. Selon la fonction hyperbolique qui lie la force © la vitesse sur muscle isolé, la force produite diminue avec l'augmentation de la vitesse de raccourcissement (Hill, 1938). Lors de tâches fonctionnelles mobilisant une combinaison d'articulations (e.g. saut, course © pied, pédalage), cette relation est quasi-linéaire (Cormie et al., 2011). La puissance maximale, calculée © partir de cette relation, est corrélée © la performance sportive dans de nombreuses disciplines. Les méthodes permettant son évaluation se sont multipliées ces dernières années (e.g. capteur de position, accéléromètre) et peuvent être utilisées en conditions simples sur le terrain sportif. Récemment, Samozino et al. (2008) ont développé une méthode simple basée sur des mesures anthropométriques et la hauteur de saut pour calculer la puissance produite. Toutefois, la plupart de ces méthodes n'ont été testées que dans une condition de charge unique, ce qui nécessite d'établir leur validité-reproductibilité pour évaluer l'ensemble de la relation force-vitesse.

Les liens entre les propriétés neuromusculaires et musculo-tendineuses sur la performance lors de tâches motrices maximales comme le saut vertical représentent un domaine qui connaît un engouement certain dans la littérature scientifique ces dernières années (Cormie et al., 2011). Le rôle des coordinations musculaires ou des interactions muscle-tendon vis-à-vis de la performance en saut est par exemple peu décrit, alors que ces connaissances sont essentielles pour identifier et contrer (via l'entraînement) les facteurs limitant cette performance.

### 2.4.2 Validité de méthodes d'évaluation innovantes des capacités musculaires



**Guilhem G, Giroux C, Couturier A, Maffuletti NA.**

Validity of trunk extensor and flexor torque measurements using isokinetic dynamometry.

J Electromogr Kinesiol. 2014;24(6):986-93.



**Giroux C, Rabita G, Chollet D, Guilhem G.**

What is the best method for assessing lower limb force-velocity relationship?

Int J Sports Med. 2015;36(2):143-149.

Ces deux études ont été réalisées pendant la thèse de Caroline Giroux, en partie en collaboration avec Nicola Maffuletti (Clinique Schälthess de Zürich). Elles avaient pour objectif d'évaluer la validité et la reproductibilité (i) d'un ergomètre isokinétique permettant d'évaluer la force des extenseurs et fléchisseurs du tronc ; (ii) des méthodes permettant de mesurer la relation force-vitesse en saut vertical sur le terrain.

#### Validité et reproductibilité des mesures de force des extenseurs et fléchisseurs du tronc

Sur 15 participants, cette étude a montré une corrélation forte entre (i) le couple de force maximal (i.e. excentrique, isométrique et concentrique) mesuré à l'aide d'un module permettant d'évaluer la force des muscles du tronc (Con-Trex TP-1000, CMV AJ, D'Abendorf, Suisse ; Fig. 19) et la surface de section transversale des muscles fléchisseurs et extenseurs du tronc mesurée par IRM ( $r = 0.74-0.85$ ) ; (ii) l'activité EMG et le couple de force mesurés lors de rampes de contractions isométriques ( $r > 0.99$ ). La reproductibilité des mesures de couple de force maximale était satisfaisante, avec des coefficients de corrélation intra-classe supérieurs à 0.87. Ces résultats établissent la validité des mesures de force des extenseurs et fléchisseurs du tronc obtenues à partir de ce module. étant donné l'excellente reproductibilité des mesures de couple de force, cette dernière génération d'ergomètre peut être proposée pour évaluer la fonction des muscles du tronc à visée clinique ou sportive. Cet outil a été utilisé à la Clinique Schälthess de Zürich pour mettre en évidence les différences de force entre des navigateurs de haut-niveau et des navigateurs novices (Friesenbichler et al., 2016).



Fig. 19. Vue de face, de côté et de côte du module tronc Con-Trex TP-1000 (a) connecté au moteur (b). L'activité musculaire des muscles *rectus abdominis* (c) and *erector spinae* était enregistrée et synchronisée avec les mesures mécaniques issues de l'ergomètre.

### Comparaison des méthodes d'évaluation de la relation force-vitesse en saut vertical

Pour cette étude, les relations force-puissance-vitesse ont été évaluées en saut vertical auprès de 17 participants à l'aide d'un accéléromètre, d'un capteur de position et de la méthode Samozino (Fig. 20). Les mesures issues de ces outils ont été confrontées à celles obtenues avec une plate-forme de force, utilisée comme méthode de référence. Nos résultats ont montré une validité comparable pour l'ensemble des méthodes testées, avec des coefficients de variation allant de 6.4% à 14.5%. Les patrons de force, vitesse et puissance confirment ce résultat avec des différences notables pour les mouvements réalisés à haute vitesse, et une concordance plus faible pour la vitesse et la puissance. La méthode Samozino présente la reproductibilité la plus élevée, avec des CV compris entre 2.7% et 8.6%. Cette étude montre que les accéléromètres et capteurs de position peuvent être utilisés pour analyser les patrons des variables cinétiques, tandis que la méthode Samozino fonctionne bien mise en œuvre simple et de résultats reproductibles. Ces méthodes peuvent donc être utilisées pour évaluer les capacités musculaires et déterminer les effets de protocoles d'entraînement. Nous avons néanmoins observé des patrons mécaniques variables lorsque les mouvements sont réalisés à haute vitesse. Il serait aussi intéressant de savoir si ce résultat pourrait être la conséquence de différentes coordinations musculaires d'un essai à l'autre et si cette variabilité est influencée par le niveau de charge (Bobbert, 2014; Gregoire et al., 1984).




Fig. 20. Dispositif expérimental présentant l'ensemble des outils testés.

#### 2.4.3 Facteurs musculaires influençant la performance explosive



Giroux C, Guilhem G, Chollet D, Rabita G.  
Is muscle coordination affected by loading condition in ballistic movements?  
J Electromyogr Kinesiol. 2015;25:69-76.



Hauraix H, Nordez A, Guilhem G, Rabita G, Dorel S.  
In vivo maximal fascicle-shortening velocity during plantar flexion in humans.  
J Appl Physiol. 2015;119(11):1262-71



Hauraix H, Dorel S, Rabita G, Guilhem G, Nordez A.  
Muscle fascicle shortening behavior of vastus lateralis during a maximal force-velocity test.  
Eur J Appl Physiol. [Epub ahead of print]

Cette partie de nos travaux s'est focalisé sur cette question afin de mieux comprendre les déterminants musculaires de la performance explosive. L'expérience de notre groupe de recherche nous a permis d'exploiter des compétences en recueil et interprétation du signal EMG. Cette méthode permet d'accéder aux coordinations musculaires, définies comme la distribution des activations ou des forces parmi les muscles sollicités pour produire une combinaison de couple de force donnée (Prilutsky, 2000). Nous nous sommes aussi appuyés sur les méthodes présentées précédemment pour investiguer le comportement du muscle et des tissus tendineux, dont les propriétés peuvent influencer la performance au cours du geste. Les productions issues de ce travail incluent principalement des contributions en tant que co-auteur. Aussi, cette partie très synthétique a pour objet de sensibiliser le lecteur à l'émergence de cette thématique en vue des projets développés dans le chapitre 4.

Brièvement, nous avons mis en évidence que la charge n'influence pas les coordinations musculaires des membres inférieurs lors d'un squat balistique, i.e. réalisant de manière maximale avec projection. Ces résultats suggèrent que la sollicitation du système neuromusculaire est similaire quel que soit le niveau de charge imposé aux muscles. L'intention de réaliser le mouvement le plus vite possible semble donc un élément déterminant pour induire une production de puissance la plus élevée possible (Behm et Sale, 1993). Aussi, les effets induits par des entraînements balistiques à différentes intensités pourraient être évalués. Ces résultats nécessiteraient d'être complétés avec une analyse des activations des muscles du tronc, en particulier en condition chargée.

Dans le cadre de notre collaboration avec l'Université de Nantes, j'ai ensuite participé à 2 études réalisées par Hugo Hauraux dans le cadre de sa thèse de doctorat. L'ambition de ces expérimentations était de développer une méthode permettant de mesurer la vitesse maximale de raccourcissement des fascicules musculaires pour la première fois *in vivo* lors de tâches mono-articulaires et de tester les liens avec la vitesse articulaire maximale et les propriétés musculo-articulaires. En utilisant l'échographie haute-fréquence, nous avons ainsi pu mesurer la vitesse maximale de raccourcissement du *gastrocnemius medialis* (29.4 cm.s<sup>-1</sup> en moyenne) et du *vastus lateralis* (34.6 cm s<sup>-1</sup> en moyenne), qui était très proche de la vitesse maximale ( $V_{max}$ ) obtenue à partir du modèle de Hill (1938) pour le *gastrocnemius medialis* (30.8 cm s<sup>-1</sup> en moyenne). La valeur de  $V_{max}$  était d'ailleurs significativement corrélée à la vitesse maximale articulaire, confirmant le rôle fondamental de la typologie du muscle vis-à-vis de cette capacité de production de vitesse maximale (Bottinelli et al., 1996). En revanche, aucun paramètre biométrique n'était relié à la vitesse maximale de raccourcissement, démontrant la complexité des facteurs qui sous-tendent la réalisation de contractions musculaires à vitesse maximale. Ces travaux ont ouvert la voie à l'exploration des facteurs biométriques limitant la performance, et notamment la production de vitesse, lors de tâches plus complexes. Ils permettent aussi d'envisager de quantifier les effets de protocoles d'entraînement, non plus uniquement sur la force maximale, mais aussi sur la vitesse maximale de raccourcissement, avancée considérable tant donné le peu de connaissances disponibles actuellement sur ce sujet chez l'homme *in vivo*.

## Points clés

- ✓ Dans cette troisième partie nous avons validé des méthodes permettant d'évaluer de manière fiable et reproductible la force des muscles du tronc et la relation force-vitesse lors du saut vertical. Ces méthodes présentent un intérêt certain dans l'évaluation des capacités athlétiques des individus, en particulier des sportifs de haut-niveau.
- ✓ Nous avons ensuite montré que les coordinations musculaires des membres inférieurs étaient peu alternées par le niveau de charge imposé lors du saut vertical.
- ✓ Enfin notre groupe a obtenu le premier à mesurer la vitesse maximale de raccourcissement des fascicules musculaires *in vivo* chez l'homme. Cette méthode a obtenu d'appliquer à deux articulations (cheville, genou) et soulève de nombreuses perspectives de recherche.
- ✓ En particulier, il sera intéressant de donner du sens à ces méthodes développées en laboratoire vis-à-vis de l'évaluation et de l'optimisation de la performance en situation écologique de réalisation.



8 articles publiés dans des revues indexées ISI



1 contrat doctoral (Université de Rouen)  
1 contrat de recherche de la Région des Pays de la Loire, projet ANOPACy n°14-i-009)



3 encadrements d'étudiants de niveau Doctorat  
2 encadrements d'étudiants de niveau Master

## 2.5 Analyse des déterminants musculaires de la performance sportive de haut-niveau

### 2.5.1 État de la question

L'entraînement musculaire moderne est basé sur (i) l'évaluation des capacités athlétiques (voir partie précédente) et (ii) l'analyse des besoins de l'activité. Cette approche vise à faire concorder au mieux les ressources et les besoins dans l'idée d'optimiser la performance. Une autre méthode originale, toujours développée par Samozino et al. (2012), permet aujourd'hui de déterminer le meilleur équilibre optimal entre les qualités de force et de vitesse d'un individu. Cette avancée est fondamentale à haut niveau de performance, car le potentiel de progression quantitatif chez des sportifs très entraînés est souvent limité. Aussi, les gains accessibles sont subtils, augmentant de fait l'intérêt d'identifier des ajustements qualitatifs du profil athlétique et des méthodes de développement adaptées à ces objectifs d'entraînement. Les méthodes présentées tout au long de ce chapitre contribuent à notre compréhension de la motricité humaine, en particulier le fonctionnement des systèmes neuromusculaire et musculo-tendineux. Mais ces techniques reposent également sur le plan technologique, se miniaturisent, rendant progressivement possible l'investigation sur le terrain, autrement dit, dans le contexte cognitique de la performance sportive (Guilhem, 2014). Des liens entre les capacités physiques des individus et des indicateurs fins de la performance peuvent alors être explorés, soulevant des potentiels d'amélioration innovants qui donnent tout son sens à l'apport des sciences dans l'accompagnement de la performance sportive.

Ainsi, la technique d'electromyographie de surface permet par exemple de quantifier les niveaux et les séquences d'activation des muscles sollicités (coordinations musculaires) lors de mouvements simples comme abordé précédemment lors du saut vertical, mais aussi lors de tâches sportives plus complexes. Ce travail a ainsi été conduit pour évaluer l'influence de la cadence, de la puissance et de la position sur les activités EMG mesurées en piedalage (Hug et Dorel, 2009). Parmi ces paramètres, la puissance est reconnue comme le principal facteur responsable d'une augmentation de la contrainte articulaire et donc du niveau d'activité EMG (Ericson, 1986). Toutefois, des questions restent en suspens concernant les niveaux d'activité produits lors d'un sprint maximal en piedalage par rapport à leur potentiel maximal d'activation. Des résultats récents montrent par exemple des différences importantes entre des exercices de piedalage supra-maximaux et sous-maximaux, en particulier des contributions accrues des extenseurs de la hanche et des fléchisseurs du genou à la puissance produite (Elmer et al., 2011; Hautier et al., 2000). Ces résultats suggèrent des modifications significatives des coordinations musculaires en réponse à ces différentes sollicitations.

Cette approche expérimentale améliore ainsi notre compréhension de gestes sportifs standardisés et contrôlés comme le piedalage sur un ergocycle (mouvements effectués quasi-exclusivement dans le plan sagittal, mobilisation principalement des membres inférieurs). Mais elle peut également être exploitée pour investiguer des gestes plus complexes, dont certains ont très peu ou jamais été analysés sur le plan des coordinations musculaires. De ce point de vue, le tir à l'arc est un modèle intéressant car (i) cette activité sportive implique des actions courtes, rapides et complexes qui requièrent donc des capacités neuromusculaires adaptées (Roi et Bianchedi, 2008) ; (ii) l'apprentissage de la discipline et son entraînement reposent sur des concepts

principalement empiriques issues d'expériences pratiques ; (iii) les connaissances scientifiques relatives aux facteurs neuromusculaires sollicités dans la réalisation du geste sont rares. Williams et Walmsley (2000) ont par exemple montré que les patrons d'activité EMG des muscles *biceps femoris* et *rectus femoris* des membres inférieurs étaient relativement stables en fleuret. Selon ces auteurs, les habiletés techniques extraites à partir de ces mesures semblent également discriminantes du niveau d'expertise. Cette hypothèse est confortée par d'autres travaux qui montrent une relation entre les séquences d'activité musculaire du *triceps brachii* et du *deltoid anterior* et la performance atteinte lors d'une flèche chez des experts (Frère et al., 2011). Ces données suggèrent que d'autres liens pourraient exister entre les coordinations musculaires des membres inférieurs et l'efficience mécanique (i.e. vitesse de mouvement). L'analyse des activités EMG pourraient également contribuer à expliquer certaines adaptations musculaires mises en évidence chez les escrimeurs, notamment les asymétries bilatérales de force constatées chez des pratiquants de niveau moyen (Nystrom et al., 1990; Sapega et al., 1984).

### 2.5.2 Profil athlétique optimal en sport de haut-niveau



Giroux C, Rabita R, Chollet D, Guilhem G.  
Optimal balance between force and velocity differs among world-class athletes.  
J Appl Biomech.. 2016;32(1):59-68.



Avrillon S, Jidovtseff B, Hug F, Guilhem G.  
Optimal balance between pneumatic and isoinertial resistance for maximal muscular power production.  
Int J Sport Physiol Perform. [Epub ahead of print]

Ces travaux couvrent la thèse de Caroline Giroux et le travail de Master 2 de Simon Avrillon. Ils sont le fruit d'une collaboration étroite avec les pôles France des fédérations d'athlétisme, de cyclisme, d'escrime, de taekwondo et disciplines associées, sportifs et cadres techniques avec lesquels nous travaillons depuis mon arrivée à l'INSEP. Ces études reposent sur le concept de profil optimal développé par Samozino et al. (2012), dont le principe est de considérer qu'il existe un équilibre entre les capacités de force et de vitesse permettant de maximiser la performance en saut vertical (Fig. 21). En effet, bien que les sportifs de haut-niveau, présentent des niveaux de force et de vitesse souvent bien supérieurs à la population générale, notamment dans les disciplines nécessitant de la puissance, il reste à déterminer si l'équilibre entre ces deux qualités, matérialisé par la pente de la relation force-vitesse est optimal. Aussi, nous avons évalué la relation force-vitesse en saut vertical auprès d'une cohorte de 95 sportifs de haut-niveau, à l'aide de la méthode simple de Samozino et al. (2008). Nous avons ensuite quantifié l'écart de la pente de la relation avec le profil optimal.

Nos résultats ont montré des écarts significatifs des valeurs de vitesse maximale mesurées par rapport aux valeurs optimales pour les escrimeuses, les escrimeurs, les athlètes et les taekwondoïstes. Ainsi, la pratique chronique à haut-niveau de ces activités sportives est associée à des équilibres différents de la relation force-vitesse. Ces données soulèvent des potentiels d'optimisation de la performance athlétique dans ces disciplines, reposant sur un ajustement de l'équilibre entre force et vitesse. L'avantage de cette approche est également de disposer des relations force-vitesse de chaque sportif, permettant d'individualiser aisément l'entraînement et de

quantifier précisément les effets induits (Morin et Samozino, 2015). Cette démarche est d'ailleurs mise en place avec certaines modifications depuis l'intégration de ces tests dans les routines de suivi des sportifs (e.g. plongeon).




Fig. 21. Présentation d'un exemple permettant d'apprécier la démarche expérimentale et le concept de profil optimal.  $F_0$  : force maximale théorique mesurée ;  $F_{0th}$  : force maximale théorique optimale ;  $V_0$  : vitesse maximale théorique mesurée ;  $V_{0th}$  : vitesse maximale théorique optimale ;  $P_0$  : puissance maximale théorique mesurée ;  $P_{0th}$  : puissance maximale théorique optimale. D'après Giroux et al. (2016).

Une des questions à laquelle notre équipe s'intéresse depuis longtemps est de savoir quel est le stress mécanique optimal pour induire les effets recherchés à l'entraînement. Dans cette optique, les capacités musculaires constituent un modèle intéressant car les adaptations induites par l'entraînement répondent au principe de spécificité, les effets observés étant maximaux dans la condition utilisée à l'entraînement (American College of Sports, 2009). Dans ce contexte, la modalité de résistance pneumatique (i.e. utilisant la pression de l'air compressé dans un virin) semble être efficace pour maximiser la production de puissance sur l'ensemble du mouvement (Frost et al., 2008). Dans le prolongement de mes travaux de thèse et de l'étude présentée ci-dessus, nous avons doncvalué les effets de la répartition des résistances isoinertielle et pneumatique sur la relation force-vitesse mesurée en développé-couché auprès de 15 participants. Nous avons montré que la résistance isoinertielle gênait des vitesses supérieures en fin de mouvement, tandis que la résistance pneumatique induisait des vitesses moyennes plus élevées et des forces moyennes plus faibles. La répartition de ces deux types de résistance permet également de modifier sensiblement la pente de la relation force-vitesse. Nos résultats montrent ainsi que la modalité de résistance peut être utilisée comme une variable innovante de l'entraînement musculaire, afin de moduler le stimulus d'entraînement en fonction des objectifs visés (Frost et al., 2010; Frost et al., 2008). Ces conclusions peuvent également s'appliquer aux populations testées précisément, en utilisant par exemple plutôt la résistance isoinertielle pour augmenter la force chez les taekwondoïstes, tout en surveillant la prise de masse musculaire, dans ce sport à catégorie de poids.

### 2.5.3 Identification des déterminants musculaires de la performance



Dorel S, **Guilhem G**, Couturier A, Hug F.  
Adjustment of Muscle Coordination during an All-Out Sprint Cycling Task.  
Med Sci Sports Exerc. 2012;44(11):2154-64.



**Guilhem G**, Giroux C, Couturier A, Chollet D, Rabita R.  
Mechanical and muscular coordination patterns during a high-level fencing assault.  
Med Sci Sports Exerc. 2014;46(2):341-50.

Ces recherches se sont largement appuyées sur les outils d'analyse développés au laboratoire SEP par Antoine Couturier © partir du logiciel Origin (Origin Lab, OriginLab Corporation, Northampton, MA), en particulier le module EMG Toolbar. Au-delà de la mise à disposition de ces moyens techniques, Antoine Couturier mia formé au langage *LabTalk* ce qui mia permis de concevoir de nombreux programmes d'analyses automatisées. C'est © partir de ces scripts que la plupart des résultats présentés dans ce m°moire ont été analysés.

#### Application au cyclisme

Cette première étude a été réalisée en collaboration avec Sylvain Dorel, François Hug et Antoine Couturier dans le cadre d'un projet financé par le ministère chargé des sports (contrat n° 10-R-019), en collaboration avec la Fédération Française de Cyclisme. L'objectif était de décrire les coordinations musculaires lors de sprint maximaux en cyclisme comparativement à des exercices sous-maximaux.

Les activités EMG de 11 muscles des membres inférieurs et le couple de force appliquée à la pédale ont été enregistrées après de 15 cyclistes de haut-niveau lors de tâches sous-maximales (i.e. 150 W, et puissance correspondant au second seuil ventilatoire) à l'aide d'un ergocycle (Excalibur Sport, Lode, Pays-Bas). La réalisation de sprints a induit une augmentation importante (j 7-9 par rapport à l'exercice effectué à 150 W) des niveaux d'activité des fléchisseurs de la hanche, des fléchisseurs du genou et des extenseurs de la hanche (j 5-7), et dans une moindre mesure des fléchisseurs plantaires et des extenseurs du genou (j 2-3 ; Fig. 22). Pour autant les niveaux d'activité atteints lors du sprint étaient en moyenne inférieurs à ceux mesurés lors d'une contraction isométrique maximale (i.e. < 70-80%). Les moments correspondant à l'activation des muscles intervenaient globalement plus tôt et les fins d'activation se produisaient plus tard pour la majorité des muscles investigués lors du sprint. Ces données mettent en évidence des ajustements significatifs des contributions de chacun des muscles des membres inférieurs à la production de puissance entre un exercice de pédalage sous-maximal et le sprint. L'augmentation de la durée des bouffées d'activité EMG semble représenter une stratégie efficace pour accroître le travail effectué par les différents groupes musculaires sollicités au cours du pédalage.

Du point de vue de la performance sportive, ces résultats ont ouvert des perspectives pour optimiser les méthodes d'entraînement visant à améliorer la capacité de production de puissance maximale des cyclistes. Les hauts niveaux d'activité atteints par les quadriceps et, de manière encore plus marquée, par le triceps surae semblent indiquer que la force maximale développée par ces groupes musculaires est une qualité fondamentale pour augmenter la force appliquée à la pédale (Raasch et al., 1997). Comme nous l'avons observé en saut vertical, la séquence d'activation musculaire supporte une transmission proximo-distale de la puissance produite

par les muscles mono-articulaires croisant la hanche et le genou vers l'articulation de la cheville (Bobbert et van Ingen Schenau, 1988; Gregoire et al., 1984). La capacité de production de force maximale des fléchisseurs plantaires peut ainsi constituer un facteur limitant (et donc une cible d'entraînement intéressante) de cette aptitude à transmettre efficacement la force. La capacité à écruter les fléchisseurs du genou le plus haut possible lors de la remontée de la pointe semble également intéressante à développer.




Fig. 22. patrons EMG moyens enregistrés sur 11 muscles et couple de force mesuré au niveau de la pointe (en bas à droite) dans 2 conditions sous-maximales (150 W et puissance correspondant au 2<sup>nd</sup> seuil ventilatoire, SV2) et lors de sprints maximaux.

#### Application à l'escrime

Mise en œuvre en collaboration avec Giuseppe Rabita et la Fédération Française d'Escrime, cette étude a constitué le stage de Master 2 de Caroline Giroux. Elle a été rendue possible par un système de plates-formes de force disposées en série (6,60 m de long) dont le laboratoire SEP a fait l'acquisition en 2008 et permettant de mesurer les forces d'appui au sol lors de mouvements complexes.

L'objectif de ce travail était :

- d'investiguer les coordinations musculaires des membres inférieurs mises en jeu lors d'un marche-fente en sabre ;
- de déterminer les relations entre les activations musculaires, la force musculaire maximale et l'efficacité mécanique lors de l'assaut.

Nous avons comparé la force isométrique et concentrique maximale des fléchisseurs plantaires et dorsaux, des fléchisseurs et extenseurs du genou et de la hanche mesurée sur ergomètre isokinétique, entre la jambe avant et la jambe arrière de 10 sabreuses de haut-niveau. L'activité EMG de surface de 15 muscles des membres inférieurs et les forces d'appui au sol ont été enregistrées pendant des marche-fente (Fig. 22).




Fig. 22. Représ<sup>e</sup>ntation s<sup>é</sup>quentielle des diff<sup>é</sup>rences phases du march<sup>é</sup>-fente. a. électrodes EMG de surface et transmetteur Wi-Fi. b. Plates-formes de force dispos<sup>ées</sup> en s<sup>é</sup>rie. c. boîtier de synchronisation des signaux EMG et mécaniques issus des plates-formes.

Les extenseurs du genou et de la hanche de la jambe arrière étaient principalement activés lors des phases propulsives, tandis que les muscles de la jambe avant étaient fortement sollicités lors des actions frénatrices. Les sabreuses présentaient une force des muscles extenseurs (hanche et genou) de la jambe avant plus élevée que la jambe arrière. C'est pourtant la force musculaire maximale des extenseurs de la jambe arrière qui était corrélée avec la vitesse maximale antéropostérieure atteinte pendant le marché-fente ( $r = 0.60-0.81$ ). Cette étude a mis en évidence le rôle crucial des muscles extenseurs de la jambe arrière dans la performance en escrime. Elle confirme aussi que la pratique chronique de l'escrime génère des asymétries de force bilatérale significatives (Tsolakis et al., 2010). Ces résultats soulèvent des perspectives en matière d'optimisation de la performance et de prévention de la blessure. En effet, renforcer les capacités de production de force maximale des extenseurs de la jambe arrière semble intéressant pour (i) augmenter la vitesse maximale atteinte lors des mouvements d'escrime et (ii) réduire les asymétries bilatérales de force afin de diminuer le risque de blessure qui peut représenter un déséquilibre supérieur à 15% (Croisier et al., 2008).

## Points clés

- ✓ En appliquant une méthode valide dans la troisième partie, ces travaux ont permis d'identifier des équilibres optimaux spécifiques à la discipline sportive chez des sportifs de très haut niveau. Nos données soulèvent de nouvelles perspectives d'optimisation, chez ces populations déjà très entraînées.
- ✓ En faisant varier la part des résistances isoinertielle et pneumatique dans la charge totale, nous avons montré que la répartition des types de résistance pouvait permettre de favoriser la production de force ou de vitesse. Ces résultats sont d'importance dans la perspective d'appliquer un stimulus mécanique adapté aux objectifs d'entraînement. Cette possibilité d'ajuster le profil athlétique est particulièrement intéressante pour les sportifs très entraînés chez qui le potentiel de développement peut parfois être limité.
- ✓ Nous avons ensuite mis en évidence le rôle fondamental des fléchisseurs et extenseurs de hanche, et des fléchisseurs plantaires dans la performance en pointage.
- ✓ En escrime, la contribution des muscles extenseurs du genou et de la hanche de la jambe arrière apparaît essentielle à l'atteinte de la performance lors d'un marche-fente. Ces résultats suggèrent des applications en matière de préparation musculaire et de prévention de la blessure.



7 articles publiés dans des revues indexées ISI



1 contrat doctoral (Université de Rouen)  
2 contrats de recherche financés par le ministère chargé des sports, en collaboration avec la Fédération Française de Cyclisme (contrat n° 10-R-019) et d'Athlétisme (contrat n° 10-i-008)



1 encadrement étudiante de niveau Doctorat  
3 encadrements étudiants de niveau Master

## Chapitre 3 – Animation de la recherche |

### 3.1 Conception et direction de travaux

Cette première sous-partie vise à présenter de manière synthétique la part de mes travaux incluant une activité d'encadrement. Une section est également dédiée à l'expérience acquise à la direction du laboratoire. Y sont exposées en particulier les mesures mises en place pour construire les conditions nécessaires à la mise en œuvre de projets répondant aux exigences actuelles en matière d'éthique. Ces actions contribuent en effet au quotidien à la formation par la recherche des étudiants que nous encadrions.

L'ensemble des recherches présentées dans le chapitre précédent n'auraient pu voir le jour sans les équipes avec lesquelles j'ai eu l'opportunité et la chance de travailler pendant 8 ans. Afin de constituer ces groupes de travail, la collaboration tissée avec le Dr. Giuseppe Rabita et le Dr. Antoine Couturier, ainsi que l'ensemble des collègues du Laboratoire MIP a été essentielle. Dans ce contexte, j'ai encadré ou co-encadré 19 Master, 3 élèves ingénieurs et 2 thèses de doctorat chacune financées par un contrat doctoral. Caroline Giroux est devenue maître de conférences de l'Université Paris Est Créteil 1 an après l'obtention de son doctorat. Après avoir occupé un poste d'Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche à l'Université de Nantes, Mathieu Plautard travaille aujourd'hui au lancement de sa société. J'ai également participé à l'encadrement de 3 étudiants en thèse sur une partie de leurs travaux et accueilli 2 doctorants<sup>18</sup> et 1 post-doctorat<sup>19</sup> à l'occasion de stages internationaux. L'ensemble de ces directions et co-directions d'étudiants ont donné lieu à la publication de 19 articles dans des revues indexées ISI. Actuellement, je co-encadre 3 étudiants en thèse de doctorat, toutes financées, par un contrat doctoral (Université Paris-Saclay), une Convention Industrielle de Formation par la Recherche (société Natural Grass) et un partenariat de recherche (société Actech). Le nombre d'étudiants encadrés me confronte à des profils très variés, m'amenant à me remettre sans cesse en question dans mes méthodes de travail afin de trouver le fonctionnement le plus adapté. Ma position au sein du Conseil Scientifique de l'Ecole Doctorale 566 Sciences du Sport, de la Motricité et du Mouvement Humain (SSMMH) m'amène également à contribuer à la rédaction et à l'approbation du règlement intérieur de l'ED, qui inclut notamment les dispositions en matière d'encadrement et de suivi d'étudiants. Ce travail me permet de partager mon vécu en tant qu'encadrant mais aussi de recueillir celle de collègues expérimentés, travail propice à la construction de bonnes pratiques en discussion avec les étudiants que j'encadre. À titre d'exemple, j'ai instauré la mise en place des Comités de Suivi de Thèse au sein du Laboratoire SEP à la fin de l'année 2016.

Depuis mon arrivée à l'INSEP, j'ai été sensible à l'importance du respect des dispositions de la loi Huriet-Serusclat qui encadre les recherches biomédicales chez l'homme. Nous avons ainsi disposé et obtenu l'accord du Comité de Protection des Personnes et de l'Agence Nationale de Santé et du Médicament pour 3 projets. L'intégration de ces procédures dans notre démarche de recherche a également contribué au rapprochement avec le Pôle Médical de l'INSEP et fait émerger des projets répondant aussi à des enjeux relatifs à la santé des sportifs (voir partie 4.1.3).

<sup>18</sup> Stages de Beatriz Bachero-Lena et Antonio Morales-Artacho, financés par le Ministère Espagnol de la Recherche.

<sup>19</sup> Post-doctorat de Sasa Vuk, Université de Zagreb Croatie.

La variété des projets et des sujets investis m'a permis de participer en tant que responsable scientifique ou en tant que collaborateur, et d'acquérir une vision d'ensemble du travail de recherche en équipe. Ainsi, j'ai eu la possibilité de contribuer aux différentes étapes de la conduite d'un projet de recherche, de la formulation de la problématique à la relecture des preuves de l'article accepté, en passant par la mise en œuvre des expérimentations et l'analyse des données collectées. Si ces contributions ont été évidemment variables en fonction de mon positionnement sur le projet, j'ai la plupart du temps souhaité être impliqué dans les différentes phases qui le constituent. Cette démarche a été extrêmement formatrice puisqu'elle m'a permis de développer des compétences multiples relatives à la conception du projet, au montage financier, à la structuration administrative, à la direction des travaux, à l'analyse et à l'interprétation des résultats, à la rédaction des différents articles et rapports. L'expérience acquise dans ce contexte a aussi fait naître des idées pouvant structurer la conduite de la recherche dans un cadre plus large. Celles-ci ont pu être mises en œuvre et prouvées depuis quelques mois avec l'équipe du laboratoire.

### 3.2 Coordination d'une équipe de recherche

Cette partie se situe à un niveau plus macroscopique de l'animation de la recherche et synthétise les actions réalisées en tant que Directeur de l'équipe d'Accueil n°7370. Depuis ma prise de fonction à la direction du Laboratoire SEP en avril 2016, et en concertation avec Jean-François Robin, responsable de l'Unité Recherche, la structuration administrative et fonctionnelle du laboratoire a été l'une de mes priorités. Cette volonté s'est manifestée à travers cinq réalisations majeures :

- La constitution d'un Conseil de Laboratoire (CL) assurant la représentativité de l'ensemble des champs scientifiques et des catégories de personnels qui composent notre équipe de recherche. Cette instance entoure les décisions structurantes (e.g. recrutements, classements des projets, organisation fonctionnelle) ;
- La production d'un règlement intérieur du laboratoire validé par le CL et le Conseil Scientifique, Médical et de Formation de l'INSEP le 15 novembre 2016 ;
- L'obtention de l'autorisation de Lieu de Recherches Biomédicales (LRBM) délivrée par l'Agence Régionale de Santé en novembre 2016, pour l'intégralité des locaux du laboratoire ;
- La constitution d'un bureau composé du Directeur de Laboratoire, du Responsable de l'Unité Recherche et des responsables de thémes de recherche. Ses réunions hebdomadaires sont ouvertes à l'ensemble de l'équipe, avec diffusion systématique d'un relevé de points de discussion. Des réunions de bureau scientifique entre les responsables de théme et le directeur de Laboratoire, et des réunions de laboratoire réunissant l'ensemble de l'équipe viennent compléter ce dispositif ;
- La mise en place d'une véritable politique de valorisation de la recherche, en collaboration avec la Société d'Accès à l'Innovation et au Transfert de Technologie (SATT) Innov.

Le CL a ainsi enterré une organisation fonctionnelle instaurant des responsabilités de théâtre scientifique et des différents en charge de missions transversales visant à animer et coordonner les actions des chercheurs dans ces différents secteurs. Cette organisation prévoit la mise en œuvre de la politique du Laboratoire SEP en matière de valorisation des produits de la recherche. Le laboratoire a ainsi engagé en 2016 une collaboration avec la SATT Innov qui a pour mission de valoriser les résultats, les expertises et les plateformes émergeant sur son territoire. Cette collaboration, concrétisée par l'établissement d'une convention cadre, a conduit à la détection de 8 opportunités de valorisation. Dans ce contexte, des groupes-projet travaillent à la maturation des innovations issues du Laboratoire SEP. L'objectif est de transformer ainsi les inventions en innovations permettant de construire des produits ou des services en adéquation avec les besoins des acteurs du sport de haut-niveau et/ou du secteur industriel. En voici quelques exemples :

- Digitalisation des carnets d'entraînement visant à guider, aider et former les athlètes à se fixer efficacement des objectifs à l'entraînement et en compétition ;
- Mise en place de bars de récupération sur les sites d'entraînements & ateliers nutrition avec les sportifs de haut-niveau internes ;
- Développement d'une plate-forme visant à centraliser et croiser les bases de données vivantes collectées auprès des Pôles France, en vue d'optimiser l'aide à la décision.

Assuré en lien permanent avec mes collègues, l'ensemble de ce programme d'actions a visé à créer les conditions humaines et structurelles adaptées à la mise en œuvre de travaux de recherche répondant aux recommandations académiques, éthiques et juridiques actuelles. Ce travail se poursuit puisqu'un groupe de travail a été constitué sous la responsabilité du Dr Claire Thomas-Junius. Ce groupe a pour objectif d'établir un avenant à l'autorisation de LRBM permettant de réaliser des biopsies musculaires dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. En lien avec le Pôle Médical de l'INSEP et l'Agence Régionale de Santé, cette étape importante doit permettre à notre équipe d'accéder aux mécanismes d'origine cellulaire impliqués dans les effets induits par certains des protocoles que nous mettons en œuvre (effets de l'entraînement, traitements de récupération, impact du stress environnemental). Dans cette optique, nous avons également initié des échanges avec plusieurs équipes de recherche à l'étranger, à la pointe des techniques de biologie cellulaire, en Norvège, en Belgique et en Australie.

Dans la perspective du prochain contrat de l'Équipe d'Accueil (2019-2023), j'ai coordonné l'évaluation à mi-parcours de l'équipe par la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle, en produisant notamment un document de synthèse (grille d'évaluation transmise à la DGESIP en décembre 2016, amendée en février 2017). Le bureau scientifique a également constitué un comité consultatif d'experts extérieurs, dont l'objectif sera d'accompagner notre équipe de recherche dans la construction de son programme scientifique. Le projet de l'EA sera ensuite soumis à l'évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur en septembre 2017, procédure assurée sous ma

responsabilit°, en concertation avec les r°f°rents scientifiques du Conseil Scientifique M°dical et de Formation de lINSEP<sup>20</sup>.

Par ailleurs, le laboratoire s'est investi dans ltablissement de la cartographie du réseau « Recherche » du Grand INSEP. Ce r°seau vise à identifier et valoriser l'apport des établissements en matière de performance et de conditions de préparation des sportifs sur lensemble du territoire français. Ce travail coordonné par Christine Hanon doit conduire à la consolidation d'un maillage de collaborations scientifiques portant sur le haut niveau.

---

<sup>20</sup> Les orientations administratives et scientifiques adoptées par le Laboratoire SEP ont été approuvées par le Conseil Scientifique M°dical et de Formation de lINSEP le 15 novembre 2016.



## Chapitre 4 – Projets de recherche |

Ce quatrième chapitre a pour objectif de présenter les perspectives aux travaux exposés dans les chapitres 2 et 3. Je propose ainsi 3 orientations majeures qui s'inscrivent toujours dans le cadre du programme de recherche du Laboratoire Sport, Expertise et Performance (EA 7370). Ces propositions ont pour objectif de répondre aux limites rencontrées dans le cadre de nos travaux antérieurs et d'aller plus loin dans la compréhension de la plasticité musculaire et de la motricité humaine. Leur point d'ancrage et leur originalité résident en la volonté de transférer les méthodes prouvées en laboratoire à la compréhension voire l'optimisation de la performance motrice. Chaque proposition est systématiquement accompagnée d'une appréciation de la faisabilité, de l'avancement et de l'Chance de publication envisagée, afin de permettre au lecteur de situer chaque étude dans le programme de recherche global.

Il est à noter que ces perspectives de recherche ne couvrent pas la totalité des travaux dans lesquels je me suis engagé ou les projets en cours de conception, tels que ceux qui concernent l'analyse de la performance (e.g. quantification de la charge spécifique en handball) ou d'autres recherches auxquelles je participe en tant que collaborateur (e.g. prédiction de la tendinopathie).

#### 4.1. Compréhension des mécanismes lésionnels

Jusqu'ici, nos travaux se sont focalisés sur le comportement de l'unité muscle-tendon lors de contractions excentriques induisant des altérations fonctionnelles reversibles (dommages musculaires). L'accumulation de dommages musculaires consécutive à la répartition d'exercices intenses peut fragiliser le muscle. Si la récupération ne permet pas d'assurer une régénération suffisante, le tissu musculaire est exposé à des conséquences non-fonctionnelles, telles que la blessure (Lieber et Friden, 1999; Opar et al., 2012). C'est en effet à ce problème majeur que sont le plus souvent confrontés les acteurs du milieu sportif. À l'aune de ces 8 années post-thèse, il paraît naturel de mobiliser les techniques utilisées jusqu'alors pour mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent la survenue des blessures musculaires, en vue de mieux les prévenir.

Les périodes d'in disponibilité liées aux lésions musculaires représentent une problématique centrale du sport de haut-niveau. En effet, la survenue d'une blessure expose le sportif ou son équipe à une baisse temporelle ou durable de son niveau de performance (Hagglund et al., 2013) mais également à un risque accru de récidive lié à la première lésion (de Visser et al., 2012). Dans lors, la compréhension des mécanismes lésionnels apparaît fondamentale pour connaître les cibles préventives et éviter tout risque de lésion et de récidive. Bien que les processus qui sous-tendent la survenue d'une blessure soient extrêmement complexes et sous l'influence de nombreux facteurs extrinsèques (e.g. charge d'entraînement, fatigue, sommeil, nutrition, contrôle moteur), la lésion musculaire résulte *in fine* d'une contrainte mécanique qui dépasse les capacités des tissus à stocker et/ou dissiper l'énergie appliquée par cette contrainte (Lieber et Friden, 1993). Une meilleure compréhension des mécanismes intervenant lors de blessures initiales et récurrentes passe donc par une analyse de la contrainte imposée au complexe muscle-tendon (i.e. groupe musculaire des ischiojambiers) durant des tâches sous-maximales et maximales.

#### 4.1.1 Contributions musculaire et tendineuse à la dissipation d'énergie

Les recherches récentes, auxquelles ont contribué nos travaux, ont montré que les propriétés mécaniques du tendon influencent substantiellement l'amplitude de l'allongement des fascicules et la dissipation d'énergie assurée par les structures musculaires (Guilhem et al., 2016; Konow et al., 2012; Roberts et Azizi, 2010). Ces travaux montrent que le tendon agit comme un tampon mécanique permettant de préserver l'intégrité des fibres musculaires des dommages induits par l'exercice (Hicks et al., 2013; Konow et Roberts, 2015). Toutefois, comme le reconnaissent ces études, les interactions muscle-tendon ont été principalement étudiées *in vitro* ou lors de tâches mono-articulaires (Guilhem et al., 2016) ou sous-maximales (Hoffman et al., 2014). Aussi, il apparaît nécessaire de déterminer le rôle des structures tendineuses et musculaires lors de tâches plus complexes, comme la réception de saut. Ce type d'action est très courant dans plusieurs disciplines sportives qui sollicitent les capacités dissipatives de l'unité muscle-tendon. En raison de l'incidence élevée des blessures lors des réceptions de saut (Dufek et Bates, 1991), cette tâche a été très étudiée sur les plans biomécanique (Zhang et al., 2000) et neurophysiologique (Galindo et al., 2009). Lors de la phase de poussée en saut vertical, l'énergie générée au niveau de la hanche est transmise de manière proximo-distale vers la cheville (Bobbert et van Ingen Schenau, 1988). Aussi, nous pouvons nous demander si ce processus existe de manière inverse lors de la réception, et surtout comment les interactions muscle-tendon contribuent à la dissipation d'énergie lors de cette phase de freinage.

En mobilisant le système de capture du mouvement disponible au laboratoire SEP couplé à l'échographie haute fréquence, nous pouvons analyser les variations de longueur des fascicules et des tissus tendineux en 2 dimensions lors de la réception de sauts en contrebas réalisés à différentes intensités (i.e. différentes hauteurs de départ ; Fig. 24). L'acquisition réalisée par notre équipe d'un deuxième échographe à haute fréquence d'acquisition nous permet également d'analyser de manière conjointe les interactions muscle-tendon au niveau des extenseurs du genou (*vastus lateralis*) et des fléchisseurs plantaires (*gastrocnemius medialis*). En complément de la caractérisation des variations de longueurs de l'unité muscle-tendon, nous souhaitons également apprendre les activités musculaires. Ces mesures permettront d'identifier le caractère actif ou inactif des différents muscles lors de ces changements de longueurs, afin notamment de savoir si les allongements sont effectués de manière passive ou active (i.e. contractions excentriques). Cette étude sera réalisée dans le cadre de la première étude de thèse d'Enzo Hollville, que je co-encadre.




Fig. 24. Mesures visant à investiguer les contributions musculaire et tendineuse à la dissipation d'énergie lors de la réception de sauts en contrebas. La force verticale (A) sera mesurée par une plate-forme de force, les angles articulaires de la hanche, du genou et de la cheville à l'aide de caméras Vicon (B), les longueurs des fascicules musculaires et des tissus tendineux du *gastrocnemius medialis* (C) et du *vastus lateralis* (D) par échographie haute-fréquence, et les activités musculaires par EMG (E). Les vitesses articulaires (F), fasciculaires et tendineuses (G-H) seront obtenues par dérivation.

**Faisabilité :** comme le montrent les tracés exposés en figure 24, nous possédons le dispositif expérimental et les méthodes nécessaires à la mise en œuvre de l'étude. Celle-ci est actuellement en cours et réalisée dans le cadre de la thèse d'Enzo Hollville. Ce doctorat est financé par une Convention Industrielle de Formation par la Recherche établie en partenariat avec la société Natural Grass.

**Avancement :** la phase expérimentale est terminée et les données en cours d'analyse.

**Échéance de publication envisagée :** fin de l'année 2017.

#### 4.1.2 Répartition de la contrainte au sein d'un groupe musculaire

Les blessures aux ischio-jambiers surviennent majoritairement lors des sprints. La course à pied est une succession d'appuis au sol et de phases aériennes, entre lesquels se situe la phase de renvoi (swing phase), qui permet au pied de repasser en avant du corps du coureur. La configuration biomécanique de cette phase de renvoi est une de celles qui génèrent des situations à risque (Schache et al., 2012). En effet, les études ayant analysé le comportement des muscles lors de cette séquence montrent un pic d'activation des ischio-jambiers à

la fin de la phase de renvoi et au d°but de la phase d'appui. Au m°me moment, cette contraction des ischio-jambiers est associ°e à un allongement forc° visant à déclencher l'extension du genou et la flexion de la hanche (Fiorentino et al., 2014). Lorsque le pied entre en contact avec le sol, la force générée par les extenseurs de hanche et les fléchisseurs du genou augmente brusquement alors m°me que les ischio-jambiers se contractent et s'allongent lors d'une contraction excentrique effectu°e à haute vitesse.

La réalisation de ce type de tâches maximales nécessite la coordination des systèmes nerveux, squelettique et musculaire. Cependant, l'observation de ces interactions reste compliqu°e en raison de la difficulté méthodologique que représente la complexité *in vivo* de la commande nerveuse et de la fonction motrice associée (Sartori et Farina, 2016). L'approche par des modèles musculo-squelettiques a permis de réaliser des avanc°es significatives dans ce domaine depuis les années 2000 et la démocratisation de logiciels libres, comme OpenSim (Fig. 25).




Fig. 25. Analyse des forces musculaires basée sur la modélisation musculo-squelettique. Adapt° de Sartori et Farina (2016).

En couplant les propriétés motrices des ischiojambiers, leur activation, les angles des articulations de la hanche, du genou et les moments de force produits à chaque articulation, laitudo de Schache et al. (2012) a permis d'estimer la motrice des ischiojambiers durant le sprint. Les auteurs montrent un pic de force plus important produit par le *semimembranosus*, par rapport, notamment, à la portion longue du *biceps femoris* et au *semitendinosus*, lors de la contraction excentrique en phase de renvoi (Fig. 26).




Fig. 26. Force produite et durée d'activation des muscles des ischio-jambiers en course à pied, en fonction du cycle de la foulée, exprim° en % de sa durée totale. D'après Chumanov et al. (2007).

Si ces données pr°sentent un réel intérêt dans la compréhension des contraintes impos°es aux ischiojambiers durant une tâche maximale, les travaux conduits jusqu'à pr°sents comportent certaines limites. En

effet, les donn°es architecturales et les propri°t°s m°caniques utilis°es pour mod°liser la dynamique de l'unit° muscle-tendon sont principalement issues de mesures cadav°riques. Nous pouvons d±s lors faire lhypoth±se que de larges diff°rences existent entre ces valeurs de capacit°s de production de force et celles obtenues *in vivo*. De plus, ces tudes ne tiennent pas compte des diff°rences interindividuelles dans lorganisation architecturale des ischiojambiers. Cela ne nous permet donc pas de distinguer les strat°gies individuelles de distribution de la force. Enfin, il est à noter que ces r°sultats sont obtenus à partir de mod±les qui ne mesurent pas directement le comportement du muscle et des tendons lors de la t°che, limite à laquelle peut r°pondre en partie lutilisation de l°chographie haute-fr°quence.

Dans un °ditorial r°cent, Herzog (2017) s'int°resse aux causes des blessures aux ischio-jambiers lors du sprint en course à pied. Revenant sur les hypoth±ses r°currentes qui pointent cette contrainte excentrique réalis°e à haute vitesse comme un facteur d°terminant de la blessure, il repr°cise limportance des diff°rents niveaux dianalyse. Lunit° muscle-tendon et la fibre musculaire peuvent en effet pr°senter un comportement diam°tralement oppos°, en raison du rôle diamortisseur que peut jouer le tendon (voir partie 2.2). Il constate ensuite que les blessures auxquelles il a assist° pendant 50 ann°es de comp°titions en sprint ont syst°matiquement touch° des coureurs qui n°taient pas en position de gagner. Et Herzog de sinterroger sur l'influence d'une possible é perte à de contr°le moteur ou d'un é manque à d'attention chez ces sprinters souhaitant refaire leur retard à tout prix, dans la survenue de la blessure. Bien que cette question reste en suspend, elle a le mérite de positionner les coordinations musculaires comme un sujet d'int°r°t pour mieux comprendre les causes des blessures (Devlin, 2000).

Aussi, nous nous proposons d'aborder cette probl°matique à travers une s°rie d°tudes visant à évaluer la distribution des activations musculaires et des forces parmi les muscles des ischio-jambiers. Ces mesures seront mises en relation avec l°volution des propri°t°s architecturales et m°caniques. Ce projet devrait à terme permettre :

- De mieux décrire les contributions de chacun des muscles fl°chisseurs du genou à la force totale produite lors de t°ches simples (i.e. extension-flexion du genou) et plus complexes (i.e. saut, sprint) ;
- D'appr°cier la variabilit° des strat°gies individuelles adopt°es lors de ces t°ches, voire d'identifier des strat°gies optimales ;
- D'analyser les liens entre ces coordinations musculaires et le niveau de dommages induits par un exercice excentrique ;
- D'évaluer l'impact de la blessure sur ces coordinations musculaires.

Ce travail sera réalisé dans le cadre du contrat doctoral de Simon Avrillon (Universit° Paris-Saclay), que je co-encadre avec François Hug (Universit° de Nantes). Nous avons déjà mis en œuvre une première étude au cours de laquelle nous avons utilisé la technique SSI afin de quantifier l'activité des antagonistes (co-activation) lors de contractions isom°triques des extenseurs et fl°chisseurs du genou (Raiteri et al., 2015). Cette co-activation participe au contrôle du mouvement et stabilise larticulation (Aagaard et al., 2000). Ce phénomène a

principalement  $\circ t^\circ$  mis en  $\circ vidence$   $\circ$  partir de la technique d*EMG* de surface, qui peut  $\circ$ tre partiellement contamin $\circ$  par un signal  $\circ$ manant des muscles adjacents (i.e. ph $\circ$ nom $\pm$ ne de *crosstalk*) (Solomonow et al., 1994). Dans les cas extr $\circ$ mes, l'int $\circ$ gralit $\circ$  du signal d $\circ$ tect $\circ$  peut r $\circ$ sulter de ce *crosstalk*. Ainsi, le but de cette premi $\pm$ re  $\circ$ tude sera de quantifier, par la technique SSI, le niveau de co-activation lors de flexions et extensions du genou, et de le comparer aux valeurs obtenues avec la technique d*EMG* de surface. Ce travail doit contribuer  $\circ$  am $\circ$ liorer notre compr $\circ$ hension des processus contribuant la stabilit $\circ$  de l'articulation du genou au cours de l'exercice.




Fig. 26. Pr $\circ$ sentation de l'approche exp $\circ$ imentale permettant de quantifier la co-activation par  $\circ$ lastographie SSI. Lors de cycles passifs, le module de cisaillement est mesur $\circ$  en fonction de l'angle du genou. Lors de contractions isom $\circ$ triques maximales, le module de cisaillement obtenu  $\circ$  l'angle correspondant  $\circ$  l'activit $\circ$  EMG maximale est moyenn $\circ$  sur 3 s. Le module correspondant au 2<sup>me</sup> angle en conditions passives est  $\circ$ galement calcul $\circ$ . Enfin, la valeur de module obtenue en passif est soustraite  $\circ$  la mesure active pour obtenir la valeur de module refl $\circ$ tant uniquement la fraction active lors de la co-activation. Travail de th $\pm$ se de Simon Avrillon. M $\circ$ thode adapt $\circ$ e de Raiteri et al. (2015).

Une deuxi $\pm$ me  $\circ$ tape visera  $\circ$  caract $\circ$ riser les contributions individuelles de chacun des muscles des ischio-jambiers lors de contractions isom $\circ$ triques des fl $\circ$ chiseurs du genou. La surface de section transversale physiologique (PCSA, i. e. la surface du muscle perpendiculaire aux fibres qui le constituent) et le bras de levier peuvent  $\circ$ tres estim $\circ$ s en utilisant des mod $\pm$ les anthropom $\circ$ triques ou mesur $\circ$ s directement par imagerie (IRM

et/ou °chographie). En admettant l'hypothèse (raisonnable) selon laquelle les muscles agonistes agissent à la m²me longueur musculaire relative par rapport à leur longueur optimale en contraction isom°trique, la PCSA et le bras de levier peuvent ^tre utilis°s pour estimer la contribution relative de chaque muscle (%Cmvc) au couple de force articulaire maximal (Cmvc). En mesurant l'activité EMG lors d'une contraction isom°trique maximale, le couple de force musculaire (Cm) produit lors d'une contraction isom°trique sous-maximale peut ^tre estim° pour chaque muscle selon l'équation (Buchanan et al., 2004; Hudson et al., 2009; Hug et al., 2015b) :

$$C_m = \% EMG_{max} \times \% C_{mv} \times C_{mv}$$

Cette relation suppose que la tension sp°cifique est similaire entre les muscles. Il est important de noter que cette tension sp°cifique est influenc°e par la typologie musculaire. Cette m°thode est donc exploitable pour comparer le couple de force de muscles pr°sentant une typologie similaire, ce qui est le cas des ischio-jambiers (i.e. 51-60% de fibres de type II) (Garrett et al., 1984). Les propriétés architecturales des participants seront mesur°es à l'aide d'un examen IRM (reconstruction du volume musculaire, Fig. 27 ; mesure du bras de levier) et de mesures °chographiques réalis°es dans l'axe longitudinal du muscle (mesure de la longueur des faisceaux musculaires). Ces mesures permettront de quantifier la PCSA. Cette m°thode a déjà été prouv°e et mobilis°e pour déterminer les relations entre les ratios de force et d'activation des muscles du quadriceps (Hug et al., 2015a). Afin de s'affranchir au mieux des limites inh°rentes à l'acquisition du signal EMG, nous placerons les électrodes en suivant les recommandations SENIAM. De plus, l'orientation des électrodes sera détermin°e par °chographie, pour tenir compte de la position des enveloppes musculaires et de l'arrangement des fibres (angle de pennation). Les propriétés °lastiques de chaque muscle seront également mesur°es par °lastographie SSI.




Fig. 27. Exemple d'images IRM (A) et reconstruction obtenue (B) à partir de ces images sur les ischio-jambiers. Ces reconstructions permettent de mesurer les volumes de chacun des muscles. ST : semitendinosus ; BF : biceps femoris ; SM : semimembranosus. Travail de thèse de Simon Avrillon (contrat doctoral de l'Université Paris Saclay).

Les travaux men°s par nos collaborateurs de l'Université de Nantes ont démontré une relation lin°aire entre le module de cisaillement et la force musculaire produite lors de rampes de contraction isom°trique de l'abducteur du petit doigt réalis°es jusqu'à intensité maximale (Ates et al., 2015). Cependant, les études préliminaires réalis°es récemment par le laboratoire MIP ne permettent pas de confirmer ces données sur les

muscles de la cuisse, rendant complexe l'utilisation de la technique SSI pour estimer la force musculaire. Nos travaux pourraient donc contribuer à explorer plus avant cette possibilité technique sur les ischio-jambiers, en comparant les techniques EMG et SSI.

Dans le prolongement de cette étude, nous ambitionnons d'évaluer l'impact d'une blessure antérieure (< 6 mois) sur la répartition de la contrainte au sein des différents muscles des ischio-jambiers. En utilisant la même méthode que précédemment, ce travail sera réalisé auprès de sportifs de tous niveaux (modérément actif jusqu'au haut-niveau) ayant déjà subi une blessure aux ischio-jambiers. Il sera ensuite possible d'explorer les liens entre les coordinations musculaires et le niveau de dommages induits par des contractions excentriques. En effet, le renforcement excentrique est très utilisé en prévention ou en rééducation sans que l'impact de ce type d'exercice sur le comportement du muscle et du tendon ne soit clairement identifié à ce jour (Brockett et al., 2001; Croisier et al., 2008). Les applications potentielles issues d'un tel travail sont multiples. Il devrait être envisageable, à terme, de définir les paramètres de l'exercice (intensité, vitesse, amplitude) permettant d'appliquer la contrainte souhaitée, en fonction des effets recherchés. Ce projet présente également l'intérêt de s'appuyer sur les travaux que nous avons déjà réalisés et de faire le lien avec des applications dans le domaine de la prévention. En effet, des travaux récents ont montré qu'il était possible de cibler certains muscles des ischio-jambiers en utilisant une modalité d'exercice adaptée (Mendez-Villanueva et al., 2016).

**Faisabilité :** la première étape de ce travail est bien avancée. Comme le montre la Fig. 27, le développement méthodologique permettant la quantification des forces musculaires individuelles est en cours de développement. Une fois prouvé, nous envisageons de mobiliser rapidement cette approche dans le contexte des dommages et de la blessure. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la thèse de Simon Avrillon que je co-encadre, financé par un contrat doctoral de l'Université Paris-Saclay.

**Avancement :** la rédaction de l'article issu de la première étude est en cours, tandis que la seconde étude est réalisée à 50%.

**Échéance de publication envisagée :** premier article soumis en mars, 3 articles minimum envisagés d'ici 2018.

#### 4.1.3 Propriétés élastiques et blessure musculaire

De nombreux travaux se sont attachés à déterminer des indicateurs de risque de survenue et de récurrence des blessures musculaires (Opar et al., 2012) D'un point de vue structurel, l'évaluation du stade de la blessure et le suivi de son évolution reposent actuellement sur l'imagerie échographique. Cette méthode permet d'identifier clairement le site de la lésion, les structures endommagées, et la présence d'une éventuelle fibrose (Koh et McNally, 2007). Toutefois, l'échographie reste une méthode qualitative qui ne permet pas de renseigner sur la capacité du tissu à se former pour stocker/dissiper de l'énergie. D'un point de vue fonctionnel, les deux principales méthodes d'évaluation proposées à ces fins sont basées sur la caractérisation des capacités de production de force ou les rapports de force entre agonistes et antagonistes (e.g. ratio fonctionnel) (Croisier et al., 2002) et de souplesse du système musculo-articulaire (Witvrouw et al., 2003) (Fig. 28).




Fig. 28. Protocoles d'évaluation de la souplesse de la hanche (A) et de la force des fléchisseurs du genou (B), et cinquièmes d'évolution de ces deux paramètres pour des danseurs et des sprinters (C, D). D'après Askling et al. (2006).

Ces méthodes sont particulièrement intéressantes pour identifier des sportifs à risque et donc prévenir la survenue de blessure. Cependant, les paramètres extraits de ces mesures sont sous l'influence de facteurs centraux, spinaux et périphériques (i.e., ensemble des systèmes musculo-tendineux du groupe), et ne permettent pas d'identifier le facteur ou le muscle limitant à lors de l'évaluation. En effet, les lésions musculaires sont toujours très localisées, et donc l'évaluation à l'échelle du groupe musculaire n'est probablement pas la plus adaptée (Silder et al., 2013). Ainsi, le développement d'une méthode d'évaluation complémentaire locale permettrait de se focaliser sur des muscles démontrant une forte prévalence de blessure (e.g., *biceps femoris*) ou ayant très probablement lésions.

Ainsi, nous souhaitons caractériser la relation entre la raideur de muscles cibles en début de saison (i.e., chaque muscle des ischio-jambiers) et la survenue de blessure au cours de la saison sportive. Cette première étude permettra de déterminer si la mesure d'elasticité musculaire peut renseigner sur le risque de survenue d'une blessure musculaire. Par ailleurs, cette étude permettra de caractériser les propriétés mécaniques musculaires d'une population de sportifs de haut-niveau (aucune base de données disponible actuellement) avec des valeurs qui serviront de référence et de comparaison ultérieure entre les sportifs ayant ou non des antécédents de blessure (étude 1). Les objectifs suivants seront d'une part de décrire l'effet de la blessure sur les propriétés élastiques musculaires d'une part (étude 2), et de caractériser la relation entre le recouvrement des propriétés élastiques musculaires lors du retour à l'activité et la récidive d'autre part (étude 3).




Fig. 29. Pr°sentation du protocole exp°rimental.

Le collectif de sportifs du p»le France de chaque discipline identifi°e comme expos°e aux blessures aux ischio-jambiers sera int°gr° à l°étude (athl°tisme, sports de combat, escrime, sports collectifs et sports de raquette). Ceci repr°sente une population de 150 à 200 sportifs de haut niveau. Sur la base des °tudes °pid°miologiques disponibles (Jackson et al., 2013; Opar et al., 2012), nous estimons de 24 à 40 le nombre de sportifs qui pourraient subir une blessure, °chantillon qui devrait permettre de r°pondre aux objectifs des °tudes 2 et 3.

Lors d'une °tude pilote, nous avons obtenu des valeurs de module de cisaillement sup°rieures au sein du *biceps femoris* touch°, comparativement au muscle sain (Fig. 30). Toutefois, ces donn°es n'apportent pas de preuves d'une relation de causalit° entre l°lasticit° musculaire et l'incidence des blessures. Une °tude prospective est donc n°cessaire pour clarifier cette relation potentielle entre l°lasticit° et risque de blessure musculaire.




Fig. 30. A. Cartes d'elasticit° obtenues par °lastographie SSI au sein du *semintendinosus* (ST) l°s° (à gauche) et non-l°s° (à droite). B. Relation module de cisaillement-angle obtenue sur 3 sujets sur le *biceps femoris* (moyenne ± cart-type).

Ce travail se fera en °troite collaboration avec le P»le M°dical de l'INSEP qui aiguillera chaque sportif qui subirait une blessure aux ischio-jambiers vers notre °quipe. Ces sportifs bless°s int±greront alors les °tudes 2 voire 3. Il devrait permettre (i) de mieux comprendre les liens entre les propri°t°s intrins±ques des ischio-jambiers et le risque de blessure, (ii) d'impl°menter les crit±res d°valuation et de retour © l'activit° post-blessure afin d'orienter les sportifs vers une prise en charge adapt°e, et (iii) in fine, contribuer © r°duire le nombre de blessures et de r°cidives.

**Faisabilité :** l'°tude 1 est bien avanc°e puisque qu'une centaine de sportifs de haut-niveau ont int°gr° le protocole. Comme le montre la Fig. 30, les outils d'analyse des donn°es existent et la mesure d'elasticit° semble sensible © la blessure musculaire. Les °tudes 2 et 3 seront r°alis°es en parall±le. Les premi±res exp°riments r°v±lent la difficult° que repr°sente la mise en place d'un suivi longitudinal de la blessure. Pour autant, une dizaine de sportifs ont int°gr° la phase 2. Ce projet men° en collaboration avec l'Universit° de Nantes et le P»le M°dical de l'INSEP, est financ° par le minist±re charg° des sports (contrat n°15-i-19). Nous avons °galement postul° © un appel d'offres °mis par la NBA et General Electric Health en novembre 2016. Si notre projet qui n'a pas °t° retenu, 3 des 4 projets financ°s cette ann°e concernent cette th°matique.

**Avancement :** les deux premi±res °tudes sont r°alis°es © 50%. Concernant la phase 3, il apparaît n°cessaire d'inclure des sujets suppl°mentaires pour disposer d'un °chantillon suffisant.

**Échéance de publications envisagées :** premier article pr°vu en 2017, deux articles envisag°s en 2018.

#### 4.2 Évaluation et optimisation des propriétés contractiles

La capacit° © produire des mouvements rapides est essentielle © la performance dans des t°ches motrices vari°es (i.e. saut, sprint). Mettant © profit les outils © notre disposition et les comp°tences de nos deux °quipes (laboratoires MIP et SEP), notre groupe de recherche a contribu° © mieux d°crire les contributions fasciculaires et tendineuses lors du test de *quick release* (Farcy et al., 2014) et lors de contractions concentriques balistiques maximales (Hauraix et al., 2013; Hauraix et al., 2015). Ces travaux nous ont permis de mesurer, pour la premi±re fois *in vivo*, la vitesse maximale de raccourcissement des fascicules musculaires. Par ailleurs, les derni±res °tudes en phase de publication soul±vent des hypoth±ses fortes quant aux facteurs limitant la performance lors de t°ches mobilisant plusieurs articulations. En particulier, il semble que la vitesse maximale de raccourcissement fasciculaire des extenseurs du genou plafonne lors de sauts verticaux effectu°s en conditions all°g°es (travail de th°se diHugo Hauraix). Aussi, l'am°lioration de cette propri°t° musculaire peut constituer une option s°rieuse pour am°liorer la performance © haute vitesse. Cette perspective trouve du sens actuellement puisque des travaux r°cents montrent l'int°r°t d'un entraînement individualisé tourn° vers le d°veloppement de la vitesse, sur l'°quilibre force-vitesse et la performance musculaire (Jimenez-Reyes et al., 2016; Markovic et al., 2013).

Dans le cadre d'une collaboration avec la soci°t° Eracls-Technology, le Laboratoire SEP a co-conçu un ergomètre innovant utilisant un moteur pilotable par l'intermédiaire d'algorithmes spécifiques. Les possibilités techniques offertes par ce nouvel outil couplées à l'utilisation de l'échographie haute-fréquence ouvrent aujourd'hui la voie à des recherches prometteuses relatives au comportement du muscle et du tendon lors de mouvements très rapides.

#### 4.2.1 Contributions fasciculaire et tendineuse aux mouvements explosifs

*Ex vivo*, la vitesse maximale de raccourcissement peut être déterminée à partir de la relation force-vitesse et du modèle de Hill (1938). Bien que cette méthode permette d'évaluer les propriétés musculaires sur un large panel de conditions de charge, elle ne rassemble pas nécessairement les conditions nécessaires à la production de la vitesse maximale de contraction sur le muscle entier (Claflin et Faulkner, 1989). La capacité à générer une vitesse maximale de raccourcissement dépend des caractéristiques des fibres qui composent le muscle et contribuent à la force totale produite. Ainsi, la vitesse à laquelle le muscle se raccourcit peut être supérieure à celle des fibres les plus lentes (Bottinelli et al., 1996). En 1979, Edman introduit le *slack test* comme une alternative visant à mesurer la vitesse maximale de raccourcissement. Cette méthode repose sur l'application d'une série de détirements à différentes amplitudes, sur une fibre en contraction isométrique. Appliquée au muscle entier, cette technique offre l'opportunité de déterminer la vitesse de raccourcissement des fibres les plus rapides en condition de charge totale. Deux études ont appliqué cette méthode *in situ* pour estimer la vitesse articulaire sans charge atteinte par l'homme (Sasaki et Ishii, 2005; 2010). Toutefois, la vitesse maximale articulaire est une mesure globale qui représente les contributions des différents muscles synergistes et antagonistes. Elle peut donc être influencée par divers facteurs biomécaniques tels que le bras de levier du tendon (Lee et Piazza, 2009), la rotation des fascicules musculaires (Azizi et al., 2008) ou les propriétés élastiques des tissus tendineux (Farcy et al., 2014; Hauraix et al., 2015). De plus, de tels mouvements rapides et peu naturels impliquent un contrôle nerveux spécifique (i.e. inhibition pré-synaptique, réflexe de charge) qui peut limiter la capacité à atteindre sa vitesse maximale de raccourcissement (Duchateau et Baudry, 2014b; Duclay et al., 2014).

Notre groupe a démontré que la vitesse maximale de raccourcissement fasciculaire du *gastrocnemius medialis* peut être estimée lors de contractions balistiques effectuées quasiment sans charge externe (Hauraix et al., 2015). Cependant, la littérature récente montre que les tissus tendineux ont une influence significative sur la performance motrice dans des tâches variées, telles que les contractions concentriques rapides (Cronin et Lichtwark, 2013; Hauraix et al., 2013; Hauraix et al., 2015). De plus, les régulations potentielles de la commande nerveuse mise en jeu pourraient sensiblement compliquer l'application du *slack test* à l'évaluation de la vitesse maximale de raccourcissement du muscle humain. Aussi, il apparaît crucial de comprendre le rôle des interactions muscle-tendon et du contrôle nerveux impliqués lors du *slack test* réalisé *in vivo*.

Nous proposons donc de mesurer la vitesse de raccourcissement des fascicules musculaires et les patrons d'activation du *gastrocnemius medialis* lors du *slack test* et de comparer les valeurs obtenues avec la vitesse maximale de raccourcissement mesurée en condition balistique sans charge (Fig. 31).




Fig. 31. Photographie de l'ergomètre mècanique (a) Eracles (Eracles-Technology, Compiègne, France) couplé aux mesures échographiques haute-fréquence (c). Le participant dispose d'un affichage en direct du couple de force produit et d'une cible à atteindre (en % du couple de force isométrique maximal ; b). Une fois le couple de force cible atteint de manière stable, le mouvement de la patte est déclenché par un trigger externe provenant de l'échographe 20 ms après le début de l'acquisition des images échographiques. Les positions de départ et d'arrivée, ainsi que le couple de force cible sont programmés par l'investigateur à l'aide d'un cran tactile (a). Travail de thèse de Robin Hager.

Ce projet sera réalisé en collaboration avec l'Université de Nantes (Dr Sylvain Dorel, Dr Antoine Nordez) et l'Université de Bruxelles (Pr Jacques Duchateau). Il constituera la première étude de thèse de Robin Hager, que je co-encadre. L'ergomètre mécanique co-conçu avec Eracles-Technology intègre un moteur pilote par un contrôleur électronique permettant de programmer un déplacement entre 2 angles articulaires (incluant toutes les positions possibles sur l'ensemble de l'amplitude de mouvement fixée au départ). En imposant des accélérations et décélérations très élevées ( $> 27000 \text{ rad.s}^{-2}$ ), l'appareil permet d'atteindre des vitesses supérieures à la vitesse maximale articulaire et d'annuler ainsi le couple de force appliquée par le participant sur la patte (i.e. principe du *slack test*). La conception intègre la possibilité de déclencher le mouvement de la patte à partir d'un trigger externe provenant de l'échographe, assurant ainsi une synchronisation parfaite entre l'acquisition des images échographiques et les paramètres mécaniques du mouvement (i.e. angle, couple de force, vitesse). Ce dispositif expérimental nous permettra d'analyser les vitesses fasciculaires et des tissus tendineux au cours du *slack test*, et leur relation avec la vitesse articulaire.

Dans seconde °tude, nous souhaitons effectuer les m°mes mesures lors du test standard d°valuation du taux de d°veloppement de la force en contraction isom°trique maximale (i.e. *rate of force development*, RFD ; (Maffiuletti et al., 2016). En effet, il a °t° montré que langle articulaire varie largement lors de contractions isom°triques maximales, induisant de fait des variations de lunit° muscle-tendon (Raiteri et al., 2015). Comme voqu° pr°c°demment, la cin°tique des variations de longueur des fascicules musculaires au cours de la contraction ne suit probablement pas celle de lunit°- muscle-tendon, notamment en raison du d°couplage induit par l°lasticit° du tendon. Aussi, contrairement à ce qui est admis, il est probable que ce test ne soit en r°alit° pas r°alis° en conditions isom°triques. Dans ce contexte, les travaux de l°quipe de recherche de Cresswell et Lichtwarck ont mis en °vidence le r°le des propri°t°s m°caniques du tendon dans la performance contractile, caract°ris°e à partir du RFD (Mayfield et al., 2016). Cependant, à notre connaissance, la contribution des fascicules musculaires lors de cette t°che explosive nia pas encore °t° d°crite. La vitesse de raccourcissement maximal est essentielle à la mise en tension rapide des structures °lastiques qui transmettent la force aux leviers osseux. Nous pouvons dès lors faire l'hypothèse que cette capacité influence le RFD. Il est par ailleurs possible que les vitesses de raccourcissement instantan°es atteignent des valeurs °lev°es au cours de ce test d°valuation de l'explosivit°. Cette °tude aura donc pour but de caract°riser les contributions fasciculaires et tendineuses au RFD et d°valuer l'impact de la tension passive initiale sur ces contributions (par la modification de langle de contraction).

**Faisabilité :** les outils (Fig. 31) et m°thodes n°cessaires à la mise en œuvre de ces °tudes sont op°rationnelles et disponibles. Ce travail s°inscrit dans le cadre de la th°se de Robin Hager que je co-encadre. La phase exp°imentale de la première °tude est achev°e et la 2nde est en cours de lancement. Ce projet en collaboration avec lUniversit° de Nantes et lUniversit° de Bruxelles, est financ° par un partenariat de recherche avec la soci°t° Actech. Le d°veloppement de lergomètre a été permis par l'obtention d'un financement d°livré par le ministère charg° des sports (contrat n°14-i-09). Un travail est en cours pour constituer un consortium en vue de postuler au Fonds Unique Interminist°riel, avec d'autres partenaires industriels.

**Avancement :** la première °tude est achev°e et la phase exp°imentale de la seconde °tude a d°but°.

**Échéances de publications envisagées :** premier article soumis en mai 2017, un 2nd avant d°cembre 2017.

#### 4.2.2 Solutions innovantes d'optimisation des interactions muscle-tendon

Dans les perspectives à plus long-terme, nous souhaitons explorer les liens entre les propri°t°s force-vitesse mesur°es au niveau articulaire, avec la performance globale mesur°e lors de gestes plus complexes se rapprochant de mouvements sportifs (e.g. saut vertical). Nous avons déjà mis en œuvre une première °tude visant à caract°riser les relations force-vitesse articulaire et fasciculaire au niveau des extenseurs du genou et des fl°chisseurs plantaires de la cheville lors de sauts verticaux charg°s et all°g°s (Fig. 32). Ces travaux doivent conduire à (i) caract°riser les propri°t°s force-vitesse en saut vertical sur une portion plus large de la relation, en

particulier vers les vitesses élevées ; (ii) proposer des protocoles innovants visant le développement des qualités de vitesse, qui semblent si essentielles à la performance (Jimenez-Reyes et al., 2016).



Fig. 33. Dispositif expérimental permettant l'analyse de sauts allongés. Travail de post-doctorat de Sasa Vuk (Université de Zagreb).

En utilisant l'ergomètre motorisé présent ci-dessus, nous pouvons aujourd'hui manipuler à volonté le stress mécanique en imposant tout type de résistance : isoinertielle, isotonique, isocinétique, élastique, pneumatique, hydraulique (Frost et al., 2010). Parmi les originalités fortes, ce nouvel outil permet de faire varier de manière dissociée les propriétés de force et d'inertie de la résistance imposée<sup>21</sup>. Ainsi il est possible d'appliquer une charge de 100 kg avec une inertie d'une charge de 10 kg, ou inversement. Le fait que la résistance soit pilotée par le moteur offre aussi la possibilité d'effectuer des mouvements en absence totale de charge, y compris en compensant le poids du segment mobilisé et de l'accessoire. Nous pourrions dès lors envisager de réaliser des tests balistiques permettant d'évaluer au plus près la vitesse maximale de raccourcissement fasciculaire (Hauraix et al., 2015).

Dans le cadre de la dernière étude de thèse de Robin Hager, nous souhaitons également tester la pertinence de ces modalités d'entraînement innovantes sur le développement de la vitesse maximale de raccourcissement fasciculaire et l'optimisation des interactions muscle-tendon. Cette thématique a été largement investiguée par notre équipe de recherche (Guilhem et al., 2012; Guilhem et al., 2013a). Le fait que toutes les séances puissent être effectuées sur le même ergomètre facilite grandement la standardisation des conditions d'exercice (Guilhem et al., 2012; Remaud et al., 2005). Nous souhaitons appliquer les méthodes déjà publiées dans le cadre de ma thèse de doctorat permettant de comparer différentes modalités d'entraînement dans des conditions standardisées (i.e. vitesse moyenne de mouvement et quantité de travail égales). Dans le cas où ces protocoles seraient efficaces pour améliorer la performance au niveau articulaire, nous pourrions envisager d'évaluer leur impact sur la performance dans des tâches plus complexes comme le saut ou le sprint. À cet

<sup>21</sup> Brevet n° WO2013060999 A1, déposé le 26 octobre 2012 par Eracis-Techology.

°gard, le d°part en sprint en course © pied repr°sente un mod±le int°ressant. En effet, la position des chevilles est diff°rente pour chaque pied dans les *starting blocks*. Cette configuration permet de quantifier l'impact de la tension passive initiale des structures °lastiques sur la vitesse fasciculaire atteinte, et ce en conditions °cologiques de r°alisation. Cependant, la mise en œuvre d'un tel protocole n°cessite des d°veloppements techniques (e.g. c°able de sonde plus long, chariot motorisé) permettant d'effectuer des mesures °chographiques sur deux muscles sur une distance de 20 © 30 m sans alt°rer la performance du sprinter.

**Faisabilité :** ce th±me est une application © l'exercice chronique (entraînement) qui reprend les techniques valid°es et standardis°es sur des mouvements mono-articulaires. Une première étude sur le saut all°g° est en cours d'analyse. Nous envisageons d'engager dans les prochains mois les études préliminaires permettant d'identifier les modalit°s de résistance les plus prometteuses en vue d'optimiser les interactions muscle-tendon. Nous avons également d°posé un projet pour financement dans le cadre de l'appel © projet 2017 °mis par le ministère charg° des sports.

**Avancement :** la première étude est en cours d'analyse. L'initiation de l'étude chronique est envisag°e en septembre 2017.

**Échéances de publications envisagées :** projection © 2 ans.

#### 4.2.3 Adaptations à la modalité de résistance : du muscle à la cellule

Notre groupe siest jusqu'© présent inscrit dans une d°marche de recherche mobilisant des techniques int°gr°es permettant d'explorer de manière non-invasive la motricit° et la performance humaine (Giroux et al., 2016; Hauraix et al., 2015; Rabita et al., 2015). La plupart du temps, cette approche siest r°v°l°e adapt°e pour investiguer la production de force et de mouvement. Toutefois, lorsqu'il siagit d'entrer dans les mécanismes cellulaires pouvant expliquer les r°ponses © l'exercice traumatisant (dommages) ou © l'entraînement (adaptations musculaires) nos r°sultats se heurtent © l'impossibilit° d'acc°der notamment © l'échelle cellulaire (i.e. fibre musculaire). Ces mesures seraient pertinentes par exemple pour tester *in situ* les hypoth°ses soulev°es pour expliquer l'augmentation du module de cisaillement post-dommages (Lacourpaille et al., 2014). En effet, nous pensons que la perturbation de l'homostasie calcique induite par les ruptures des membranes cellulaires est un des principaux facteurs responsables de cette augmentation de raideur musculaire (Proske et Morgan, 2001). Les corr°lations significatives obtenues entre l'augmentation du module et la perte de force (voir partie 2.3.2) renforcent cette id°e. Afin de pouvoir tester directement cette hypoth°se, nous mettons actuellement en place les conditions r°glementaires n°cessaires © la prise de biopsies sur le plateau technique du laboratoire SEP, en lien avec l'ARS et le Pôle Médical de l'INSEP<sup>22</sup>. Afin de réaliser les analyses cellulaires, nous sommes actuellement en discussion avec le groupe de Truls Raastad (École Norvégienne des Sciences du Sport), expert internationalement reconnu de la r°ponse cellulaire © l'exercice (Paulsen et al., 2012; Peake et al., 2017; Raastad et al., 2010).

<sup>22</sup> Groupe de travail conduit par Claire Thomas-Junius et Alain Frey, responsable du Pôle Médical de l'INSEP.

Cette première exp°érience vise © °prouver la faisabilit° technique et logistique d'un protocole aigu, présentant un coÀt logistique et exp°imental raisonnable. à plus long-terme, nous souhaitons mobiliser ces techniques pour appr°eender l'expression g°nique induite par diff°rentes modalit°s d'entraÀnement telles que celles offertes par notre ergom±tre m°catronique. Cette d°marche permettrait d'aller au bout de la d°marche de recherche visant © mesurer la plasticit° du muscle au stress m°canique, de la cellule (°chelle microscopique) © la performance sportive (°chelle macroscopique). Au niveau du laboratoire SEP, la construction de ce dispositif ouvrirait de r°elles perspectives en mati±re de quantification des effets d'un stress environnemental (chaleur, hypoxie, froid) et de l'entraÀnement sur les diff°rentes fonctions de l'organisme.

**Faisabilité :** cette °bauche de projet est au stade de la r°flexion. Une demande d'avènement © l'autorisation de lieu est en cours de d°p»t aupr±s de l'ARS. Une collaboration devra ²tre mise en place avec un laboratoire maîtrisant la mesure de l'expression g°nique au sein du muscle, et des contacts ont °t° initi°s avec l'ENSS, © Oslo (Norv±ge). Dans cette optique, la Norv±ge propose des aides permettant d'initier ce type de collaboration (programme Csgard-Recherche). Ce support pourrait ²tre utilis° pour r°aliser ces exp°riments.

**Avancement :** la demande d'avènement © l'autorisation de lieu est en cours de d°p»t et des contacts ont °t° pris avec l'quipe de l'ENSS.

**Échéances de publications envisagées :** projection © 3-4 ans.

#### 4.3 Application à la compréhension et à l'amélioration de la performance en sprint

Dans le cadre d'un projet coordonné par le Dr Giuseppe Rabita, réalis° en collaboration avec un consortium d'universit°s (S°ville, Nantes, Saint-Etienne, Paris-Ouest-Nanterre-La D°fense et Savoie), notre laboratoire a °labor° une m°thode exp°imentale originale permettant de d°crire la m°canique du sprint dans des conditions d'entraÀnement quasi-normales (Clark et Weyand, 2015; Rabita et al., 2015). Grâce © des plateformes de force dispos°es en s°rie sous le tartan d'une piste d'athl°tisme, outil quasi-unique en Europe, chaque appui de la phase d'acc°loration du sprint (de 0 © 40 m) a pu ²tre caract°ris°. à l'instar de ce qui a °t° fait dans d'autres activit°s sportives (e.g., le cyclisme) (Dorel et al., 2010), nous avons pu reconstituer les relations force-vitesse et puissance-vitesse sp°cifiques en sprint (Fig. 33). D'un point de vue pratique, cette nouvelle m°thode permet de caract°riser les profils individualis°s des athl±tes. D'un point de vue scientifique, au vu de la population °lite °tudi°e, elle permet d'appr°eender certains aspects des limites de la locomotion humaine. Ces mesures ont permis d'identifier des d°terminants innovants de la performance en sprint (e.g. diminution du ratio de force) suffisamment sensibles pour distinguer la tr±s haute performance d'athl±tes de bon niveau (Rabita et al., 2015). Toutefois, les trac°s obtenus mettent en °vidence des difficult°s m°thodologiques © explorer la portion la plus © gauche de relation force-vitesse, i.e. © hauts niveaux de force et faibles niveaux de vitesse. De plus, ces travaux n'ont pas investigu° les propri°t°s neuromusculaires et biom°caniques individuelles qui pourraient expliquer ces diff°rences de performance mesur°es *in situ*.




Fig. 33. Illustration de deux d°parts r°alis°s sur les plateformes de force en s°rie (photographies) et relations force-vitesse (a) et puissance-vitesse (b) obtenues © partir de ces mesures. Diapr±s Rabita et al. (2015).

Afin de poursuivre ce travail, nous souhaitons caract°riser la m°canique du sprint dans deux conditions d'entra°nement : i) le sprint en r°sistance (freinage de l'athl±te) et ii) le sprint assist° (survitesse). Ces deux modalit°s sont utilis°es en routine chez les sprinters °lites sans que les effets de ces m°thodes sur la performance ne soient clairement d°termin°s. Parall±lement © cette probl°matique m°canique, nous projetons d'explorer les implications de ces deux conditions de sprint sur les coordinations musculaires. Enfin, nous envisageons de d°crire le r°le des propri°t°s contractiles et °lastiques de l'unit° muscle-tendon des athl±tes dans leur aptitude © maintenir des fr°quences gestuelles °lev°es.

Ces projets doivent permettre di°valuer la pertinence de l'ensemble des m°thodes d°velopp°es en laboratoire dans un contexte °cologique. Ils ont pour finalit° de contribuer © am°liorer notre compr°hension de la motricit° humaine en vue d'optimiser la performance sportive.

#### 4.3.1 Coordinations musculaires en sprint résisté et assisté

Les sprints en r°sistance sont utilis°s en routine lors de l'entra°nement des athl±tes de haut niveau (Hrysomallis, 2012; Petrakos et al., 2016). Malgr° l'augmentation du nombre d°tudes qui ont pour but d°valuer leurs caract°ristiques par l'utilisation des m°thodes classiques, de nombreuses questions demeurent concernant

les sprinteurs °lites. Afin d'imposer des sprints r°sist°s, des dispositifs motoris°s ont fait leur apparition dans le paysage du sprint °lite fran°ais. Non seulement ils pourraient permettre de r°duire les probl°mes de quantification des m°thodes classiques, mais leur technologie pourrait permettre d'envisager une calibration fine de l'entra°nement. Cependant, avant d°valuer l'effet de l'utilisation de ce mat°riel sur la progression des athl°tes, il est n°cessaire de caract°riser le comportement m°canique et neuromusculaire de ces sprinteurs en fonction de la r°sistance impos°e. La plupart des °tudes scientifiques qui tentent d°valuer les caract°ristiques du sprint r°sist° utilisent le chariot lest° (Kawamori et al., 2014; Martinez-Valencia et al., 2014). Morin et al. (2016) ont r°cemment montré l'efficacit° d'un entra°nement à haut niveau de r°sistance avec chariot (i.e. 80% de la masse corporelle) pour augmenter la capacit° de production de force horizontale et la performance en sprint en comparaison d'un entra°nement sans charge. Toutefois, l'impact de ce type de r°sistance d°pend notamment des forces de frottements et donc des caract°ristiques du chariot et du type de surface au sol (Cross et al., 2016b; Linthorne et Cooper, 2013). De plus, l'orientation de la ligne reliant le chariot au point d'attache et les caract°ristiques inertielles du chariot produisent des perturbations au niveau du point de traction qui sont susceptibles d'affecter le comportement du sprinteur. Afin de d°passer cette limit° m°thodologique, Cross et al. (2016b) ont quantifi° les forces de friction et propos° un mod±le permettant de d°duire la force horizontale efficace en sprint r°sist°. Cependant, la relation obtenue est d°pendante de la vitesse, rendant difficile l'utilisation du chariot comme m°thode d'application d'une r°sistance des conditions de d°part en *starting blocks*.

Dans leur revue de litt°rature, Hrysomallis (2012) r°v°lent un manque de donn°es exp°imentales qui emp°che de caract°riser pr°cis°ment les processus adaptatifs induits lors d'entra°nements en sprint charg°. Certaines °tudes ont compar° les activit°s musculaires (Okkonen et Hakkinen, 2013), les param±tres spatiotemporels (Martinez-Valencia et al., 2014) ou les variables m°caniques (Kawamori et al., 2013) entre la condition r°sist°e et normale. Cependant, aucune °tude, à notre connaissance, n'a initi° ces comparaisons auprés d'une population de sprinteurs °lites. L'utilisation r°cente de dispositifs motoris°s (Fig. 34) pour imposer une r°sistance aux sprinteurs pr°sente plusieurs avantages. La r°sistance appliqu°e par l'interv°diaire d'un c°ble est quasiment parall°le au sol, ce qui limite la composante verticale. L'utilisation de ces dispositifs peut donc ²tre adapt°e aux conditions de d°part en *starting blocks*, phase essentielle de la performance (Rabita et al., 2015; Slawinski et al., 2010). De plus, la r°sistance peut ²tre pr°cis°ment d°finie et impos°e en s'affranchissant des propri°t°s de la surface du sol, ouvrant la voie à une calibration fine de la charge, permettant de cibler le d°veloppement d'une capacit° musculaire sp°cifique (i.e. force, puissance, vitesse) et individualisé (Cross et al., 2016a).

Les sprints assist°s sont °galement tr±s utilis°s chez les sprinteurs. La m°thode la plus commune pour permettre à l'athl°te d'atteindre des vitesses proches ou sup°rieures aux vitesses maximales atteintes en comp°tition reste la course en descente (Ebben, 2008). Toutefois, cette technique modifie les conditions °cologiques du sprint, puisqu'elle accentue notamment la composante fr°natrice et donc l'intensit° des contractions excentriques par rapport à une course sur le plat (Eston et al., 1995). Les dispositifs motoris°s permettant d'appliquer une r°sistance peuvent aujourd'hui ²tre utilis°s en condition d'assistance : les sprinteurs,

tir°s vers l'avant au niveau du bassin sont alors capables d'atteindre des vitesses sup°rieures à leur vitesse maximale (Fig. 34).

Nous projetons donc de répondre à la question suivante : peut-on, lors d'un sprint, imposer les puissances voulues par le seul réglage de la résistance du dispositif motorisé ? Nous proposons donc de caractériser les relations force- et puissance-vitesse en condition de sprint en résistance et survitesse, et d'explorer les coordinations musculaires impliquées en fonction des résistances imposées. Des mesures préliminaires nous ont permis de vérifier la reproductibilité des patrons mécaniques de la foulée dans les deux conditions. Par ailleurs, nous avons calibré et validé les mesures de vitesse effectuées par le système motorisé. Une fois cette étude descriptive finalisée, nous pourrons raisonnablement envisager d'évaluer les effets d'entraînements individualisés pour modifier le profil force-vitesse de sprinters élites (Cross et al., 2016a). À l'image des travaux effectués sur le saut vertical (Jimenez-Reyes et al., 2016), ce travail doit conduire à déterminer les protocoles d'entraînement optimaux en vue d'améliorer la performance, notamment à partir des critères précisément proposés par notre équipe (Rabita et al., 2015). En effet, le sprint résistant à charge élevée permet d'augmenter la capacité de production de force horizontale, avec en revanche un effet limité sur la puissance maximale et aucun effet sur la vitesse maximale (Morin et al., 2016). Dans le prolongement de cette étude, Cross et al. (2017) ont récemment montré que les charges additionnelles permettant de maximiser la puissance maximale en sprint sont comprises entre 69 et 96% de la masse corporelle, bien au-dessus des résistances classiquement utilisées (i.e. à 30%). À la lumière de ces travaux, il semble désormais intéressant de déterminer les méthodes les plus efficaces pour améliorer la puissance et la vitesse maximales, facteurs déterminants de la performance en sprint.




Fig. 34. A, schéma illustrant le principe d'utilisation du dispositif motorisé lors d'un sprint résistant. Une résistance constante crée une force inverse à l'avancée de l'athlète. B, photographie présentant l'utilisateur réglant manuellement la résistance du dispositif motorisé. C, photographie du filin de 160 m qui se déroule.

**Faisabilité :** ce projet a fait l'objet d'un financement par le ministère chargé des sports (contrat n°14-i-029). L'étude de reproductibilité/validité est finalisée et un premier article est en cours de rédaction. La phase expérimentale de l'étude est en cours et se poursuivra pendant les prochains mois.

**Avancement :** la validation méthodologique est finalisée et la phase expérimentale de l'étude est achevée à 50%.

**Échéances de publications envisagées :** 1 article envisagé en 2017, 1 article prévu en 2018.

#### 4.3.2 Relations entre propriétés musculaires et performance en sprint

Afin d'aller plus loin et de mieux identifier les facteurs qui conditionnent cette vitesse maximale, nous nous intéresserons à une problématique permettant de connecter les concepts développés dans la partie 2.4 à la performance en sprint. Elle concerne les propriétés mécaniques des structures musculo-tendineuses et de vitesse de contraction maximale des sprinteurs. Nous savons que les sprinters présentent des propriétés architecturales et mécaniques qui les différencient de sportifs issus d'autres disciplines ou de la population générale (Kubo et al., 2011; Kubo et al., 2000; Seynnes et al., 2015). En particulier, il semble que la pratique chronique de cette activité augmente la raideur tendineuse, ce qui peut contribuer à accélérer la transmission de force musculaire aux leviers osseux et donc la force appliquée au sol dans des temps très courts (Kubo et al., 2000). Dans le prolongement de cette idée, il a été montré que le principal facteur limitant l'augmentation de la vitesse chez l'homme n'était pas lié à sa capacité à produire plus de force au sol mais bien à diminuer le temps de contact nécessaire pour appliquer cette force (Weyand et al., 2010). À des vitesses très élevées, la force que peut appliquer le sprinteur au sol dans un temps très court dépend majoritairement des niveaux de pré-activation et de la raideur des tendons des muscles extenseurs des membres inférieurs, en particulier des fléchisseurs plantaires (Aramatzis et al., 2007; Weyand et al., 2010). Nous avons également montré que la vitesse de raccourcissement des fascicules musculaires du *gastrocnemius medialis* était reliée à la vitesse maximale articulaire (Hauraix et al., 2015), et donc à sa capacité à exercer de la force à haute vitesse. Dans ce contexte, il paraît intéressant d'investiguer l'influence des propriétés élastiques musculo-tendineuses et des vitesses articulaires et de raccourcissement fasciculaire maximales sur la capacité des athlètes à atteindre des vitesses extrêmes en sprint.

Nous proposons donc de mettre en place une étude qui aura pour but de caractériser et de comparer ces propriétés auprès d'athlètes élites et sub-élites. Ces paramètres pourront également être confrontés au niveau de performance des sprinters. Des résultats préliminaires nous confortent dans l'idée que cette perspective de recherche est prometteuse. En effet, nous avons caractérisé les relations force vitesse en flexion plantaire auprès de sprinters élites parmi les meilleurs français (Fig. 35). Nos résultats mettent en évidence que le sprinter le plus performant au sein de cet échantillon n'est pas celui qui possède la capacité de production de force maximale la plus élevée en flexion plantaire. En revanche, ce même sprinter présente une vitesse maximale articulaire qui dépasse largement la moyenne du groupe ( $931 \text{ cm.s}^{-1}$  vs.  $736 \pm 106 \text{ cm.s}^{-1}$ , respectivement). De manière encore plus intéressante, la vitesse de raccourcissement fasciculaire maximale atteinte par cet athlète n'est pas la plus élevée ( $36.5 \text{ cm.s}^{-1}$  vs.  $35.6 \pm 3.7 \text{ cm.s}^{-1}$  en moyenne pour l'ensemble du groupe), suggérant le rôle fondamental des propriétés élastiques de l'unité muscle-tendon dans la capacité à exercer de la force à hauts niveaux de vitesse.




Fig. 35. Relations force-vitesse de 7 sprinters  $\circ$ lites obtenue  $\circ$  partir de contractions balistiques et isocin $\circ$ tiques maximales des fl $\circ$ chiseurs plantaires (Hauraix et al ., 2015). Le sprinter #4 se classe uniquement 3<sup>e</sup> en termes de capacit $\circ$  de production de force maximale, mais il pr $\circ$ sente de loin la vitesse articulaire maximale la plus  $\circ$ lev $\circ$ e. Il est  $\circ$ galement le plus rapide de l*échantillon sur 100 m*. Les trac $\circ$ s en gris fonc $\circ$  et gris clair repr $\circ$ sentent respectivement la relation moyenne obtenue pour cet  $\circ$ chantillon et pour des s $\circ$ dentaires.

Il apparaît d $\pm$ s lors ind $\circ$ niable que ce projet, au croisement de la plupart des th $\circ$ matiques abord $\circ$ es dans ce m $\circ$ oire, devrait nous permettre d $\circ$ aller plus loin vis- $\circ$ -vis : (i) de l $\circ$ identification des facteurs intrins $\pm$ ques conduisant  $\circ$  la haute performance et (ii) de la construction de protocoles d $\circ$ valuation innovants permettant de d $\circ$ terminer les effets sp $\circ$ cifiques de modalit $\circ$ s d $\circ$ entra $\circ$ nement individualis $\circ$ es (voir partie 4.2).

**Faisabilité :** ce projet, financ $\circ$  par le minist $\circ$ re charg $\circ$  des sports (contrat n $\circ$ 14-i-029), se d $\circ$ roule en parall $\pm$ le de l $\circ$ tude pr $\circ$ c $\circ$ dente. La phase exp $\circ$ rimentale de l $\circ$ tude est en cours et se poursuivra pendant les 3 prochains mois.

**Avancement :** la phase exp $\circ$ rimentale est en cours et r $\circ$ alis $\circ$ e  $\circ$  50%.

**Échéances de publications envisagées :** 1 article pr $\circ$ vu en 2018.

## Conclusion

Les orientations propos°es dans ce quatri±me chapitre ont pour vocation de dresser les perspectives de recherche, © la fois prioritaires et r°alistes de mon point de vue, © investiguer dans les prochaines ann°es.

Les diff°rents projets visant © mieux comprendre les m°canismes qui sous-tendent les l°sions du tissu musculaire me tiennent particuli±rement © c ð ur puisqu'ils repr°sentent le prolongement de mes premiers travaux de th±se. L'int°gration des m°thodes issues de la biologie cellulaire peuvent © terme faire co·ncider ma formation acad°mique initiale (biologie int°grative) avec mes int°r°ts scientifiques r°cents. Dans cette optique, l'apport de l'i°lastographie a ouvert des possibilit°s nouvelles qui suscitent l'int°r°t d'i°quipes de recherche °trang±res (e.g. École Norv°gienne des Sciences du Sport, Norv±ge). L'application de cette technique dans le contexte de la blessure permet d'envisager des applications dans le domaine clinique. ©tant donn° le fardeau que repr°sentent les blessures musculaires dans de nombreux sports, ces nouvelles techniques d'imagerie pourraient se traduire par des progr±s significatifs en termes de performance, gr°ce © une meilleure pr°servation de l'int°rit° physique des sportifs.

Le rapprochement avec des partenaires industriels poss°dant des comp°tences solides en ing°nierie, programmation ou traitement du signal apparaît aujourd'hui comme un v°ritable levier dans la mise en œuvre de projets originaux. Dans ce contexte, les d°veloppements technologiques auxquels nous avons particip° offrent aujourd'hui l'opportunit° de d°velopper des m°thodes d°valuation et d'entraînement innovantes. Ces avanc°es techniques doivent nous amener © mieux individualiser l'entraînement des capacit°s athl°tiques et de mieux appr°hender ses effets sur la fonction musculaire.

L'apport de l'i°chographie haute fr°quence nous a permis de mieux appr°hender les facteurs qui influencent la capacit° © r°aliser des mouvements rapides et leurs liens avec la performance dans des activit°s r°alis°s © haute intensit°. L'un des enjeux majeurs dans les ann°es © venir sera de pouvoir appliquer cette m°thode © l'analyse de la performance motrice en conditions °cologiques de r°alisation. C'est dans cette d°marche que notre °quipe souhaite s'inscrire afin d'amener le laboratoire au terrain, de mieux comprendre pour mieux entraîner.

## Références |

- Aagaard P, Simonsen EB, Andersen JL, Magnusson SP, Bojsen-Møller F, Dyhre-Poulsen P. Antagonist muscle coactivation during isokinetic knee extension. *Scand J Med Sci Sports*. 2000;10:58-67.
- Abbott BC, Aubert XM. The force exerted by active striated muscle during and after change of length. *The Journal of Physiology*. 1952;117:77-86.
- American College of Sports M. American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. *Med Sci Sports Exerc*. 2009;41:687-708.
- Andersson E, Sward L, Thorstensson A. Trunk muscle strength in athletes. *Med Sci Sports Exerc*. 1988;20:587-93.
- Andonian P, Viallon M, Le Goff C, de Bourguignon C, Tourel C, Morel J, et al. Shear-Wave Elastography Assessments of Quadriceps Stiffness Changes prior to, during and after Prolonged Exercise: A Longitudinal Study during an Extreme Mountain Ultra-Marathon. *PLoS One*. 2016;11:e0161855.
- Arampatzis A, Karamanidis K, Morey-Klapsing G, De Monte G, Stafilidis S. Mechanical properties of the triceps surae tendon and aponeurosis in relation to intensity of sport activity. *J Biomech*. 2007;40:1946-52.
- Asklung C, Saartok T, Thorstensson A. Type of acute hamstring strain affects flexibility, strength, and time to return to pre-injury level. *Br J Sports Med*. 2006;40:40-4.
- Ates F, Hug F, Bouillard K, Jubeau M, Frappart T, Couade M, et al. Muscle shear elastic modulus is linearly related to muscle torque over the entire range of isometric contraction intensity. *J Electromyogr Kinesiol*. 2015.
- Azizi E, Brainerd EL, Roberts TJ. Variable gearing in pennate muscles. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2008;105:1745-50.
- Azizi E, Roberts TJ. Geared up to stretch: pennate muscle behavior during active lengthening. *J Exp Biol*. 2014;217:376-81.
- Babault N, Pousson M, Ballay Y, Van Hoecke J. Activation of human quadriceps femoris during isometric, concentric, and eccentric contractions. *J Appl Physiol*. 2001;91:2628-34.
- Babault N, Pousson M, Michaut A, Van Hoecke J. Effect of quadriceps femoris muscle length on neural activation during isometric and concentric contractions. *J Appl Physiol*. 2003;94:983-90.
- Behm DG, Sale DG. Velocity specificity of resistance training. *Sports Med*. 1993;15:374-88.
- Beltman JG, Sergeant AJ, van Mechelen W, de Haan A. Voluntary activation level and muscle fiber recruitment of human quadriceps during lengthening contractions. *J Appl Physiol*. 2004;97:619-26.
- Bercoff J, Tanter M, Fink M. Supersonic shear imaging: a new technique for soft tissue elasticity mapping. *IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control*. 2004;51:396-409.
- Bleakley C, McDonough S, Gardner E, Baxter GD, Hopkins JT, Davison GW. Cold-water immersion (cryotherapy) for preventing and treating muscle soreness after exercise. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012;2:CD008262.
- Bleakley CM, Hopkins JT. Is it possible to achieve optimal levels of tissue cooling in cryotherapy? *Physical Therapy Reviews*. 2010;15:344-50.
- Bobbert MF. Effect of unloading and loading on power in simulated countermovement and squat jumps. *Med Sci Sports Exerc*. 2014;46:1176-84.
- Bobbert MF, van Ingen Schenau GJ. Coordination in vertical jumping. *J Biomech*. 1988;21:249-62.
- Bottinelli R, Canepari M, Pellegrino MA, Reggiani C. Force-velocity properties of human skeletal muscle fibres: myosin heavy chain isoform and temperature dependence. *J Physiol*. 1996;495 ( Pt 2):573-86.
- Brockett CL, Morgan DL, Proske U. Human hamstring muscles adapt to eccentric exercise by changing optimum length. *Med Sci Sports Exerc*. 2001;33:783-90.
- Brooks SV, Zerba E, Faulkner JA. Injury to muscle fibres after single stretches of passive and maximally stimulated muscles in mice. *J Physiol*. 1995;488 ( Pt 2):459-69.
- Buchanan TS, Lloyd DG, Manal K, Besier TF. Neuromusculoskeletal Modeling: Estimation of Muscle Forces and Joint Moments and Movements From Measurements of Neural Command. *Journal of applied biomechanics*. 2004;20:367-95.
- Butterfield TA. Eccentric exercise *in vivo*: strain-induced muscle damage and adaptation in a stable system. *Exerc Sport Sci Rev*. 2010;38:51-60.
- Cavanagh PR, Komi PV. Electromechanical delay in human skeletal muscle under concentric and eccentric contractions. *Eur J Appl Physiol Occup Physiol*. 1979;42:159-63.
- Chauveau A. Comparaison de l'énergie mise en œuvre par les muscles dans les cas de travail positif et de travail négatif correspondant. *J Physiol (Paris)*. 1896;122:91-7.
- Chen W, Ruell PA, Ghodousi M, Kee A, Hardeman EC, Hoffman KM, et al. Ultrastructural changes and sarcoplasmic reticulum Ca<sup>2+</sup> regulation in red vastus muscle following eccentric exercise in the rat. *Exp Physiol*. 2007;92:437-47.
- Chumanov ES, Heiderscheit BC, Thelen DG. The effect of speed and influence of individual muscles on ham string mechanics during the swing phase of sprinting. *J Biomech*. 2007;40:3555-62.
- Clafelin DR, Faulkner JA. The force-velocity relationship at high shortening velocities in the soleus muscle of the rat. *J Physiol*. 1989;411:627-37.
- Clark KP, Weyand PG. Sprint running research speeds up: A first look at the mechanics of elite acceleration. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*. 2015;25:581-2.
- Clarkson PM, Hubal MJ. Exercise-induced muscle damage in humans. *Am J Phys Med Rehabil*. 2002;81:S52-69.
- Cleak MJ, Eston RG. Muscle soreness, swelling, stiffness and strength loss after intense eccentric exercise. *Br J Sports Med*. 1992;26:267-72.
- Cormie P, McGuigan MR, Newton RU. Developing Maximal Neuromuscular Power: Part 1 – Biological Basis of Maximal Power Production. *Sports Med*. 2011;41:17-38 10.2165/11537690-00000000-00000.

- Costello JT, Algar LA, Donnelly AE. Effects of whole-body cryotherapy (-110 degrees C) on proprioception and indices of muscle damage. *Scand J Med Sci Sports.* 2012;22:190-8.
- Croisier JL, Forthomme B, Namurois MH, Vanderthommen M, Crielaard JM. Hamstring muscle strain recurrence and strength performance disorders. *Am J Sports Med.* 2002;30:199-203.
- Croisier JL, Ganteaume S, Binet J, Genty M, Ferret JM. Strength imbalances and prevention of hamstring injury in professional soccer players: a prospective study. *Am J Sports Med.* 2008;36:1469-75.
- Cronin NJ, Carte CP, Barrett RS, Lichtwark G. Automatic tracking of medial gastrocnemius fascicle length during human locomotion. *J Appl Physiol.* 2011;111:1491-6.
- Cronin NJ, Lichtwark G. The use of ultrasound to study muscle-tendon function in human posture and locomotion. *Gait Posture.* 2013;37:305-12.
- Cross MR, Brughelli M, Samozino P, Brown SR, Morin JB. Optimal Loading for Maximising Power During Sled-resisted Sprinting. *Int J Sports Physiol Perform.* 2017;1:25.
- Cross MR, Brughelli M, Samozino P, Morin JB. Methods of Power-Force-Velocity Profiling During Sprint Running: A Narrative Review. *Sports Med.* 2016a.
- Cross MR, Tinwala F, Lenetsky S, Samozino P, Brughelli M, Morin JB. Determining friction and effective loading for sled sprinting. *J Sports Sci.* 2016b;1:6.
- de Visser H, Reijman M, Heijboer M, Bos P. Risk factors of recurrent hamstring injuries: a systematic review. *British Journal of Sports Medicine.* 2012;46:124-30.
- Del Valle A, Thomas CK. Firing rates of motor units during strong dynamic contractions. *Muscle Nerve.* 2005;32:316-25.
- Devlin L. Recurrent posterior thigh symptoms detrimental to performance in rugby union: predisposing factors. *Sports Med.* 2000;29:273-87.
- Doguet V, Jubeau M, Dorel S, Couturier A, Lacourpaille L, Guevel A, et al. Time-Course of Neuromuscular Changes during and after Maximal Eccentric Contractions. *Front Physiol.* 2016;7:137.
- Dorel S, Couturier A, Lacour JR, Vandewalle H, Hautier C, Hug F. Force-velocity relationship in cycling revisited: benefit of two-dimensional pedal forces analysis. *Med Sci Sports Exerc.* 2010;42:1174-83.
- Duchateau J, Baudry S. Insights into the neural control of eccentric contractions. *Journal of applied physiology (Bethesda, Md : 1985).* 2014a;116:1418-25.
- Duchateau J, Baudry S. Maximal discharge rate of motor units determines the maximal rate of force development during ballistic contractions in human. *Front Hum Neurosci.* 2014b;8:234.
- Duchateau J, Enoka RM. Neural control of shortening and lengthening contractions: influence of task constraints. *J Physiol.* 2008;586:5853-64.
- Duchateau J, Enoka RM. Human motor unit recordings: Origins and insight into the integrated motor system. *Brain Res.* 2011.
- Duclay J, Pasquet B, Martin A, Duchateau J. Specific modulation of spinal and cortical excitabilities during lengthening and shortening submaximal and maximal contractions in plantar flexor muscles. *Journal of applied physiology (Bethesda, Md : 1985).* 2014;jap 00489 2014.
- Dufek JS, Bates BT. Biomechanical factors associated with injury during landing in jump sports. *Sports Med.* 1991;12:326-37.
- Ebben WP. The optimal downhill slope for acute overspeed running. *Int J Sports Physiol Perform.* 2008;3:88-93.
- Edman KA. The velocity of unloaded shortening and its relation to sarcomere length and isometric force in vertebrate muscle fibres. *J Physiol.* 1979;291:143-59.
- Elmer SJ, Barratt PR, Korff T, Martin JC. Joint-specific power production during submaximal and maximal cycling. *Med Sci Sports Exerc.* 2011;43:1940-7.
- Enoka RM. Eccentric contractions require unique activation strategies by the nervous system. *J Appl Physiol.* 1996;81:2339-46.
- Ericson M. On the biomechanics of cycling. A study of joint and muscle load during exercise on the bicycle ergometer. *Scand J Rehabil Med Suppl.* 1986;16:1-43.
- Eston RG, Mickelborough J, Baltzopoulos V. Eccentric activation and muscle damage: biomechanical and physiological considerations during downhill running. *Br J Sports Med.* 1995;29:89-94.
- Farcy S, Nordez A, Dorel S, Hauraix H, Portero P, Rabita G. Interaction between gastrocnemius medialis fascicle and Achilles tendon compliance: a new insight on the quick-release method. *Journal of applied physiology (Bethesda, Md : 1985).* 2014;116:259-66.
- Farris DJ, Lichtwark GA. UltraTrack: Software for semi-automated tracking of muscle fascicles in sequences of B-mode ultrasound images. *Comput Methods Programs Biomed.* 2016;128:111-8.
- Fiorentino NM, Rehner MR, Chumanov ES, Thelen DG, Blemker SS. Computational models predict larger muscle tissue strains at faster sprinting speeds. *Med Sci Sports Exerc.* 2014;46:776-86.
- Franchi MV, Atherton PJ, Reeves ND, Fluck M, Williams J, Mitchell WK, et al. Architectural, functional and molecular responses to concentric and eccentric loading in human skeletal muscle. *Acta Physiol (Oxf).* 2014;210:642-54.
- Frère J, Gopfert B, Nuesch C, Huber C, Fischer M, Wirz D, et al. Kinematical and EMG-classifications of a fencing attack. *Int J Sports Med.* 2011;32:28-34.
- Friden J. Delayed onset muscle soreness. *Scand J Med Sci Sports.* 2002;12:327-8.

- Friden J, Seger J, Sjostrom M, Ekblom B. Adaptive response in human skeletal muscle subjected to prolonged eccentric training. *Int J Sports Med.* 1983;4:177-83.
- Friesenbichler B, Item J, Neunstöcklin F, Casartelli N, Guilhem G, Maffiuletti N. Differences in trunk and thigh muscle function between elite sailors and non-sailors. *Sports Biomech.* 2016;[Epub ahead of print].
- Frost DM, Cronin J, Newton RU. A biomechanical evaluation of resistance: fundamental concepts for training and sports performance. *Sports Med.* 2010;40:303-26.
- Frost DM, Cronin JB, Newton RU. A comparison of the kinematics, kinetics and muscle activity between pneumatic and free weight resistance. *Eur J Appl Physiol.* 2008;104:937-56.
- Fukunaga T, Kubo K, Kawakami Y, Fukashiro S, Kanehisa H, Maganaris CN. In vivo behaviour of human muscle tendon during walking. *Proc Biol Sci.* 2001;268:229-33.
- Galindo A, Barthelemy J, Ishikawa M, Chavet P, Martin V, Avela J, et al. Neuromuscular control in landing from supra-maximal dropping height. *Journal of applied physiology (Bethesda, Md : 1985).* 2009;106:539-47.
- Garrett WE, Califf JC, Bassett FH. Histochemical correlates of hamstring injuries. *The American Journal of Sports Medicine.* 1984;12:98-103.
- Gennisson JL, Deffieux T, Mace E, Montaldo G, Fink M, Tanter M. Viscoelastic and anisotropic mechanical properties of in vivo muscle tissue assessed by supersonic shear imaging. *Ultrasound Med Biol.* 2010;36:789-801.
- Giroux C, Rabita G, Chollet D, Guilhem G. Optimal balance between force and velocity differs among world-class athletes. *J Appl Biomech.* 2016;32:59-68.
- Green MA, Sinkus R, Gandevia SC, Herbert RD, Bilston LE. Measuring changes in muscle stiffness after eccentric exercise using elastography. *NMR Biomed.* 2012;25:852-8.
- Gregoire L, Veeger HE, Huijing PA, van Ingen Schenau GJ. Role of mono- and biarticular muscles in explosive movements. *Int J Sports Med.* 1984;5:301-5.
- Grieve D, Pheasant S, Cavanagh PR. Prediction of gastrocnemius length from knee and ankle joint posture. In: Asmussen E, Jorgensen, K., editor. *International series on biomechanics.* Baltimore: University Park Press; 1978. p. 405-12.
- Guilhem G. L'entraînement musculaire à la croisade des chemins. *R<sup>°</sup>flexions sport.* 2014;9:58-81.
- Guilhem G, Cornu C, Guevel A. Muscle architecture and EMG activity changes during isotonic and isokinetic eccentric exercises. *Eur J Appl Physiol.* 2011;111:2723-33.
- Guilhem G, Cornu C, Guevel A. A methodologic approach for normalizing angular work and velocity during isotonic and isokinetic eccentric training. *J Athl Train.* 2012;47:125-9.
- Guilhem G, Cornu C, Maffiuletti NA, Guevel A. Neuromuscular adaptations to isoload versus isokinetic eccentric resistance training. *Med Sci Sports Exerc.* 2013a;45:326-35.
- Guilhem G, Doguet V, Hauraix H, Lacourpaille L, Jubeau M, Nordez A, et al. Muscle force loss and soreness subsequent to maximal eccentric contractions depend on the amount of fascicle strain in vivo. *Acta Physiol (Oxf).* 2016;217:152-63.
- Guilhem G, Guevel A, Cornu C. A standardization method to compare isotonic vs. isokinetic eccentric exercises. *J Electromyogr Kinesiol.* 2010;20:1000-6.
- Guilhem G, Hug F, Couturier A, Regnault S, Bournat L, Filliard JR, et al. Effects of air-pulsed cryotherapy on neuromuscular recovery subsequent to exercise-induced muscle damage. *Am J Sports Med.* 2013b;41:1942-51.
- Hagglund M, Walden M, Magnusson H, Kristenson K, Bengtsson H, Ekstrand J. Injuries affect team performance negatively in professional football: an 11 -year follow-up of the UEFA Champions League injury study. *Br J Sports Med.* 2013;47:738-42.
- Hauraix H, Nordez A, Dorel S. Shortening behavior of the different components of muscle-tendon unit during isokinetic plantar flexions. *Journal of applied physiology (Bethesda, Md : 1985).* 2013;115:1015-24.
- Hauraix H, Nordez A, Guilhem G, Rabita G, Dorel S. In vivo maximal fascicle-shortening velocity during plantar flexion in humans. *Journal of applied physiology (Bethesda, Md : 1985).* 2015;119:1262-71.
- Hautier CA, Arsac LM, Deghdegh K, Souquet J, Belli A, Lacour JR. Influence of fatigue on EMG/force ratio and cocontraction in cycling. *Med Sci Sports Exerc.* 2000;32:839-43.
- Hedayatpour N, Falla D. Non-uniform muscle adaptations to eccentric exercise and the implications for training and sport. *J Electromyogr Kinesiol.* 2012;22:329-33.
- Hentzen ER, Lahey M, Peters D, Mathew L, Barash IA, Friden J, et al. Stress-dependent and -independent expression of the myogenic regulatory factors and the MARP genes after eccentric contractions in rats. *J Physiol.* 2006;570:157-67.
- Herbert RD, Clarke J, Kwah LK, Diona J, Martin J, Clarke EC, et al. In vivo passive mechanical behaviour of muscle fascicles and tendons in human gastrocnemius muscle-tendon units. *J Physiol.* 2011;589:5257-67.
- Herzog JA, Leonard TR, Jinha A, Herzog W. Titin (visco-) elasticity in skeletal muscle myofibrils. *Mol Cell Biomech.* 2014;11:1-17.
- Herzog W. The role of titin in eccentric muscle contraction. *The Journal of Experimental Biology.* 2014;217:2825-33.
- Herzog W. Eccentric vs. concentric muscle contraction: That is the question. *Journal of Sport and Health Science.* 2017.
- Herzog W, Schappacher G, DuVall M, Leonard TR, Herzog JA. Residual Force Enhancement Following Eccentric Contractions: A New Mechanism Involving Titin. *Physiology (Bethesda).* 2016;31:300-12.
- Hicks KM, Onambele-Pearson GL, Winwood K, Morse CI. Gender differences in fascicular lengthening during eccentric contractions: the role of the patella tendon stiffness. *Acta Physiol (Oxf).* 2013;209:235-44.

- Hill AV. The Heat of Shortening and the Dynamic Constants of Muscle. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 1938;126:136-95.
- Hoffman BW, Cresswell AG, Carroll TJ, Lichtwark GA. Muscle fascicle strains in human gastrocnemius during backward downhill walking. J Appl Physiol. 2014;116:1455-62.
- Howell JN, Chleboun G, Conatser R. Muscle stiffness, strength loss, swelling and soreness following exercise-induced injury in humans. J Physiol. 1993;464:183-96.
- Hrysomallis C. The effectiveness of resisted movement training on sprinting and jumping performance. J Strength Cond Res. 2012;26:299-306.
- Hubal MJ, Rubinstein SR, Clarkson PM. Mechanisms of variability in strength loss after muscle-lengthening actions. Med Sci Sports Exerc. 2007;39:461-8.
- Hudson AL, Taylor JL, Gandevia SC, Butler JE. Coupling between mechanical and neural behaviour in the human first dorsal interosseous muscle. The Journal of Physiology. 2009;587:917-25.
- Hug F, Dorel S. Electromyographic analysis of pedaling: a review. J Electromyogr Kinesiol. 2009;19:182-98.
- Hug F, Goupille C, Baum D, Raiteri BJ, Hodges PW, Tucker K. Nature of the coupling between neural drive and force-generating capacity in the human quadriceps muscle. Proc Biol Sci. 2015a;282.
- Hug F, Tucker K, Gennissen JL, Tanter M, Nordez A. Elastography for Muscle Biomechanics: Toward the Estimation of Individual Muscle Force. Exerc Sport Sci Rev. 2015b;43:125-33.
- Ishikawa M, Finni T, Komi PV. Behaviour of vastus lateralis muscle-tendon during high intensity SSC exercises in vivo. Acta Physiol Scand. 2003;178:205-13.
- Isner-Horobeti ME, Dufour SP, Vautravers P, Geny B, Coudeyre E, Richard R. Eccentric exercise training: modalities, applications and perspectives. Sports Med. 2013;43:483-512.
- Jackson TJ, Starkey C, McElhiney D, Domb BG. Epidemiology of Hip Injuries in the National Basketball Association: A 24-Year Overview. Orthopaedic journal of sports medicine. 2013;1:2325967113499130.
- Jimenez-Reyes P, Samozino P, Brughelli M, Morin JB. Effectiveness of an Individualized Training Based on Force-Velocity Profiling during Jumping. Front Physiol. 2016;7:677.
- Kawamori N, Newton R, Nosaka K. Effects of weighted sled towing on ground reaction force during the acceleration phase of sprint running. J Sports Sci. 2014;32:1139-45.
- Kawamori N, Nosaka K, Newton RU. Relationships Between Ground Reaction Impulse and Sprint Acceleration Performance in Team Sport Athletes. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2013;27:568-73 10.1519/JSC.0b013e318257805a.
- Koh ES, McNally EG. Ultrasound of skeletal muscle injury. Semin Musculoskelet Radiol. 2007;11:162-73.
- Konow N, Azizi E, Roberts TJ. Muscle power attenuation by tendon during energy dissipation. Proc Biol Sci. 2012;279:1108-13.
- Konow N, Roberts TJ. The series elastic shock absorber: tendon elasticity modulates energy dissipation by muscle during burst deceleration. Proc Biol Sci. 2015;282:20142800.
- Kubo K, Ikebukuro T, Yata H, Tomita M, Okada M. Morphological and mechanical properties of muscle and tendon in highly trained sprinters. J Appl Biomech. 2011;27:336-44.
- Kubo K, Kanehisa H, Kawakami Y, Fukunaga T. Elasticity of tendon structures of the lower limbs in sprinters. Acta Physiol Scand. 2000;168:327-35.
- Kulig K, Powers CM, Shellock FG, Terk M. The effects of eccentric velocity on activation of elbow flexors: evaluation by magnetic resonance imaging. Med Sci Sports Exerc. 2001;33:196-200.
- Lacourpaille L, Nordez A, Hug F, Couturier A, Dibie C, Guilhem G. Time-course effect of exercise-induced muscle damage on localized muscle mechanical properties assessed using elastography. Acta Physiol (Oxf). 2014;211:135-46.
- Lee SS, Piazza SJ. Built for speed: musculoskeletal structure and sprinting ability. J Exp Biol. 2009;212:3700-7.
- Lieber RL, Friden J. Muscle damage is not a function of muscle force but active muscle strain. J Appl Physiol. 1993;74:520-6.
- Lieber RL, Friden J. Mechanisms of muscle injury after eccentric contraction. J Sci Med Sport. 1999;2:253-65.
- Lieber RL, Friden J. Morphologic and mechanical basis of delayed-onset muscle soreness. J Am Acad Orthop Surg. 2002;10:67-73.
- Lieber RL, Shah S, Friden J. Cytoskeletal disruption after eccentric contraction-induced muscle injury. Clin Orthop Relat Res. 2002:S90-9.
- Lieber RL, Ward SR. Skeletal muscle design to meet functional demands. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2011;366:1466-76.
- Linke WA, Kruger M. The giant protein titin as an integrator of myocyte signaling pathways. Physiology (Bethesda). 2010;25:186-98.
- Linthorne NP, Cooper JE. Effect of the coefficient of friction of a running surface on sprint time in a sled-towing exercise. Sports Biomech. 2013;12:175-85.
- Maffiuletti NA, Aagaard P, Blazevich AJ, Folland J, Tillin N, Duchateau J. Rate of force development: physiological and methodological considerations. Eur J Appl Physiol. 2016.
- Magnusson SP, Aagaard P, Larsson B, Kjaer M. Passive energy absorption by human muscle-tendon unit is unaffected by increase in intramuscular temperature. J Appl Physiol. 2000;88:1215-20.

- Maisetti O, Boyas S, Guevel A. Specific neuromuscular responses of high skilled laser sailors during a multi-joint posture sustained until exhaustion. *Int J Sports Med.* 2006;27:968-75.
- Markovic S, Mirkov DM, Knezevic OM, Jaric S. Jump training with different loads: effects on jumping performance and power output. *Eur J Appl Physiol.* 2013.
- Martinez-Valencia MA, Gonzalez-Rave JM, Santos-Garcia DJ, Alcaraz Ramon PE, Navarro-Valdivielso F. Interrelationships between different loads in resisted sprints, half-squat 1 RM and kinematic variables in trained athletes. *Eur J Sport Sci.* 2014;14 Suppl 1:S18-24.
- Mayfield DL, Cresswell AG, Lichtwark GA. Effects of series elastic compliance on muscle force summation and the rate of force rise. *J Exp Biol.* 2016.
- McGowan CJ, Pyne DB, Thompson KG, Rattray B. Warm-Up Strategies for Sport and Exercise: Mechanisms and Applications. *Sports Med.* 2015;45:1523-46.
- McHugh MP. Recent advances in the understanding of the repeated bout effect: the protective effect against muscle damage from a single bout of eccentric exercise. *Scand J Med Sci Sports.* 2003;13:88-97.
- McNair PJ, Stanley SN. Effect of passive stretching and jogging on the series elastic muscle stiffness and range of motion of the ankle joint. *Br J Sports Med.* 1996;30:313-7, discussion 8.
- Mendez-Villanueva A, Suarez-Arpones L, Rodas G, Fernandez-Gonzalo R, Tesch P, Linnehan R, et al. MRI-Based Regional Muscle Use during Hamstring Strengthening Exercises in Elite Soccer Players. *PLoS One.* 2016;11:e0161356.
- Morales-Artacho AJ, Lacourpaille L, Guilhem G. Effects of warm-up on hamstring muscles stiffness: Cycling vs foam rolling. *Scand J Med Sci Sports.* 2017.
- Morgan DL. New insights into the behavior of muscle during active lengthening. *Biophys J.* 1990;57:209-21.
- Morgan DL, Allen DG. Early events in stretch-induced muscle damage. *J Appl Physiol.* 1999;87:2007-15.
- Morin JB, Petrakos G, Jimenez-Reyes P, Brown SR, Samozino P, Cross MR. Very-Heavy Sled Training for Improving Horizontal Force Output in Soccer Players. *Int J Sports Physiol Perform.* 2016;1:13.
- Morin JB, Samozino P. Interpreting Power-Force-Velocity Profiles for Individualized and Specific Training. *Int J Sports Physiol Perform.* 2015.
- Moritani T, Muramatsu S, Muro M. Activity of motor units during concentric and eccentric contractions. *Am J Phys Med.* 1987;66:338-50.
- Nardone A, Romano C, Schieppati M. Selective recruitment of high-threshold human motor units during voluntary isotonic lengthening of active muscles. *J Physiol.* 1989;409:451-71.
- Nordez A, Casari P, Cornu C. Effects of stretching velocity on passive resistance developed by the knee musculo-articular complex: contributions of frictional and viscoelastic behaviours. *Eur J Appl Physiol.* 2008;103:243-50.
- Nordez A, Gallot T, Catheline S, Guevel A, Cornu C, Hug F. Electromechanical delay revisited using very high frame rate ultrasound. *J Appl Physiol.* 2009;106:1970-5.
- Nystrom J, Lindwall O, Ceci R, Harmenberg J, Svedenhag J, Ekblom B. Physiological and morphological characteristics of world class fencers. *Int J Sports Med.* 1990;11:136-9.
- Okkonen O, Hakkinen K. Biomechanical comparison between sprint start, sled pulling, and selected squat-type exercises. *J Strength Cond Res.* 2013;27:2662-73.
- Opar DA, Williams MD, Shield AJ. Hamstring strain injuries: factors that lead to injury and re-injury. *Sports Med.* 2012;42:209-26.
- Pasquet B, Carpentier A, Duchateau J. Specific modulation of motor unit discharge for a similar change in fascicle length during shortening and lengthening contractions in humans. *J Physiol.* 2006;577:753-65.
- Paulsen G, Mikkelsen UR, Raastad T, Peake JM. Leucocytes, cytokines and satellite cells: what role do they play in muscle damage and regeneration following eccentric exercise? *Exerc Immunol Rev.* 2012;18:42-97.
- Peake JM, Roberts LA, Figueiredo VC, Egner I, Krog S, Aas SN, et al. The effects of cold water immersion and active recovery on inflammation and cell stress responses in human skeletal muscle after resistance exercise. *J Physiol.* 2017;595:695-711.
- Penailillo L, Blazevich AJ, Nosaka K. Muscle fascicle behavior during eccentric cycling and its relation to muscle soreness. *Med Sci Sports Exerc.* 2015;47:708-17.
- Petrakos G, Morin JB, Egan B. Resisted Sled Sprint Training to Improve Sprint Performance: A Systematic Review. *Sports Med.* 2016;46:381-400.
- Pinniger GJ, Steele JR, Thorstensson A, Cresswell AG. Tension regulation during lengthening and shortening actions of the human soleus muscle. *Eur J Appl Physiol.* 2000;81:375-83.
- Prilutsky BI. Coordination of two- and one-joint muscles: functional consequences and implications for motor control. *Motor Control.* 2000;4:1-44.
- Proske U, Morgan DL. Muscle damage from eccentric exercise: mechanism, mechanical signs, adaptation and clinical applications. *J Physiol.* 2001;537:333-45.
- Raasch CC, Zajac FE, Ma B, Levine WS. Muscle coordination of maximum-speed pedaling. *J Biomech.* 1997;30:595-602.
- Raastad T, Owe SG, Paulsen G, Enns D, Overgaard K, Cramer R, et al. Changes in calpain activity, muscle structure, and function after eccentric exercise. *Med Sci Sports Exerc.* 2010;42:86-95.
- Rabita G, Dorel S, Slawinski J, Saez-de-Villarreal E, Couturier A, Samozino P, et al. Sprint mechanics in world-class athletes: a new insight into the limits of human locomotion. *Scand J Med Sci Sports.* 2015;25:583-94.

- Raiteri BJ, Hug F, Cresswell AG, Lichtwark GA. Quantification of muscle co-contraction using supersonic shear wave imaging. *J Biomech.* 2015.
- Remaud A, Cornu C, Guivel A. A methodologic approach for the comparison between dynamic contractions: influences on the neuromuscular system. *J Athl Train.* 2005;40:281-7.
- Roberts LA, Raastad T, Markworth JF, Figueiredo VC, Egner IM, Shield A, et al. Post-exercise cold water immersion attenuates acute anabolic signalling and long-term adaptations in muscle to strength training. *J Physiol.* 2015.
- Roberts TJ, Azizi EA. The series-elastic shock absorber: tendons attenuate muscle power during eccentric actions. *J Appl Physiol.* 2010.
- Roi GS, Bianchedi D. The science of fencing: implications for performance and injury prevention. *Sports Med.* 2008;38:465-81.
- Samozino P, Morin JB, Hintzy F, Belli A. A simple method for measuring force, velocity and power output during squat jump. *J Biomech.* 2008;41:2940-5.
- Samozino P, Rejc E, Di Prampero PE, Belli A, Morin JB. Optimal force-velocity profile in ballistic movements--altius: citius or fortius? *Med Sci Sports Exerc.* 2012;44:313-22.
- Sapega AA, Minkoff J, Valsamis M, Nicholas JA. Musculoskeletal performance testing and profiling of elite competitive fencers. *Clin Sports Med.* 1984;3:231-44.
- Sapin-de Brosses E, Gennisson JL, Pernot M, Fink M, Tanter M. Temperature dependence of the shear modulus of soft tissues assessed by ultrasound. *Phys Med Biol.* 2010;55:1701-18.
- Sartori M, Farina D. Neural Data-driven Musculoskeletal Modeling for Personalized Neurorehabilitation Technologies. *IEEE Trans Biomed Eng.* 2016.
- Sasaki K, Ishii N. Shortening velocity of human triceps surae muscle measured with the slack test in vivo. *J Physiol.* 2005;567:1047-56.
- Sasaki K, Ishii N. Unloaded shortening velocity of voluntarily and electrically activated human dorsiflexor muscles in vivo. *PLoS One.* 2010;5:e13043.
- Schache AG, Dorn TW, Blanch PD, Brown NA, Pandy MG. Mechanics of the human hamstring muscles during sprinting. *Med Sci Sports Exerc.* 2012;44:647-58.
- Schaser KD, Disch AC, Stover JF, Lauffer A, Bail HJ, Mittlmeier T. Prolonged superficial local cryotherapy attenuates microcirculatory impairment, regional inflammation, and muscle necrosis after closed soft tissue injury in rats. *Am J Sports Med.* 2007;35:93-102.
- Seynnes OR, Bojsen-Møller J, Albracht K, Arndt A, Cronin NJ, Finni T, et al. Ultrasound-based testing of tendon mechanical properties: a critical evaluation. *Journal of applied physiology (Bethesda, Md : 1985).* 2015;118:133-41.
- Silder A, Sherry MA, Sanfilippo J, Tuite MJ, Hetzel SJ, Heiderscheit BC. Clinical and morphological changes following 2 rehabilitation programs for acute hamstring strain injuries: a randomized clinical trial. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2013;43:284-99.
- Slawinski J, Bonnefoy A, Ontanon G, Leveque JM, Miller C, Riquet A, et al. Segment-interaction in sprint start: Analysis of 3D angular velocity and kinetic energy in elite sprinters. *J Biomech.* 2010;43:1494-502.
- Solomonow M, Baratta R, Bernardi M, Zhou B, Lu Y, Zhu M, et al. Surface and wire EMG crosstalk in neighbouring muscles. *J Electromyogr Kinesiol.* 1994;4:131-42.
- Starbuck C, Eston RG. Exercise-induced muscle damage and the repeated bout effect: evidence for cross transfer. *Eur J Appl Physiol.* 2012;112:1005-13.
- Stephenson DG, Wendt IR. Length dependence of changes in sarcoplasmic calcium concentration and myofibrillar calcium sensitivity in striated muscle fibres. *J Muscle Res Cell Motil.* 1984;5:243-72.
- Swenson C, Sward L, Karlsson J. Cryotherapy in sports medicine. *Scand J Med Sci Sports.* 1996;6:193-200.
- Takekura H, Fujinami N, Nishizawa T, Ogasawara H, Kasuga N. Eccentric exercise-induced morphological changes in the membrane systems involved in excitation-contraction coupling in rat skeletal muscle. *J Physiol.* 2001;533:571-83.
- Tsolakis C, Kostaki E, Vagenas G. Anthropometric, flexibility, strength-power, and sport-specific correlates in elite fencing. *Percept Mot Skills.* 2010;110:1015-28.
- Wakahara T, Kanehisa H, Kawakami Y, Fukunaga T. Effects of knee joint angle on the fascicle behavior of the gastrocnemius muscle during eccentric plantar flexions. *J Electromyogr Kinesiol.* 2009;19:980-7.
- Warren GL, Ingalls CP, Lowe DA, Armstrong RB. Excitation-contraction uncoupling: major role in contraction-induced muscle injury. *Exerc Sport Sci Rev.* 2001;29:82-7.
- Watsford ML, Murphy AJ, McLachlan KA, Bryant AL, Cameron ML, Crossley KM, et al. A prospective study of the relationship between lower body stiffness and hamstring injury in professional Australian rules footballers. *Am J Sports Med.* 2010;38:2058-64.
- Westing SH, Cresswell AG, Thorstensson A. Muscle activation during maximal voluntary eccentric and concentric knee extension. *Eur J Appl Physiol Occup Physiol.* 1991;62:104-8.
- Weyand PG, Sandell RF, Prime DN, Bundle MW. The biological limits to running speed are imposed from the ground up. *Journal of applied physiology (Bethesda, Md : 1985).* 2010;108:950-61.
- Whitehead NP, Weerakkody NS, Gregory JE, Morgan DL, Proske U. Changes in passive tension of muscle in humans and animals after eccentric exercise. *J Physiol.* 2001;533:593-604.

- Wiktorsson-Moller M, Oberg B, Ekstrand J, Gillquist J. Effects of warming up, massage, and stretching on range of motion and muscle strength in the lower extremity. *Am J Sports Med.* 1983;11:249-52.
- Williams LR, Walmsley A. Response timing and muscular coordination in fencing: a comparison of elite and novice fencers. *J Sci Med Sport.* 2000;3:460-75.
- Witvrouw E, Danneels L, Asselman P, D'Have T, Cambier D. Muscle flexibility as a risk factor for developing muscle injuries in male professional soccer players. A prospective study. *Am J Sports Med.* 2003;31:41-6.
- Yahia A, Jribi S, Ghroubi S, Elleuch M, Baklouti S, Habib Elleuch M. Evaluation of the posture and muscular strength of the trunk and inferior members of patients with chronic lumbar pain. *Joint Bone Spine.* 2011;78:291-7.
- Yanagisawa O, Sakuma J, Kawakami Y, Suzuki K, Fukubayashi T. Effect of exercise-induced muscle damage on muscle hardness evaluated by ultrasound real-time tissue elastography. *SpringerPlus.* 2015;4:308.
- Zhang SN, Bates BT, Dufek JS. Contributions of lower extremity joints to energy dissipation during landings. *Med Sci Sports Exerc.* 2000;32:812-9.

## Annexes

## **Annexes**

1. Relev° de notes de Master 1
2. Relev° de notes de Master 2
3. Diplôme de thèse
4. Couvertures des articles

**Relevé de notes de semestre****- Grade Master -****SESSION FEVRIER 2005****MASTER DE BIOLOGIE INTEGRATIVE ET PHYSIOLOGIE niveau 1****Nom et prénom de l'étudiant : MR. GUILHEM, GAEL****Date et lieu de naissance: 07/09/1982 à BELFORT (BELFORT (TERRITOIRE))****N° Dossier :** 2306323**N° INE :** 2593011167Z

	<b>U.E.</b>	<b>Ses.</b>	<b>Epreuves écrites</b>	<b>Travaux pratiques</b>	<b>Contrôle continu</b>	<b>Epreuves orales</b>	<b>Total</b>	<b>ECTS</b>
MB001	Mécanismes moléculaires de la signalisation cellulaire	Fév. 2005	<b>62,25</b> / 100				<b>62,25</b> / 100	<b>6</b>
MB002	Evolution et biochimie comparée chez les Eucaryotes	Fév. 2005	<b>60</b> / 100				<b>60</b> / 100	<b>6</b>
MB003	Biostatistiques avancées	Fév. 2005	<b>50</b> / 100				<b>50</b> / 100	<b>3</b>
MB004	Energétique des transports, communications cellulaires	Fév. 2005	<b>59,5</b> / 100				<b>59,5</b> / 100	<b>3</b>
MB006	Diversité des modèles d'études en physiologie	Fév. 2005	<b>64,5</b> / 100				<b>64,5</b> / 100	<b>6</b>
MXA11	Anglais certification 1ère partie	Fév. 2005				<b>76,25</b> / 100	<b>76,25</b> / 100	<b>3</b>
MXIP1	Ateliers insertion professionnelle	Fév. 2005	<b>70</b> / 100				<b>70</b> / 100	<b>3</b>

**Résultat du semestre : Validé - 30 ECTS****Moyenne du semestre : 12,59 /20**

Université Pierre et Marie Curie - Paris 6  
 4, place Jussieu  
 75252 Paris Cedex 05

Paris le : 19/09/2005

  
**UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE**  
 Master de Sciences et Technologies  
 Mention Biologie Intégrative et Physiologie  
 Pr ANDREANI Marise  
 7, Quai Saint-Bernard - Bât. B  
 3<sup>me</sup> étage - Case Courrier 118  
 75252 Paris Cedex 05  
 Tél. 01 44 27 23 83 - Fax 01 44 27 23 82

**Relevé de notes de semestre****- Grade Master -****SESSION JUIN 2005****MASTER DE BIOLOGIE INTEGRATIVE ET PHYSIOLOGIE niveau 1****Nom et prénom de l'étudiant : MR. GUILHEM, GAEL****Date et lieu de naissance: 07/09/1982 à BELFORT (BELFORT (TERRITOIRE))****N° Dossier : 2306323****N° INE : 2593011167Z**

	<b>U.E.</b>	<b>Ses.</b>	<b>Epreuves écrites</b>	<b>Travaux pratiques</b>	<b>Contrôle continu</b>	<b>Epreuves orales</b>	<b>Total</b>	<b>ECTS</b>
MB030	Ateliers d'application des outils de biologie moléculaire à la physiologie	Juin 2005	<b>85</b> / 100				<b>85</b> / 100	<b>6</b>
MB031	Homéostasie du système circulatoire, échanges gazeux, appareil respiratoire	Juin 2005	<b>71,5</b> / 100				<b>71,5</b> / 100	<b>6</b>
MB032	Thermorégulation	Juin 2005	<b>66,25</b> / 100				<b>66,25</b> / 100	<b>3</b>
MB033	Médiateurs de l'inflammation	Juin 2005	<b>58,13</b> / 100				<b>58,13</b> / 100	<b>3</b>
MB034	Stage de 1ère année en Biologie Intégrative et Physiologie	Juin 2005	<b>82,5</b> / 100				<b>82,5</b> / 100	<b>12</b>

**Résultat du semestre : Validé - 30 ECTS****Moyenne du semestre : 15,35 /20**

Université Pierre et Marie Curie - Paris 6  
4, place Jussieu  
75252 Paris Cedex 05

**Paris le : 19/09/2005**


**UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE**  
Master de Sciences et Technologies  
Mention Biologie Intégrative et Physiologie  
Pr ANDREANI Marise  
7, Quai Saint-Bernard - Bât. B  
3<sup>ème</sup> étage - Case Courrier 113.  
75252 Paris Cedex 05  
Tél. 01 44 27 23 83 - Fax 01 44 27 23 82

## Relevé de notes et résultats

- Grade Master -

**MASTER PROFESSIONNEL ENTRAINEMENT SPORTIF, NUTRITION & SANTE, niveau 2**  
**Nom et Prénom de l'étudiant : M. GUILHEM Gaël**

**Date et lieu de naissance :** 07/09/1982 à BELFORT (90)

**N° d'étudiant :** 20507086

**N° INE :** 2593011167Z

### **Semestre 1:**

UE 9 :	- Mécanismes biologiques :	11/20
UE 10 :	- Plasticité neuromusculaire: - Développement, réparation et maladies neuromusculaires:	10/20 14/20
UE 11 :	- Physiopathologie de l'exercice musculaire : - Exercice et environnement contraignant : - Ergonomie appliquée aux APS	13/20 8/20 10/20
UE 12 :	- Ergogènes et micronutriments du sportif : - Nutrition, santé et exercice : - Biomécanique des muscles, os et tendons : - Traumatologie et médecine du sport :	8/20 13/20 8/20 10/20
UE 9 :		11/20
UE 10 :		12/20
UE 11:		10,6/20
UE 12 :		9,75/20
Moyenne du semestre :		<b>10,65/20</b>
Résultat du semestre :		<b>Validé</b>

### **Semestre 2**

UE 13 :	- Handicap - Atelier du monde sportif:	15/20 Validé
UE 14 :	-Stage de fin d'année de M2:	17/20
UE 13 :		15/20
UE 14 :		17/20
Moyenne du semestre :		<b>16,56/20</b>
Résultat du semestre :		<b>Validé</b>

### **Année**

Moyenne générale :	<b>13,60/20</b>
Résultat de l'année :	<b>Validé</b>
Mention :	<b>AB</b>
Rang :	<b>1<sup>er</sup>/23</b>

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITÉ DE NANTES

# DOCTORAT

Vu le code de l'éducation, notamment son article L.612-7 ;

Vu le code de la recherche, notamment son article L.412-1 ;

Vu le décret n°2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses ;

Vu l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;

Vu les pièces justificatives produites par M. Gaël, Frédéric GUILHEM, né le 7 septembre 1982 à BELFORT (90) en vue de son inscription au doctorat ;  
Vu le procès-verbal du jury attestant que l'intéressé a soutenu, le 12 février 2010, une thèse portant sur le sujet suivant : *Adaptations structurales et nerveuses du système neuromusculaire induites par l'exercice excentrique isotonique versus isocinétique*, préparée au sein de l'école doctorale COGNITION, EDUCATION, INTERACTIONS (CEI), devant un jury présidé par M. Jacques DUCHATEAU (Professeur) et composé de E. HUG (Maître de conférences titulaire d'une HDR ou d'un doctorat d'état), N. MAFFIULETTI (Maître de Conférences), P. ROCHCONGAR (Professeur, Praticien Hospitalier), C. HAMON (Docteur), A. GUEVEL (Professeur), C. CORNU (Maître de conférences titulaire d'une HDR ou d'un doctorat d'état) ;

Vu la délibération du jury ;

Le DIPLÔME NATIONAL DE DOCTEUR en Sciences et techniques des activités physiques et sportives  
est délivré à **M. Gaël, Frédéric GUILHEM**  
et confère le grade de docteur,  
pour en joindre avec les droits et prérogatives qui y sont attachés.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2011



Le titulaire

2010367408  
NANTES 8695860

Yves LE COINTE



Le Recteur d'Académie,  
Chancelier des universités

G. Chai

Gérald CHAI

## Muscle architecture and EMG activity changes during isotonic and isokinetic eccentric exercises

Gaël Guilhem · Christophe Cornu · Arnaud Guével

Received: 6 October 2010 / Accepted: 25 February 2011 / Published online: 12 March 2011  
© Springer-Verlag 2011

**Abstract** The present study aimed to compare muscle architecture and electromyographic activity during isotonic (IT) and isokinetic (IK) knee extensors eccentric contractions. Seventeen subjects were assigned in test and reproducibility groups. During test session, subjects performed two IT and two IK sets of eccentric contractions of knee extensor muscles. Torque, angular velocity, VL architecture and EMG activity of agonist (*vastus lateralis*, VL; *vastus medialis*; *rectus femoris*) and antagonist (*semitendinosus*; *biceps femoris*, BF) muscles were simultaneously recorded and averaged on a 5° window. Torque–angle and angular velocity–angle relationships exhibited differences in mechanical load between the IT and IK modes. Changes in muscle architecture were similar in both modes, since VL fascicles length increased and fascicle angle decreased, resulting in a decrease in muscle thickness during eccentric contraction. Agonist activity and BF co-activity levels were higher in IT mode than in IK mode at short muscle lengths, whereas agonist activity was higher in IK mode than in IT mode at long muscle lengths. Differences in mechanical

load between both modes induced specific neuromuscular responses in terms of agonist activity and antagonist co-activity. These results suggest that specific neural adaptations may occur after IT or IK eccentric training. This hypothesis needs to be tested in order to gain new insights concerning the most effective eccentric protocols based on whether the objective is sportive or clinical.

**Keywords** Ultrasonography · Electromyography · Coactivation · Lengthening contraction · Knee extensors

### Introduction

Eccentric muscle contraction causes an active stretch of muscle fascicles during contraction (Enoka 1996). During this forced lengthening, elastic components of the muscle–tendon unit are stretched while the muscular fibers contract. These mechanical conditions due to eccentric contraction induce a higher torque force able to stimulate inhibition mechanism to protect contractile structures and tendons for high tension generated (Duchateau and Enoka 2008). For this reason this contraction is useful in training programs to increase muscle strength (Duclay et al. 2008; Housh et al. 1998) or in rehabilitation programs to restore muscle or tendon function (Visnes and Bahr 2007).

Isotonic (IT) eccentric programs are recognized as particularly effective in increasing maximal strength (Duclay et al. 2008; Housh et al. 1998). The development of isokinetic (IK) dynamometers allowed for application of an accommodating resistance to the muscles, resulting in eccentric exercise at a constant movement velocity. Comparative analyses of mechanical parameters during IT and IK eccentric exercises have shown different mechanical constraints in terms of external torque and angular

---

**Electronic supplementary material** The online version of this article (doi:[10.1007/s00421-011-1894-3](https://doi.org/10.1007/s00421-011-1894-3)) contains supplementary material, which is available to authorized users.

---

G. Guilhem · C. Cornu · A. Guével  
Faculty of Sport Sciences, “Motricité, Interactions,  
Performance” Laboratory, EA 4334,  
University of Nantes, Nantes, France

G. Guilhem (✉)  
Research Department,  
National Institute for Sports (INSEP),  
11, av du Tremblay, 75012 Paris, France  
e-mail: gael.guilhem@insep.fr

# A Methodologic Approach for Normalizing Angular Work and Velocity During Isotonic and Isokinetic Eccentric Training

Gaël Guilhem, PhD\*†; Christophe Cornu, PhD\*;  
Arnaud Guével, PhD\*

\*University of Nantes, Faculty of Sport Sciences, "Motricité, Interactions, Performance" Laboratory, EA 4334, France; †National Institute for Sports (INSEP) Research Department, Paris, France

**Context:** Resistance exercise training commonly is performed against a constant external load (isotonic) or at a constant velocity (isokinetic). Researchers comparing the effectiveness of isotonic and isokinetic resistance-training protocols need to equalize the mechanical stimulus (work and velocity) applied.

**Objective:** To examine whether the standardization protocol could be adjusted and applied to an eccentric training program.

**Design:** Controlled laboratory study.

**Setting:** Controlled research laboratory.

**Patients or Other Participants:** Twenty-one sport science male students ( $\text{age}=20.6 \pm 1.5$  years,  $\text{height}=178.0 \pm 4.0$  cm,  $\text{mass}=74.5 \pm 9.1$  kg).

**Intervention(s):** Participants performed 9 weeks of isotonic ( $n=11$ ) or isokinetic ( $n=10$ ) eccentric training of knee extensors that was designed so they would perform the same amount of angular work at the same mean angular velocity.

**Main Outcome Measure(s):** Angular work and angular velocity.

**Results:** The isotonic and isokinetic groups performed the same total amount of work ( $-185.2 \pm 6.5$  kJ and  $-184.4 \pm 8.6$  kJ, respectively) at the same angular velocity ( $21 \pm 1^\circ/\text{s}$  and  $22^\circ/\text{s}$ , respectively) with the same number of repetitions (8.0 and 8.0, respectively). Bland-Altman analysis showed that work (bias = 2.4%) and angular velocity (bias = 0.2%) were equalized over 9 weeks between the modes of training.

**Conclusions:** The procedure developed allows angular work and velocity to be standardized over 9 weeks of isotonic and isokinetic eccentric training of the knee extensors. This method could be useful in future studies in which researchers compare neuromuscular adaptations induced by each type of training mode with respect to rehabilitating patients after musculoskeletal injury.

**Key Words:** resistance exercise, muscle strength, knee extensors

## Key Points

- Equalizing mechanical stimuli through a method previously developed on concentric muscle loading can be applied successfully to the study of long-term isotonic and isokinetic eccentric resistance training.
- This standardization procedure is valid and adaptable to progressive resistance exercise commonly used in strength training and rehabilitation.

Researchers have investigated many mechanical stimuli (eg, body weight movements, additional external load, constant velocity movements, elastic load) to increase muscle strength in healthy people or restore muscle function after injury. Most resistance-exercise training protocols induce muscle contractions against a constant external load (isotonic [IT]) or at a constant angular velocity (isokinetic [IK]).<sup>1</sup> The IK exercise is used in rehabilitation because it provides a safer environment for training muscle after injury (eg, accommodating resistance, fixed velocity training). Rigorously comparing strength development that IT and IK modes induce could help clinicians who progressively use IT loading in rehabilitation programs. Isotonic exercise stresses the neuromuscular system mainly at the beginning and end of the muscle contraction because of the mechanical leverage points throughout the range of

motion (ROM), whereas with IK exercise, muscle contraction is performed against an accommodating resistance that theoretically allows a maximal contraction throughout the entire ROM at a preset constant velocity. Therefore, these 2 exercise modes induce different mechanical stimuli on the skeletal muscle system,<sup>2</sup> suggesting that each mode might induce specific adaptive processes of the neuromuscular system and the muscle-tendon unit and specific changes on torque-angle and torque-velocity relationships through different loading mechanisms.<sup>3</sup>

Attempts to determine the effects of IT and IK training on muscle strength have produced conflicting findings.<sup>4–6</sup> Some investigators have found that IT training is more effective than IK training for improving muscle strength,<sup>6</sup> whereas others have found opposite results<sup>5</sup> or no differences between modes of exercise.<sup>4</sup> These differences could be related to the difficulty of

# Adjustment of Muscle Coordination during an All-Out Sprint Cycling Task

SYLVAIN DOREL<sup>1,2</sup>, GAEL GUILHEM<sup>2</sup>, ANTOINE COUTURIER<sup>2</sup>, and FRANÇOIS HUG<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Laboratory “Motricité, Interactions, Performance” (EA 4334), University of Nantes, Nantes, FRANCE; and <sup>2</sup>Research Department, National Institute for Sports (INSEP), Paris, FRANCE

## ABSTRACT

DOREL, S., G. GUILHEM, A. COUTURIER, and F. HUG. Adjustment of Muscle Coordination during an All-Out Sprint Cycling Task. *Med. Sci. Sports Exerc.*, Vol. 44, No. 11, pp. 2154–2164, 2012. **Purpose:** This study was designed to assess muscle coordination during a specific all-out sprint cycling task (Sprint). The aim was to estimate the EMG activity level of each muscle group by referring to the submaximal cycling condition (Sub150 W) and to test the hypothesis that a maximal activity is reached for all of the muscles during Sprint. **Methods:** Fifteen well-trained cyclists were tested during submaximal and sprint cycling exercises and a series of maximal voluntary contractions (MVCs) in isometric and isokinetic modes (MVC at the three lower limb joints). Crank torque and surface EMG signals for 11 lower limb muscles were continuously measured. **Results:** Results showed that Sprint induced a very large increase of EMG activity level for the hip flexors (multiplied by 7–9 from 150 W to Sprint) and the knee flexors and hip extensors (multiplied by 5–7), whereas plantar flexors and knee extensors demonstrated a lower increase (multiplied by 2–3). During Sprint, EMG activity level failed to reach a maximal value for hamstrings, *tibialis anterior*, *tensor fasciae latae*, and *gluteus maximus* (i.e., <70% to 80% of peak EMG activity during MVC,  $P < 0.05$  to  $P < 0.001$ ), and individual EMG patterns demonstrated a significant earlier onset and/or later offset for the majority of the muscles ( $P < 0.01$  to  $P < 0.001$ ). **Conclusions:** Results clearly suggest a change in the relative contribution of the different muscles to the power production between Sub150 W and Sprint, and provide evidence that EMG activity level is not systematically maximal for all muscles involved in the all-out sprint cycling task. The longer period of activity induced during Sprint is likely to represent an interesting coordination strategy to enhance the work generated by all of the muscle groups. **Key Words:** PEDALING, MAXIMAL POWER OUTPUT, ELECTROMYOGRAPHY, NORMALIZATION, MULTIJOINT TASK, MAXIMAL VOLUNTARY CONTRACTION

Muscle coordination is defined as “a distribution of activation or force among individual muscles to produce given combination of joint moment” (22). This has been widely studied during pedaling, especially the alteration of EMG activity of lower limb muscles in response to changes in pedaling rate, power output, and body posture (for review, see Ref. [15]). Among these parameters, it is well established that increased power output is one of the most important adjustment factors responsible for a global increase of joint load and hence muscle activity level (9,15). Some studies have reported that changes in muscle activity level in response to increase of power output conditions differ between different lower limb muscles (14,18,25,29). For instance, although *gastrocnemius* activity level is relatively stable up to 50%–60% of maximal aerobic

power and then moderately increases (14,18,20), the activity level of *rectus femoris* (RF), *semimembranosus* (SM), and *gluteus maximus* (GMax) is much more influenced by the workload level (9). However, these studies have focused on submaximal pedaling exercises (i.e., intensity below the maximal aerobic power).

Literature concerning muscle coordination during supramaximal cycling exercise is scarce, especially regarding the all-out sprint exercise. Hug et al. (16) recently explored the effect of different mechanical constraints on muscle synergies during pedaling. Their results showed that extreme changes in torque at a given pedaling rate (i.e., submaximal vs. sprint exercise) did not modify the composition of the extracted muscle synergies despite an observed slight adaptation in their activation timing. In this work, muscle synergies were defined as low-dimensional modules formed by muscles activated in synchrony (30), where the output level of this activation was not taken into consideration. Because some authors (32) have suggested that timing and amplitude of EMG patterns may be controlled independently, the nature of changes in muscle activity level induced by all-out sprint pedaling exercise remains an open question. The few studies that have investigated muscle activity level during such a task focused on a small number of muscles (two and five muscles in Samozino et al. [26] and Hautier et al. [11], respectively). Moreover, authors did not attempt to estimate the degree of activation of each muscle, which requires to

Address for correspondence: Sylvain Dorel, Ph.D., Laboratory “Motricité, Interactions, Performance” (EA 4334), University of Nantes, 25 bis boulevard Guy Mollet, BP 72206, 44322 Nantes cedex 3, France; E-mail: sylvain.dorel@univ-nantes.fr.

Submitted for publication January 2012.

Accepted for publication May 2012.

0195-9131/12/4411-2154/0

MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE®

Copyright © 2012 by the American College of Sports Medicine

DOI: 10.1249/MSS.0b013e3182625423

## Specific neuromuscular fatigue induced by repetitive isoload concentric knee extension

M. Plautard<sup>a\*</sup>, C. Cornu<sup>a</sup>, G. Guilhem<sup>b</sup> and A. Guevel<sup>a</sup>

<sup>a</sup>‘Motricité, Interactions, Performance’ Laboratory, Faculty of Sport Sciences, University of Nantes, EA 4334 Nantes, France;

<sup>b</sup>Research Department, National Institute for Sport (INSEP), Paris, France

**Keywords:** quadriceps femoris; electrically induced contraction; electromyography; activation level; peripheral impairments

### 1. Introduction

Muscle fatigue is a physiological phenomenon widely discussed in the scientific community. A lot of mechanisms leading to ‘a reduction in the ability of the muscle to produce force or power’ (Barry and Enoka 2006) have been investigated during the last 20 years. These studies revealed that fatigue processes could affect the central command as well as the muscular effector. However, their contribution depends on task features (Pasquet et al. 2000; Taylor and Gandevia 2008) (e.g. the intensity and duration of exercise or the type of contraction) or on muscle characteristics (particularly fibre-type composition) (Kawakami et al. 2000). If both dynamic and isometric fatiguing contractions have been considered (Babault et al. 2006), concentric exercise effects were mainly tested through isokinetic contractions. Curiously enough, only one study (Klass et al. 2004) used fatiguing weight loading protocol, on the *triceps surae*, to induce neuromuscular fatigue. These authors found that peripheral impairments, particularly excitation–contraction coupling processes, play a major role in the loss of force. Nevertheless, no study had investigated the knee extension movement, an exercise frequently included in rehabilitation protocols of knee injury and strengthening programmes. In this context, our study aimed to characterise the specific neuromuscular fatigue induced by repetitive isoload concentric leg extensions on *quadriceps femoris* (QF).

### 2. Methods

The experiment was carried out with nine physically active men (age:  $23 \pm 2.2$  years, height:  $179.1 \pm 6.9$  cm, mass:  $72.2 \pm 8.5$  kg). The fatiguing task was performed on a customised isokinetic dynamometer (Biodex® System 3 Pro, Shirley, NY, USA), previously validated (Guilhem et al. 2010). It consisted in executing concentric knee extension, kicking against a constant external resistance, equal to 30% of the isometric maximal voluntary

contraction (IMVC), and applied by a plate-loaded resistance training device. During every dynamic contraction, the subjects had to complete a  $90^\circ$  range of motion (ROM), from  $100^\circ$  to  $10^\circ$  ( $0^\circ$ , fully extended knee). Moreover, instructions were given to the subjects to extend the leg with the intention of moving the load ‘as fast as possible’, taking care in respecting the fixed ROM (without isokinetic dynamometer cushioning effect). The return phase (from  $10^\circ$  to  $100^\circ$ ) was controlled by the motor of the dynamometer so that the subjects acted only during the knee extension phase. The task was repeated until the subject failed in completing the entire ROM for three of the five last repetitions with a  $10^\circ$  tolerance. In order to qualify neuromuscular induced fatigue and recovery, subjects performed 5-s IMVCs, at a  $70^\circ$  knee flexion before and after the loading set. They were carefully instructed to contract ‘as fast and forcefully as possible’. A supra-maximal (+10%) single pulse stimulation (0.5-ms duration, 400-V maximal voltage) was delivered to the femoral nerve during the torque plateau period of each IMVC (interpolated twitch, IT) and, at rest (rest twitch, RT), about 2-s after the end of the contraction. The post-fatigue tests were carried out immediately after the fatiguing task (POST-1), 30-s after POST-1 (POST-2) and 5-m after POST-1 (POST-3). From IMVCs, maximal voluntary rate force development (RFD<sub>max</sub>) and isometric torque (MVC torque) were assessed, respectively, as the maximal slope and the peak torque of the time–force curve. During these post-fatigue tests, we also determined averaged root mean square (RMS) of the surface electromyographic signal (sEMG) recorded on agonist and antagonist muscles. To highlight a potential central fatigue, activation level (AL) was quantified with the formula:

$$AL(\%) = 100 - (IT\ size/RT\ size) * 100.$$

RT contractile properties, i.e., the maximal rate torque development, twitch peak torque and maximal rate torque relaxation, were computed to specify peripheral fatigue

\*Corresponding author. Email: mathieu.plautard@univ-nantes.fr

# Neuromuscular Adaptations to Isoload versus Isokinetic Eccentric Resistance Training

GAËL GUILHEM<sup>1,2</sup>, CHRISTOPHE CORNU<sup>1</sup>, NICOLA A. MAFFIULETTI<sup>3</sup>, and ARNAUD GUÉVEL<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*University of Nantes, Laboratory “Motricité, Interactions, Performance” Nantes, FRANCE;* <sup>2</sup>*National Institute for Sports (INSEP), Research Department, Paris, FRANCE;* and <sup>3</sup>*Neuromuscular Research Laboratory, Schulthess Clinic, Zurich, SWITZERLAND*

## ABSTRACT

GUILHEM, G., C. CORNU, N. A. MAFFIULETTI, and A. GUÉVEL. Neuromuscular Adaptations to Isoload versus Isokinetic Eccentric Resistance Training. *Med. Sci. Sports Exerc.*, Vol. 45, No. 2, pp. 326–335, 2013. **Purpose:** The purpose of this study was to compare neuromuscular adaptations induced by work-matched isoload (IL) versus isokinetic (IK) eccentric resistance training. **Methods:** A total of 31 healthy subjects completed a 9-wk IL ( $n = 11$ ) or IK ( $n = 10$ ) training program for the knee extensors or did not train (control group;  $n = 10$ ). The IL and IK programs consisted of 20 training sessions, which entailed three to five sets of eight repetitions in the respective modalities. The amount of work and the mean angular velocity were strictly matched between IL and IK conditions. Neuromuscular tests were performed before and after training and consisted of the assessment of quadriceps muscle strength, muscle architecture (vastus lateralis), EMG activity, and antagonist coactivation. **Results:** IL, but not IK, eccentric resistance training enhanced eccentric strength at short muscle length (+20%), high-velocity eccentric strength (+15%), muscle thickness (+10%), and fascicle angle measured at rest (+11%;  $P < 0.05$ ). Agonist EMG activity increased almost similarly for the two modalities, whereas antagonist coactivation was unaffected by training. **Conclusions:** IL proved to be more effective than IK training for improving quadriceps muscle strength and structure. It is conjectured that the rapid acceleration of the load in the early phase of IL eccentric movements (i.e., at short muscle lengths), which results in greater torque and angular velocities compared with IK actions, is the main determinant of strength and neuromuscular adaptations to eccentric training. These findings have important consequences for the optimization of IL and IK eccentric exercise for resistance training and rehabilitation purposes. **Key Words:** LENGTHENING CONTRACTION, STRENGTH TRAINING, EMG, ULTRASONOGRAPHY

Eccentric contractions are characterized by the production of force while lengthening the muscle–tendon complex. This forced and active stretch creates high levels of tension that can cause cytoskeletal damage (4) and, in turn, trigger local inflammation and muscle remodeling (3). Although these perturbations can have detrimental short-term effects on performance, repeated eccentric exercise increases neural activation and triggers long-term adaptations at the cellular level (20,24,29). Mechanical overload has been suggested to influence gene expression via mechanotransduction pathways (29), resulting in skeletal muscle hypertrophy, strengthening of the musculotendinous tissue, and thus protection of the muscle–tendon complex against further injury (21,30). These neuromuscular adaptations induced by eccentric training are responsible for strength improvements (12) that are recognized to be greater than those induced by concentric training (34).

Lengthening contractions may be used to control the displacement of a constant external load (isoinertial or isoload)

or to resist a constant angular velocity movement (isokinetic) (16,26). Muscles are differently solicited when exposed to these two exercise modalities, as illustrated by different torque–angle and velocity–angle relationships (15,18). Another distinction between the two lengthening–contraction behaviors is the extent to which the muscle activation is modulated during contraction because muscles elicit different neural patterns when the load forcibly lengthens the muscles versus when the load is voluntarily lowered against gravity (7). Indeed, the intensity of the activation signal changes minimally when resisting an imposed load, in contrast to the amount that it can vary when a load is being displaced (7). Although the neuromuscular adaptations specifically induced by each modality are not identified, isoload (IL) and isokinetic (IK) eccentric training are irrespectively used to improve muscle strength (8,9,20,24,28,39), to restore muscle function after injury (26) and in the management of tendinopathies (30). A review of the literature recently indicated that IL eccentric training appears to be more effective than IK eccentric training in improving muscle strength (16). Nonetheless, to date, no comparative study has determined the effects specifically induced by IL versus IK eccentric training, mainly because of methodological difficulties in matching the amount of work between the two modalities.

On the basis of the principle of strength training specificity, it has been postulated that IL and IK eccentric actions provide a different stimulus to the neuromuscular system and, therefore, could produce different structural and/or neural adaptations (15,18). In the IL modality, mechanical overloading

# The American Journal of Sports Medicine

<http://ajs.sagepub.com/>

---

## **Effects of Air-Pulsed Cryotherapy on Neuromuscular Recovery Subsequent to Exercise-Induced Muscle Damage**

Gaël Guilhem, François Hug, Antoine Couturier, Stéphanie Regnault, Laure Bournat, Jean-Robert Filliard and Sylvain Dorel

*Am J Sports Med* 2013 41: 1942 originally published online June 5, 2013  
DOI: 10.1177/0363546513490648

The online version of this article can be found at:  
<http://ajs.sagepub.com/content/41/8/1942>

---

Published by:



<http://www.sagepublications.com>

On behalf of:



[American Orthopaedic Society for Sports Medicine](#)

Additional services and information for *The American Journal of Sports Medicine* can be found at:

**Email Alerts:** <http://ajs.sagepub.com/cgi/alerts>

**Subscriptions:** <http://ajs.sagepub.com/subscriptions>

**Reprints:** <http://www.sagepub.com/journalsReprints.nav>

**Permissions:** <http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

>> [Version of Record - Aug 2, 2013](#)

[OnlineFirst Version of Record - Jun 13, 2013](#)

[OnlineFirst Version of Record - Jun 5, 2013](#)

[What is This?](#)

# Effects of Air-Pulsed Cryotherapy on Neuromuscular Recovery Subsequent to Exercise-Induced Muscle Damage

Gaël Guilhem,<sup>\*†</sup> PhD, François Hug,<sup>‡§</sup> PhD, Antoine Couturier,<sup>†</sup> PhD, Stéphanie Regnault,<sup>†</sup> MSc, Laure Bournat,<sup>†</sup> MSc, Jean-Robert Filliard,<sup>†</sup> PhD, and Sylvain Dorel,<sup>†‡</sup> PhD  
*Investigation performed at the National Institute for Sports (INSEP), Paris, France*

**Background:** Localized cooling has been proposed as an effective strategy to limit the deleterious effects of exercise-induced muscle damage on neuromuscular function. However, the literature reports conflicting results.

**Purpose:** This randomized controlled trial aimed to determine the effects of a new treatment, localized air-pulsed cryotherapy ( $-30^{\circ}\text{C}$ ), on the recovery time-course of neuromuscular function following a strenuous eccentric exercise.

**Study Design:** Controlled laboratory study.

**Methods:** A total of 24 participants were included in either a control group (CONT) or a cryotherapy group (CRYO). Immediately after 3 sets of 20 maximal isokinetic eccentric contractions of elbow flexors, and then 1, 2, and 3 days after exercise, the CRYO group received a cryotherapy treatment ( $3 \times 4$  minutes at  $-30^{\circ}\text{C}$  separated by 1 minute). The day before and 1, 2, 3, 7, and 14 days after exercise, several parameters were quantified: maximal isometric torque and its associated maximal electromyographic activity recorded by a 64-channel electrode, delayed-onset muscle soreness (DOMS), biceps brachii transverse relaxation time ( $T_2$ ) measured using magnetic resonance imaging, creatine kinase activity, interleukin-6, and C-reactive protein.

**Results:** Maximal isometric torque decreased similarly for the CONT ( $-33\% \pm 4\%$ ) and CRYO groups ( $-31\% \pm 6\%$ ). No inter-group differences were found for DOMS, electromyographic activity, creatine kinase activity, and  $T_2$  level averaged across the whole biceps brachii. C-reactive protein significantly increased for CONT (+93% at 72 hours,  $P < .05$ ) but not for CRYO. Spatial analysis showed that cryotherapy delayed the significant increase of  $T_2$  and the decrease of electromyographic activity level for CRYO compared with CONT (between day 1 and day 3) in the medio-distal part of the biceps brachii.

**Conclusion:** Although some indicators of muscle damage after severe eccentric exercise were delayed (ie, local formation of edema and decrease of muscle activity) by repeated air-pulsed cryotherapy, we provide evidence that this cooling procedure failed to improve long-term recovery of muscle performance.

**Clinical Relevance:** Four applications of air-pulsed cryotherapy in the 3 days after a strenuous eccentric exercise are ineffective overall in promoting long-term muscle recovery. Further studies taking into account the amount of exercise-induced muscle damage would allow investigators to make stronger conclusions regarding the inefficiency of this recovery modality.

**Keywords:** eccentric contraction; edema; high-density EMG; damage markers; cold application; fatigue

Eccentric contraction forcibly lengthens an activated muscle. When unaccustomed or intense, this active stretching

\*Address correspondence to Gaël Guilhem, PhD, Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, Service Recherche, 11, Avenue du Tremblay, 75012 Paris, France (e-mail: gael.guilhem@insep.fr).

†National Institute for Sports (INSEP), Research and Medical Departments, Paris, France.

‡University of Nantes, Laboratory "Motricité, Interactions, Performance" (EA 4334), Nantes, France.

§The University of Queensland, NHMRC Centre of Clinical Research Excellence in Spinal Pain, Injury and Health, School of Health and Rehabilitation Sciences, Brisbane, Australia.

One or more of the authors has declared the following potential conflict of interest or source of funding: This study was funded by the French Ministry of Sports (contract 07-006).

of the muscle-tendon unit can generate exercise-induced muscle damage (EIMD).<sup>10</sup> Such muscle damage is characterized by cytoskeletal alterations<sup>11</sup> associated with a loss of muscle force,<sup>19</sup> an increase in muscle stiffness,<sup>6,19</sup> a release of muscle proteins,<sup>35</sup> inflammation,<sup>30</sup> and a delayed edema as revealed by transverse relaxation time ( $T_2$ ) measured by magnetic resonance imaging (MRI).<sup>7,23</sup> This inflammatory process results in delayed-onset muscle soreness (DOMS)<sup>4</sup> by stimulating nociceptive and metabosensitive type III and IV muscle afferents,<sup>25,28</sup> which are potentially responsible for impairments to the neural drive of the muscles.<sup>33</sup> As it has been proposed that the nervous system may change its strategy of muscle activation to reduce pain or protect the damaged area from further injury,<sup>16</sup> one would expect a non-uniform spatial change in muscle activity level organized in respect to the edema location.

Structural and functional alterations resulting from eccentric exercise occur mainly when one is resuming,

# Mechanical and Muscular Coordination Patterns during a High-Level Fencing Assault

GAËL GUILHEM<sup>1</sup>, CAROLINE GIROUX<sup>1,2</sup>, ANTOINE COUTURIER<sup>1</sup>, DIDIER CHOLLET<sup>2</sup>, and GIUSEPPE RABITA<sup>1</sup>

<sup>1</sup>French National Institute of Sport (INSEP), Research Department, Laboratory Sport, Expertise and Performance, Paris, FRANCE; and <sup>2</sup>CETAPS UPRES EA 3832, Faculty of Sports Sciences, University of Rouen, Mont Saint Aignan, FRANCE

## ABSTRACT

GUILHEM, G., C. GIROUX, A. COUTURIER, D. CHOLLET, and G. RABITA. Mechanical and Muscular Coordination Patterns during a High-Level Fencing Assault. *Med. Sci. Sports Exerc.*, Vol. 46, No. 2, pp. 341–350, 2014. **Purpose:** This study aimed to investigate the coordination of lower limb muscles during a specific fencing gesture in relation to its mechanical effectiveness. **Methods:** Maximal isokinetic concentric and isometric plantarflexor, dorsiflexor, knee and hip extensor and flexor torques of 10 female elite saber fencers were assessed and compared between both legs. Sabers completed three trials of a specific fencing gesture (i.e., *marché-fente*) on a 6.60-m-long force platform system. Surface EMG activities of 15 lower limb muscles were recorded in time with ground reaction forces and separated into four distinct assault phases. EMG signals were normalized to the muscle activity assessed during maximal isometric contraction. Mechanical and EMG data were compared between both legs over the entire assault and in each phase (ANOVA). Potential correlations between muscle strength and average EMG activities were tested (Bravais–Pearson coefficient). **Results:** EMG activity patterns showed that rear hip and knee extensor and plantarflexor muscles were mainly activated during propulsive (concentric) phases, while front hip and knee extensor muscles were strongly solicited during the final braking (eccentric) phase to decelerate the body mass. Although fencers presented greater maximal hip (+10%) and knee (+26%) extensor strength in the front than in the rear leg ( $P < 0.05$ ), rear hip and knee extensor strength was significantly correlated to the maximal anteroposterior velocity ( $r = 0.60$ – $0.81$ ). Moreover, muscle activity of the rear extensors was related to average velocity during the second propulsive phase (phase 3). **Conclusions:** This study gathers the first evidence of a crucial role of the rear extensor muscles in fencing speed performance. Such findings suggest interesting perspectives in the definition of specific training or rehabilitation programs for elite fencers. **Key Words:** EMG, FORCE PLATFORM, MUSCLE ADAPTATIONS, ASYMMETRICAL EXERCISE, FENCERS

Fencing is a combat sport whose aim is to touch the opponent through a weapon. This opposition context involves short, fast, and complex decisive actions, which make movement speed and perceptual accuracy essential skills for performance (29,34–36). Improving fencing level therefore requires acquiring specific psychomotor and neuromuscular abilities (29,36). On the one hand, to date, most of the technical contents of fencing movements practice (e.g., motor control, technical basics, mechanical effectiveness) rely on empirical concepts originating from practical experiences (3). On the other hand, substantial information relative to the biomechanical and neuromuscular profile engaged in elite fencing gestures remains very scarce. Although previous studies identified some of the physiological (27,31),

psychological (34), and technical characteristics (29) of elite fencers in comparison to novice fencers, no scientific evidence has yet determined the specific neuromuscular patterns of the lower limb muscles associated with fencing movement kinetics. Such investigations are of great interest considering that velocity and accuracy of movement have been demonstrated to be related to fencing performance (33). In this context, saber represents an interesting model owing to its very explosive-type assaults (1,3).

Identification of the activated lower limb muscles, as well as the amplitude and timing of these activations, would help to shed more light on the details of fencing movements. Surface EMG represents a means to easily and noninvasively extract information from the activated muscles during a specific movement (19). This technique has been widely used to improve knowledge of cycling (20), running (23), or rowing (37). Most of these studies have been performed on such standardized activities, in laboratory conditions, and thus have used ergometers that constrain the natural movements executed *in situ*; however, little is known about the specific muscle coordination during more complex activities in “real” conditions. Moreover, the development of devices that permit the acquisition of ground reaction forces during complex and long-distance movements (e.g., force plates connected in series) offers the capability to study the

Address for correspondence: Gaël Guilhem, Ph.D., Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, Département de la Recherche, Laboratoire Sport, Expertise et Performance, 11, avenue du Tremblay, 75012 Paris, France; E-mail: gael.guilhem@insep.fr.

Submitted for publication April 2013.

Accepted for publication July 2013.

0195-9131/14/4602-0341/0

MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE®

Copyright © 2013 by the American College of Sports Medicine

DOI: 10.1249/MSS.0b013e3182a6401b

# Time-course effect of exercise-induced muscle damage on localized muscle mechanical properties assessed using elastography

L. Lacourpaille,<sup>1</sup> A. Nordez,<sup>1</sup> F. Hug,<sup>1,2</sup> A. Couturier,<sup>3</sup> C. Dibie<sup>3</sup> and G. Guilhem<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Laboratory 'Motricité, Interactions, Performance' (EA 4334), UFR STAPS, University of Nantes, Nantes, France

<sup>2</sup> NHMRC Centre of Clinical Research Excellence in Spinal Pain, Injury and Health, School of Health and Rehabilitation Sciences, The University of Queensland, Brisbane, Qld, Australia

<sup>3</sup> Laboratory Sport, Expertise and Performance, Research and Medical Departments, French National Institute of Sport (INSEP), Paris, France

Received 20 July 2013,  
revision requested 15 October  
2013,  
revision received 25 February  
2014,  
accepted 3 March 2014  
Correspondence: G. Guilhem,  
PhD, Laboratory Sport, Expertise  
and Performance, Research  
Department, French National  
Institute of Sport (INSEP), 11,  
avenue du Tremblay, 75012 Paris,  
France.  
E-mail: gael.guilhem@insep.fr

## Abstract

**Aim:** Changes in muscle stiffness after exercise-induced muscle damage have been classically inferred from passive torque–angle curves. Elastographic techniques can be used to estimate the shear modulus of a localized muscular area. This study aimed to quantify the changes in shear elastic modulus in different regions of the elbow flexors after eccentric exercise and their relation to muscle length.

**Methods:** Shear elastic modulus and transverse relaxation time ( $T_2$ ) were measured in the biceps brachii and brachialis muscles of sixteen participants, before, 1 h, 48 h and 21 days after three sets of ten maximal isokinetic eccentric contractions performed at  $120^\circ \text{ s}^{-1}$ .


**Results:** The shear elastic modulus of the elbow flexors significantly increased 1 h (+46%;  $P = 0.005$ ), with no significant change at 48 h and 21D, post-exercise. In contrast,  $T_2$  was not modified at 1 h but significantly increased at 48 h (+15%;  $P < 0.05$ ). The increase in shear elastic modulus was more pronounced at long muscle lengths and reached a similar extent in the different regions of the elbow flexors. The normalized hysteresis area of shear elastic modulus–length relationship for the biceps brachii increased 1 h post-exercise (31%) in comparison with the pre-exercise value (18%), but was not significantly altered after five stretching cycles ( $P = 0.63$ ).

**Conclusion:** Our results show homogeneous changes in muscle shear elastic modulus within and between elbow flexors. The greater increase in shear elastic modulus observed at long muscle lengths suggests the putative involvement of both cross-bridges number and titin in the modifications of muscle shear elastic modulus after damaging exercise.

**Keywords** eccentric contractions, hysteresis area, oedema, passive tension, supersonic shear imaging.

Eccentric muscle contraction imposes high mechanical strain on the muscle-tendon system leading to muscle damage (Clarkson & Hubal 2002, Guilhem *et al.* 2010). These cytoskeletal alterations typically result in impairment of neuromuscular function (Guilhem *et al.* 2013, Heroux & Gandevia 2013, Semmler *et al.*

2013) including a decrease in maximal strength and range of motion, combined with an increase in muscle stiffness and perceived soreness in the days following exercise (Howell *et al.* 1993, Friden & Lieber 2001). Passive torque is increased close to its peak value in the early moments after exercise, remaining elevated



## Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering

Publication details, including instructions for authors and subscription information:  
<http://www.tandfonline.com/loi/gcmb20>

### Muscle coordination in loaded squat jump

C. Giroux<sup>ab</sup>, G. Guilhem<sup>a</sup>, D. Chollet<sup>b</sup> & G. Rabita<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Laboratory SEP, Research Department, French National Institute of Sports (INSEP), Paris, France

<sup>b</sup> CETAPS UPRES EA 3832, Faculty of Sports Sciences, University of Rouen, Mont Saint Aignan Cedex, France

Published online: 30 Jul 2014.

To cite this article: C. Giroux, G. Guilhem, D. Chollet & G. Rabita (2014) Muscle coordination in loaded squat jump, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 17:sup1, 158-159, DOI: [10.1080/10255842.2014.931621](https://doi.org/10.1080/10255842.2014.931621)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/10255842.2014.931621>

PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE

Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the "Content") contained in the publications on our platform. However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views expressed in this publication are the opinions and views of the authors, and are not the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified with primary sources of information. Taylor and Francis shall not be liable for any losses, actions, claims, proceedings, demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with, in relation to or arising out of the use of the Content.

This article may be used for research, teaching, and private study purposes. Any substantial or systematic reproduction, redistribution, reselling, loan, sub-licensing, systematic supply, or distribution in any form to anyone is expressly forbidden. Terms & Conditions of access and use can be found at <http://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions>



ELSEVIER

Contents lists available at ScienceDirect

# Journal of Electromyography and Kinesiology

journal homepage: [www.elsevier.com/locate/jelekin](http://www.elsevier.com/locate/jelekin)



## Validity of trunk extensor and flexor torque measurements using isokinetic dynamometry



Gaël Guilhem <sup>a,\*</sup>, Caroline Giroux <sup>a,b</sup>, Antoine Couturier <sup>a</sup>, Nicola A. Maffiuletti <sup>c</sup>

<sup>a</sup>French National Institute of Sport (INSEP), Research Department, Laboratory Sport, Expertise and Performance, Paris, France

<sup>b</sup>CETAPS UPRES EA 3832, Faculty of Sports Sciences, University of Rouen, Mont Saint Aignan Cedex, France

<sup>c</sup>Neuromuscular Research Laboratory, Schulthess Clinic, Zurich, Switzerland

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 27 November 2013

Received in revised form 6 July 2014

Accepted 7 July 2014

### ABSTRACT

This study aimed to evaluate the validity and test-retest reliability of trunk muscle strength testing performed with a latest-generation isokinetic dynamometer. Eccentric, isometric, and concentric peak torque of the trunk flexor and extensor muscles was measured in 15 healthy subjects. Muscle cross sectional area (CSA) and surface electromyographic (EMG) activity were respectively correlated to peak torque and submaximal isometric torque for erector spinae and rectus abdominis muscles. Reliability of peak torque measurements was determined during test and retest sessions. Significant correlations were consistently observed between muscle CSA and peak torque for all contraction types ( $r = 0.74$ – $0.85$ ;  $P < 0.001$ ) and between EMG activity and submaximal isometric torque ( $r \geq 0.99$ ;  $P < 0.05$ ), for both extensor and flexor muscles. Intraclass correlation coefficients were comprised between 0.87 and 0.95, and standard errors of measurement were lower than 9% for all contraction modes. The mean difference in peak torque between test and retest ranged from  $-3.7\%$  to  $3.7\%$  with no significant mean directional bias. Overall, our findings establish the validity of torque measurements using the tested trunk module. Also considering the excellent test-retest reliability of peak torque measurements, we conclude that this latest-generation isokinetic dynamometer could be used with confidence to evaluate trunk muscle function for clinical or athletic purposes.

© 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

### 1. Introduction

Strength is an important quality for skeletal muscles of the trunk (particularly flexors and extensors), as it helps in maintaining an optimal posture and core stability (Andersson et al., 1988) and prevents excessive loading on passive structures, such as ligaments, connective tissues and tendons (El-Rich et al., 2004). Indeed, muscle strength of trunk extensors and flexors may contribute to spine stability (Lee et al., 1999), thereby preventing the occurrence of musculoskeletal disorders such as low back pain (Iwai et al., 2004; Yahia et al., 2011). Furthermore, when performed in adequate conditions (i.e., with sufficient learning) (Urzica et al., 2007), training programs aiming at improving trunk muscle strength could also reduce the disability level resulting from back pain (Keller et al., 2008), which is the most common pathology in the general population and constitutes a major public health issue

(Schaafsma et al., 2013). In the same way, a strong and stable trunk facilitates the transfer of the forces generated by the upper and lower limb muscles (Kubo et al., 2011), thus contributing to athletic performance in different sports (Kubo et al., 2011; Tanaka et al., 2013).

Muscle force-generating capacity depends on the volume, fascicle length and pennation angle of the muscle (Lieber and Friden, 2000). Muscle strength is thus considered to be proportional to the physiological cross-sectional area (PCSA, muscular determinant) which corresponds to the volume divided by the penned fiber length (Lieber and Friden, 2000; Stokes and Gardner-Morse, 1999). As the assessment of fascicle pennation angle is difficult to achieve in a valid way on trunk muscles *in vivo*, muscle volume has mainly been inferred from anatomical cross-sectional area (Kubo et al., 2011; Tanaka et al., 2013). The second main physiological determinants of trunk muscle strength is muscle activation (neural determinant), that is mainly regulated by spatial and temporal characteristics of motor unit recruitment during a voluntary contraction (Lippold, 1952).

Assessment of trunk muscle strength, though challenging (Grabiner et al., 1990; Newton and Waddell, 1993), is relevant to

\* Corresponding author. Address: Institut National du Sport (INSEP), Département de la Recherche, Laboratoire Sport, Expertise et Performance, 11, avenue du Tremblay, 75012 Paris, France. Tel.: +33 (0)1 41 74 43 36; fax: +33 (0)1 41 75 45 35.

E-mail address: [gael.guilhem@insep.fr](mailto:gael.guilhem@insep.fr) (G. Guilhem).



## Is muscle coordination affected by loading condition in ballistic movements?

Caroline Giroux <sup>a,b</sup>, Gaël Guilhem <sup>a</sup>, Antoine Couturier <sup>a</sup>, Didier Chollet <sup>b</sup>, Giuseppe Rabita <sup>a,\*</sup>

<sup>a</sup> French National Institute of Sport (INSEP), Research Department, Laboratory Sport, Expertise and Performance, Paris, France

<sup>b</sup> CETAPS UPRES EA 3832, Faculty of Sports Sciences, University of Rouen, Mont Saint Aignan Cedex, France

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 2 July 2014

Received in revised form 8 October 2014

Accepted 22 October 2014

#### Keywords:

Squat jump

Force platform

Force–velocity relationship

EMG

### ABSTRACT

This study aimed to investigate the effect of loading on lower limb muscle coordination involved during ballistic squat jumps. Twenty athletes performed ballistic squat jumps on a force platform. Vertical force, velocity, power and electromyographic (EMG) activity of lower limb muscles were recorded during the push-off phase and compared between seven loading conditions (0–60% of the concentric-only maximal repetition). The increase in external load increased vertical force (from 1962 N to 2559 N;  $P = 0.0001$ ), while movement velocity decreased (from 2.5 to 1.6 m s<sup>-1</sup>;  $P = 0.0001$ ). EMG activity of tibialis anterior first peaked at 5% of the push-off phase, followed by gluteus maximus (35%), vastus lateralis and soleus (45%), rectus femoris (55%), gastrocnemius lateralis (65%) and semitendinosus (75%). This sequence of activation ( $P = 0.67$ ) and the amplitude of muscle activity ( $P = 0.41$ ) of each muscle were not affected by loading condition. However, a main effect of muscle was observed on these parameters (peak value:  $P < 0.001$ ; peak occurrence:  $P = 0.02$ ) illustrating the specific role of each muscle during the push-off phase. Our findings suggest that muscle coordination is not influenced by external load during a ballistic squat jump.

© 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

## 1. Introduction

Ballistic performance (i.e., accelerative movement with projection into free space of the displaced mass) is essential in various explosive-oriented physical tasks. This athletic capacity is closely related to the ability of the neuromuscular system to produce the greatest possible impulse in the shortest period of time (Newton et al., 1999). Such performance is also influenced by the force–velocity and power–velocity profiles (Samozino et al., 2012) classically inferred from the assessment of force, velocity and power production in a wide range of loading conditions (Cormie et al., 2011). As described in vertical jumping, increasing the external load induces a linear increase of the force output and a concomitant decrease of the movement velocity (Cuk et al., 2014; Markovic et al., 2013; Samozino et al., 2012). In multi-joint exercises, while the linear force–velocity and parabolic power–velocity relationships allow to explore the mechanical abilities and limits of the muscular system (Cormie et al., 2011), little is known regarding


the effect of additional loads on muscle coordination underlying the production of force, velocity and power output.

Muscle coordination can be defined as “a distribution of muscle activation or force among individual muscle to produce a given combination of joint moments” (Prilutsky, 2000). This has been widely studied in various functional tasks (Dorel et al., 2012a; Eloranta, 1996) through the alteration of muscle electromyographic (EMG) activity in response to changes in the external conditions (e.g., movement velocity, external load, posture). Among these parameters, it is well established that increased external resistance can induce a global increase in joint load and hence muscle activity level (Disselhorst-Klug et al., 2009; Hug and Dorel, 2009). Indeed, during dynamic contractions, EMG amplitude is related to the force output, which is illustrated by a linear or curvilinear EMG–force relationship depending on the considered joint (Disselhorst-Klug et al., 2009; Perry and Bekey, 1981). Likewise, at a constant tension, the EMG activity increases linearly with the fascicle shortening velocity (Bigland and Lippold, 1954), highlighting the influence of both force and velocity on muscle activity.

In a vertical jump with no additional load, previous works suggested that the power generated at the hip and knee joints by the mono-articular muscles is transferred distally to the ankle by the bi-articular muscles throughout the push-off phase (Gregoire

\* Corresponding author at: French National Institute of Sport (INSEP), Research Department, 11 Avenue du Tremblay, 75012 Paris, France. Tel.: +33 (0)1 41 74 44 71; fax: +33 (0)1 41 74 43 35.

E-mail address: [giuseppe.rabita@insep.fr](mailto:giuseppe.rabita@insep.fr) (G. Rabita).



## Is muscle coordination affected by loading condition in ballistic movements?

Caroline Giroux <sup>a,b</sup>, Gaël Guilhem <sup>a</sup>, Antoine Couturier <sup>a</sup>, Didier Chollet <sup>b</sup>, Giuseppe Rabita <sup>a,\*</sup>

<sup>a</sup> French National Institute of Sport (INSEP), Research Department, Laboratory Sport, Expertise and Performance, Paris, France

<sup>b</sup> CETAPS UPRES EA 3832, Faculty of Sports Sciences, University of Rouen, Mont Saint Aignan Cedex, France

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 2 July 2014

Received in revised form 8 October 2014

Accepted 22 October 2014

#### Keywords:

Squat jump

Force platform

Force–velocity relationship

EMG

### ABSTRACT

This study aimed to investigate the effect of loading on lower limb muscle coordination involved during ballistic squat jumps. Twenty athletes performed ballistic squat jumps on a force platform. Vertical force, velocity, power and electromyographic (EMG) activity of lower limb muscles were recorded during the push-off phase and compared between seven loading conditions (0–60% of the concentric-only maximal repetition). The increase in external load increased vertical force (from 1962 N to 2559 N;  $P = 0.0001$ ), while movement velocity decreased (from 2.5 to 1.6 m s<sup>-1</sup>;  $P = 0.0001$ ). EMG activity of tibialis anterior first peaked at 5% of the push-off phase, followed by gluteus maximus (35%), vastus lateralis and soleus (45%), rectus femoris (55%), gastrocnemius lateralis (65%) and semitendinosus (75%). This sequence of activation ( $P = 0.67$ ) and the amplitude of muscle activity ( $P = 0.41$ ) of each muscle were not affected by loading condition. However, a main effect of muscle was observed on these parameters (peak value:  $P < 0.001$ ; peak occurrence:  $P = 0.02$ ) illustrating the specific role of each muscle during the push-off phase. Our findings suggest that muscle coordination is not influenced by external load during a ballistic squat jump.

© 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

## 1. Introduction

Ballistic performance (i.e., accelerative movement with projection into free space of the displaced mass) is essential in various explosive-oriented physical tasks. This athletic capacity is closely related to the ability of the neuromuscular system to produce the greatest possible impulse in the shortest period of time (Newton et al., 1999). Such performance is also influenced by the force–velocity and power–velocity profiles (Samozino et al., 2012) classically inferred from the assessment of force, velocity and power production in a wide range of loading conditions (Cormie et al., 2011). As described in vertical jumping, increasing the external load induces a linear increase of the force output and a concomitant decrease of the movement velocity (Cuk et al., 2014; Markovic et al., 2013; Samozino et al., 2012). In multi-joint exercises, while the linear force–velocity and parabolic power–velocity relationships allow to explore the mechanical abilities and limits of the muscular system (Cormie et al., 2011), little is known regarding

the effect of additional loads on muscle coordination underlying the production of force, velocity and power output.

Muscle coordination can be defined as “a distribution of muscle activation or force among individual muscle to produce a given combination of joint moments” (Prilutsky, 2000). This has been widely studied in various functional tasks (Dorel et al., 2012a; Eloranta, 1996) through the alteration of muscle electromyographic (EMG) activity in response to changes in the external conditions (e.g., movement velocity, external load, posture). Among these parameters, it is well established that increased external resistance can induce a global increase in joint load and hence muscle activity level (Disselhorst-Klug et al., 2009; Hug and Dorel, 2009). Indeed, during dynamic contractions, EMG amplitude is related to the force output, which is illustrated by a linear or curvilinear EMG–force relationship depending on the considered joint (Disselhorst-Klug et al., 2009; Perry and Bekey, 1981). Likewise, at a constant tension, the EMG activity increases linearly with the fascicle shortening velocity (Bigland and Lippold, 1954), highlighting the influence of both force and velocity on muscle activity.

In a vertical jump with no additional load, previous works suggested that the power generated at the hip and knee joints by the mono-articular muscles is transferred distally to the ankle by the bi-articular muscles throughout the push-off phase (Gregoire

\* Corresponding author at: French National Institute of Sport (INSEP), Research Department, 11 Avenue du Tremblay, 75012 Paris, France. Tel.: +33 (0)1 41 74 44 71; fax: +33 (0)1 41 74 43 35.

E-mail address: [giuseppe.rabita@insep.fr](mailto:giuseppe.rabita@insep.fr) (G. Rabita).



## Time-course of performance changes and underlying mechanisms during and after repetitive moderately weight-loaded knee extensions



Mathieu Plautard <sup>a</sup>, Gaël Guilhem <sup>b</sup>, Christophe Cornu <sup>a</sup>, Arnaud Guével <sup>a,\*</sup>

<sup>a</sup> University of Nantes, Faculty of Sport Sciences, Laboratory Motricité, Interactions, Performance, EA 4334, Nantes, France

<sup>b</sup> French National Institute of Sport (INSEP), Research Department, Laboratory Sport, Expertise and Performance, Paris, France

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 23 September 2014

Received in revised form 9 January 2015

Accepted 2 February 2015

#### Keywords:

Single-joint contraction

Muscle coactivation

Central and peripheral fatigue

### ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the mechanisms of fatigue development induced by isoload (IL) fatiguing knee extensions. Nine physically active males (age = 23 ± 2 years, height = 179 ± 7 cm, mass = 76 ± 7 kg) performed repetitive ballistic knee extensions at 30% of the isometric maximal voluntary peak torque. Fatigue development was assessed throughout the fatiguing exercise by quantifying changes in peak torque, agonist and antagonist electromyographic activity (EMG) and torque- and EMG-angle relationships. Before and after the fatiguing exercise, isometric maximal voluntary contractions were performed to measure peak torque (MVIC torque), voluntary activation (VA) and resting twitch torque. IL peak torque decreased from the middle of the fatiguing exercise while the agonist and antagonist EMG amplitude increased consistently during the entire exercise ( $P < .005$ ). The pattern of the torque-angle relationship changed with fatigue ( $P < .005$ ) reflecting a change in torque production strategy even if the EMG-angle relationships were not modified. Post-exercise testing revealed a decrease in MVIC torque ( $-31\%$ ;  $P < .005$ ). VA was unchanged ( $P = .60$ ) while the resting twitch torque was impaired to a great extent ( $-46\%$ ;  $P < .005$ ) suggesting that local muscular mechanisms but not neural drive were altered during single-joint IL fatiguing task.

© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

### 1. Introduction

Repetitive light-loaded muscle contractions are recognized to be an effective way to improve functional abilities particularly for humans who need to limit mechanical constraint on joints during exercise (e.g. old, young, injured or diseased subjects) (Nicholson et al., 2014). Muscular endurance exercise induces optimal effect when resulting in fatigue, defined as an exercise-related decrease in the maximal voluntary force or power of the activated muscles (Bigland-Ritchie and Woods, 1984). The decline in muscle force can then originate from processes that affect the various levels of the motor pathway from the brain to the skeletal muscle.

Although constant resistance loading (isoload) is the most widely-used resistance to enhance muscle function in sport training exercises, rehabilitation and injury prevention (Wernbom et al., 2007), exercise-induced fatigue is mainly investigated through isometric or isokinetic contractions, which poorly reflect daily-life

tasks. On the one hand, several studies have examined fatigue development during single-joint isoload repetitive contractions (Masuda et al., 1999; Pincivero et al., 2006), whereas only one study has investigated the contribution of central and peripheral mechanisms via electrical stimulation (Klass et al., 2004). On the other hand, according to the task dependence theory (Enoka and Duchateau, 2008), the mechanisms that limit performance may be specific to the type of resistance and muscle action used.

Indeed, constant resistance exhibits specific mechanical constraints (i.e., external torque, angular velocity). In particular, isoload fatiguing exercises elicit a wide range of angular velocities, which in turn influences agonist and antagonist muscle activity patterns that can differ from isometric (Kay et al., 2000) or isokinetic exercise (Guilhem et al., 2011; Remaud et al., 2009). During single-joint isokinetic contractions, authors observed a large torque decrease from the beginning of the fatiguing exercise (Babault et al., 2006; Hassani et al., 2006; Pasquet et al., 2000). In these studies, agonist electromyographic activity (EMG) also tended to decrease slightly, while antagonist EMG increased (Weir et al., 1998) or remained steady (Hassani et al., 2006; Kellis, 1999). During isoload fatigue exercise, muscle performance decreased moderately and only in the last part of the exercise while agonist EMG increased throughout the exercise (Pincivero

\* Corresponding author at: UFR STAPS Nantes, Laboratoire «Motricité, Interactions, Performance», 25 bis Boulevard Guy Mollet, 44322 Nantes Cedex 3, France. Tel.: +33 2 51 83 72 49; fax: +33 2 51 83 72 10.

E-mail address: [arnaud.guevel@univ-nantes.fr](mailto:arnaud.guevel@univ-nantes.fr) (A. Guével).

## In vivo maximal fascicle-shortening velocity during plantar flexion in humans

Hugo Hauraix,<sup>1</sup> Antoine Nordez,<sup>1</sup> Gaël Guilhem,<sup>2</sup> Giuseppe Rabita,<sup>2</sup> and Sylvain Dorel<sup>1</sup>

<sup>1</sup>University of Nantes, UFR STAPS, Laboratory “Movement, Interactions, Performance”, Nantes, France; and <sup>2</sup>French National Institute of Sport (INSEP), Research Department, Laboratory Sport, Expertise and Performance (EA 7370), Paris, France

Submitted 29 June 2015; accepted in final form 19 September 2015

**Hauraix H, Nordez A, Guilhem G, Rabita G, Dorel S.** In vivo maximal fascicle-shortening velocity during plantar flexion in humans. *J Appl Physiol* 119: 1262–1271, 2015. First published October 1, 2015; doi:10.1152/japplphysiol.00542.2015.—Interindividual variability in performance of fast movements is commonly explained by a difference in maximal muscle-shortening velocity due to differences in the proportion of fast-twitch fibers. To provide a better understanding of the capacity to generate fast motion, this study aimed to 1) measure for the first time in vivo the maximal fascicle-shortening velocity of human muscle; 2) evaluate the relationship between angular velocity and fascicle-shortening velocity from low to maximal angular velocities; and 3) investigate the influence of musculo-articular features (moment arm, tendinous tissues stiffness, and muscle architecture) on maximal angular velocity. Ultrafast ultrasound images of the gastrocnemius medialis were obtained from 31 participants during maximal isokinetic and light-loaded plantar flexions. A strong linear relationship between fascicle-shortening velocity and angular velocity was reported for all subjects (mean  $R^2 = 0.97$ ). The maximal shortening velocity ( $V_{Fmax}$ ) obtained during the no-load condition (NLC) ranged between 18.8 and 43.3 cm/s.  $V_{Fmax}$  values were very close to those of the maximal shortening velocity ( $V_{max}$ ), which was extrapolated from the F-V curve (the Hill model). Angular velocity reached during the NLC was significantly correlated with this  $V_{Fmax}$  ( $r = 0.57$ ;  $P < 0.001$ ). This finding was in agreement with assumptions about the role of muscle fiber type, whereas interindividual comparisons clearly support the fact that other parameters may also contribute to performance during fast movements. Nevertheless, none of the biomechanical features considered in the present study were found to be directly related to the highest angular velocity, highlighting the complexity of the upstream mechanics that lead to maximal-velocity muscle contraction.

maximal unloaded velocity; muscle-tendon unit; muscle mechanics; muscle architecture; stiffness; ultrasound

THE CAPACITY OF HUMAN SKELETAL muscle to achieve maximal power production is functionally very important during ballistic movements such as sprinting or jumping. The maximal angular velocity an individual can produce represents one of the key determinants of this ability and hence of human performance in various explosive tasks such as a sprint while running or cycling (31, 57). In the literature, this ability to reach extreme angular velocities in unloaded conditions is related mainly to a higher proportion of fast-twitch fibers (5, 11, 56) or a longer fascicle length, or both, which implies a higher number of sarcomeres in series (9, 53). These considerations suggest that subjects who are able to produce high velocity at the joint level should also be able to develop high muscle fascicle-shortening velocity. Consequently, the muscle-

shortening velocity should be a key determinant of the ability to perform very-high-velocity movements.

To our knowledge, no previous study has measured actual maximal fascicle-shortening velocity in vivo in humans. Although measurement of fascicle-shortening velocity is classically performed using ultrasound (13), the sampling frequency of conventional devices (i.e., the number of images per second, typically 30–170 Hz) limits the investigations to relatively slow motion, far from the maximal velocities reached during human movements. In this context, ultrafast ultrasound (14, 55) could be used to overcome this limitation and analyze very fast movements (17, 29, 47). Using this technique, we measured fascicle-shortening velocity during maximal isokinetic plantar flexions performed at various submaximal preset angular velocities, from 30°/s up to 330°/s (29). Nevertheless, because the torque was higher than 0 at 330°/s [about 30% of MVC], this highest-tested velocity remained far below the maximal angular velocity measured with, for example, the slack-test method [i.e., about  $493 \pm 149$ °/s at 60% of maximal voluntary contraction before release on the same muscle group (52)]. Nonetheless, in the study by Hauraix et al. (29) it was interesting to note that the increase in fascicle-shortening velocity in this range seemed proportional to the increase in angular velocity. In addition, a high interindividual variability of fascicle-shortening velocity was found, indicating that various individual fascicle-shortening velocities could be observed for the same preset angular velocity.

The relationship between fascicle-shortening velocity and angular velocity should be influenced by a number of biomechanical features. First, Lee and Piazza (41) showed that elite sprinters possess a small Achilles tendon moment arm, promoting an increase in angular velocity for the same fascicle-shortening velocity. Thus a shorter moment arm could be considered a mechanical advantage for producing higher maximal joint angular velocities. Second, muscle gearing (i.e., the variation of the pennation angle during contraction) should also play an important role in global muscle shortening (4, 49). Third, few studies (10, 21, 29) have highlighted the significant contribution of tendinous tissues to the total shortening velocity of the muscle-tendon unit even when the latter contracts in a concentric way (i.e., produces positive mechanical work). Therefore, the mechanical properties of tendons would also influence the relationship between fascicle-shortening velocity and angular velocity. These elements overall suggest that the relationship between fascicle-shortening velocity and angular velocity could be relevant in exploring the biomechanical efficiency of the musculo-articular complex in performing fast motions.

To provide a better understanding of the ability to produce high angular velocity movements, this study aimed to measure,

Address for reprint requests and other correspondence: Antoine Nordez, Univ. of Nantes, Laboratory “Movement, Interactions, Performance” (EA 4334), 25 bis boulevard Guy Mollet, BP 72206, 44322 Nantes cedex 3, France (e-mail: antoine.nordez@univ-nantes.fr).

## Optimal Balance Between Force and Velocity Differs Among World-Class Athletes

Caroline Giroux,<sup>1,2,3</sup> Giuseppe Rabita,<sup>1</sup> Didier Chollet,<sup>2</sup> and Gaël Guilhem<sup>1</sup>

<sup>1</sup>French National Institute of Sport (INSEP); <sup>2</sup>University of Rouen; <sup>3</sup>University of Paris-Est

Performance during human movements is highly related to force and velocity muscle capacities. Those capacities are highly developed in elite athletes practicing power-oriented sports. However, it is still unclear whether the balance between their force and velocity-generating capacities constitutes an optimal profile. In this study, we aimed to determine the effect of elite sport background on the force–velocity relationship in the squat jump, and evaluate the level of optimization of these profiles. Ninety-five elite athletes in cycling, fencing, taekwondo, and athletic sprinting, and 15 control participants performed squat jumps in 7 loading conditions (range: 0%–60% of the maximal load they were able to lift). Theoretical maximal power ( $P_m$ ), force ( $F_0$ ), and velocity ( $v_0$ ) were determined from the individual force–velocity relationships. Optimal profiles were assessed by calculating the optimal force ( $F_{opt}$ ) and velocity ( $v_{opt}$ ). Athletic sprinters and cyclists produced greater force than the other groups ( $P < .05$ ).  $F_0$  was significantly lower than  $F_{opt}$ , and  $v_0$  was significantly higher than  $v_{opt}$  for female fencers and control participants, and for male athletics sprinters, fencers, and taekwondo practitioners ( $P < .05$ ). Our study shows that the chronic practice of an activity leads to differently balanced force–velocity profiles. Moreover, the differences between measured and optimal force–velocity profiles raise potential sources of performance improvement in elite athletes.

**Keywords:** maximal power, muscle capacities, optimization, simple method, sport performance

Human daily life tasks require muscles to produce a certain amount of power to accelerate the body mass or individual limb segments. In the context of sport performance, the ability to produce high amounts of power output is what separates truly elite athletes from merely good ones. This has been evidenced in explosive activities, such as sprint running,<sup>1,2</sup> cycling,<sup>3</sup> and combat sports.<sup>4,5</sup> The assessment of power output can therefore allow the exploration of some aspects of the limits of the neuromuscular function. Power-generating capacities are commonly inferred from the force–velocity (F-V) and power–velocity (P-V) relationships.<sup>1,3,6,7</sup> While the muscular power depends on the classical hyperbolic relationship between the force output and shortening velocity,<sup>8</sup> in multijoint movements, muscle forces and associated joint torque change continuously with the instantaneous length, shortening velocity, and muscle–bone geometry of the involved muscular groups. The combination of muscles forces and joint torque depending on each mono- and biarticular muscle F-V relationship results in a negative linear relationship between the external force and the velocity of the movement.<sup>9,10</sup> Classically, theoretical parameters have been derived

from these relationships: (i) the maximal force at null velocity ( $F_0$ ); (ii) the maximal velocity calculated by extrapolation to zero force ( $v_0$ ); and (iii) the maximal power ( $P_m$ ) that can be produced.<sup>6,11</sup> Therefore, the evaluation of F-V and P-V relationships during squat jump movements may help in the appraisal of the mechanical, morphological, and neuromuscular limits of an athlete.<sup>7,9,11</sup>

Muscular abilities are usually correlated to in situ performance.<sup>4,12,13</sup> Indeed, velocity in fencing<sup>4,5</sup> or force in sprinting<sup>1,7,14</sup> have been reported as the main determinants of techniques' effectiveness. Moreover the power-generating capacities of elite practitioners are affected by their high-level training background and the chronic practice of their activity.<sup>15</sup> On the one hand, as training workloads are nearly maximal in highly-trained athletes,<sup>9</sup> one could assume a low potential to increase power-generating capacity (quantitative improvement). On the other hand, designing the training contents to optimize the balance between muscle abilities (ie, force, velocity, power) could be an alternative to enhance performance (qualitative improvement).

Dynamic power can be increased either by improving the capacity to develop a higher level of force in the same period of time or by developing the same amount of force over a shorter duration (ie, higher velocity).<sup>16</sup> Interestingly, F-V relationships have been demonstrated to be sensitive to the training modality (ie, focused on strength, power, or velocity) during single-joint<sup>17</sup> and multijoint movements such as squat jumps.<sup>18</sup> The most efficient way to enhance power output has been widely discussed in the literature, and one of the remaining questions could be summarized as follows: Should power training favor the force or velocity component?<sup>11,13,19,20</sup> Recently, a theoretical approach has been proposed to assess, for the same power-generating capacity, the optimal balance between force and velocity capacities to maximize performance.<sup>11</sup> The comparison of the actual F-V relationship with this theoretical optimal profile might help identify which component (ie, force or velocity) should

Caroline Giroux is with the French National Institute of Sport (INSEP), Research Department, Laboratory of Sport, Expertise and Performance EA7370, Paris, France; CETAPS UPRES EA3832, Faculty of Sports Sciences, University of Rouen, Mont Saint Aignan Cedex, France; and Laboratory BIOTN (Bioingénierie, Tissus et Neuroplasticité) EA7377, University of Paris-Est, UPEC, Créteil, France. Giuseppe Rabita and Gaël Guilhem are with the French National Institute of Sport (INSEP), Research Department, Laboratory of Sport, Expertise and Performance EA7370, Paris, France. Didier Chollet is with CETAPS UPRES EA3832, Faculty of Sports Sciences, University of Rouen, Mont Saint Aignan Cedex, France. Address author correspondence to Caroline Giroux at [caroline.giroux@insep.fr](mailto:caroline.giroux@insep.fr).



# Salivary Hormones Response to Preparation and Pre-competitive Training of World-class Level Athletes

Gaël Guilhem<sup>1\*</sup>, Christine Hanon<sup>1</sup>, Nicolas Gendreau<sup>1</sup>, Dominique Bonneau<sup>1,2</sup>, Arnaud Guével<sup>3</sup> and Mounir Chennaoui<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Laboratory Sport, Expertise and Performance (EA 7370), Research Department, French National Institute of Sport (INSEP), Paris, France, <sup>2</sup> Fatigue and Vigilance Unit (EA 7330), Neurosciences and Operational Constraints Department, French Armed Forces Biomedical Research Institute (IRBA), Paris Descartes University, Brétigny-sur-Orge, France, <sup>3</sup> Laboratory "Movement, Interactions, Performance" (EA 4334), University of Nantes, Nantes, France

## OPEN ACCESS

### Edited by:

Vincent Pialoux,  
Université Claude Bernard Lyon 1,  
France

### Reviewed by:

Robert Hester,  
The University of Mississippi, USA  
Tadej Debevec,  
Jozef Stefan Institute, Slovenia

### \*Correspondence:

Gaël Guilhem  
gael.guilhem@insep.fr

### Specialty section:

This article was submitted to  
Exercise Physiology,  
a section of the journal  
*Frontiers in Physiology*

Received: 21 September 2015

Accepted: 02 November 2015

Published: 16 November 2015

### Citation:

Guilhem G, Hanon C, Gendreau N, Bonneau D, Guével A and Chennaoui M (2015) Salivary Hormones Response to Preparation and Pre-competitive Training of World-class Level Athletes. *Front. Physiol.* 6:333.  
doi: 10.3389/fphys.2015.00333

This study aimed to compare the response of salivary hormones of track and field athletes induced by preparation and pre-competitive training periods in an attempt to comment on the physiological effects consistent with the responses of each of the proteins measured. Salivary testosterone, cortisol, alpha-amylase, immunoglobulin A (IgA), chromogranin A, blood creatine kinase activity, and profile of mood state were assessed at rest in 24 world-class level athletes during preparation (3 times in 3 months) and pre-competitive (5 times in 5 weeks) training periods. Total mood disturbance and fatigue perception were reduced, while IgA (+61%) and creatine kinase activity (+43%) increased, and chromogranin A decreased (−27%) during pre-competitive compared to preparation period. A significant increase in salivary testosterone (+9 to +15%) and a decrease in testosterone/cortisol ratio were associated with a progressive reduction in training load during pre-competitive period ( $P < 0.05$ ). None of the psycho-physiological parameters were significantly correlated to training load during the pre-competitive period. Results showed a lower adrenocortical response and autonomic activity, and an improvement of immunity status, in response to the reduction in training load and fatigue, without significant correlations of salivary hormones with training load. Our findings suggest that saliva composition is sensitive to training contents (season period) but could not be related to workload resulting from track and field athletics training.

**Keywords:** alpha-amylase, immunoglobulin A, chromogranin A, creatine kinase, athletics training

## INTRODUCTION

During the last few decades, the exponential increase in international competition has progressively led the top-level athletes to extend the time spent to train in order to enhance their performance. Although successful training must involve such high training load phases (i.e., increased volume and intensity), it must also avoid the combination of excessive overload and inadequate recovery (Meeusen et al., 2006). Indeed, a disrupted balance between training stress and rest period following exercise can increase fatigue associated with short-term withdrawal of performance capacity, defined as functional “overreaching” syndrome (Meeusen et al., 2006). When intensive training is maintained, overreaching might evolve to a non-functional overreaching state determined by “qualitative” changes (i.e., symptoms of psychological and/or endocrine distress), which necessitate

## How 100-m event analyses improve our understanding of world-class men's and women's sprint performance

J. Slawinski<sup>1</sup>, N. Termoz<sup>1</sup>, G. Rabita<sup>2</sup>, G. Guilhem<sup>2</sup>, S. Dorel<sup>3</sup>, J.-B. Morin<sup>4</sup>, P. Samozino<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Research Centre on Sport and Movement (CeSERM) – EA 2931, UFRSTAPS – University of Paris Ouest Nanterre la Défense, Paris, France, <sup>2</sup>French National Institute of Sport (INSEP), Research Department, Laboratory Sport, Expertise and Performance (EA 7370), Paris, France, <sup>3</sup>Laboratory "Motricité, Interactions, Performance" (EA 4334), University of Nantes, Nantes, France, <sup>4</sup>Laboratory of Human Motricity, Education Sport and Health (EA6312), University of Nice Sophia Antipolis, Nice, France, <sup>5</sup>Laboratory of Exercise Physiology (EA4338), University Savoie Mont Blanc, Le Bourget duLac, France

Corresponding author: Jean Slawinski, Research Centre on Sport and Movement (CeSERM) – UFRSTAPS, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, UFRSTAPS, 200 Svenue de la République, 92000 Nanterre, France. Tel.: +33 1 40 97 56 30, E-mail: jslawinski@u-paris10.fr

Accepted for publication 28 October 2015

This study aimed to compare the force ( $F$ )–velocity ( $v$ )–power ( $P$ )–time ( $t$ ) relationships of female and male world-class sprinters. A total of 100 distance–time curves (50 women and 50 men) were computed from international 100-m finals, to determine the acceleration and deceleration phases of each race: (a) mechanical variables describing the velocity, force, and power output; and (b)  $F$ – $P$ – $v$  relationships and associated maximal power output, theoretical force and velocity produced by each athlete ( $P_{\max}$ ,  $F_0$ , and  $V_0$ ). The results showed that the maximal sprint velocity ( $V_{\max}$ ) and mean power output (W/kg) developed over the entire 100 m strongly influenced 100-m

performance ( $r > -0.80$ ;  $P \leq 0.001$ ). With the exception of mean force (N/kg) developed during the acceleration phase or during the entire 100 m, all of the mechanical variables observed over the race were greater in men. Shorter acceleration and longer deceleration in women may explain both their lower  $V_{\max}$  and their greater decrease in velocity, and in turn their lower performance level, which can be explained by their higher  $V_0$  and its correlation with performance. This highlights the importance of the capability to keep applying horizontal force to the ground at high velocities.

The 100-m event is the flagship event in track and field competitions as it consecrates the fastest man or woman for a given time period and place. More generally, it represents an assessment of the extreme speed capabilities of human bipedal locomotion, and thereby constitutes an excellent basis for scientists to improve insights about the limits of human locomotion in terms of physiological, neural, and mechanical features, which is underscored by the numerous studies focused on 100-m performance from the early work of Hill (1927) to the recent studies about the last world record of Usain Bolt (Beneke & Taylor, 2010; Taylor & Beneke, 2012; Krzysztof & Mero, 2013; Di Prampero et al., 2015). The differences in performance between men and women have been widely studied over the last 40 years in running (Cheuvront et al., 2005; Seiler et al., 2007). These studies agreed on the fact that women tend to have less absolute muscle mass and smaller skeletons. During the 100-m race, these anthropometric differences could lead to differences in the capability to produce a large forward acceleration in order to

achieve maximal speed and/or differences in the ability to maintain this maximal speed until crossing the finish line – two factors that constitute the two main challenges of a 100-m sprint.

On one hand, the ability to produce high forward acceleration has been related to the capability to produce and apply high amounts of power output and external force at various velocities during sprint acceleration phase (Jaskólska et al., 1999; Morin et al., 2012; Morin et al., 2011; Rabita et al., 2015). This capability is well described by lower limb force ( $F$ )-velocity ( $v$ ) and power ( $P$ )-velocity ( $v$ ) relationships, and summarized through the theoretical maximal force ( $F_0$ ) and velocity ( $V_0$ ) as well as the associated maximal power output ( $P_{\max}$ ) that the lower limbs can develop (Dorel et al., 2010; Morin et al., 2010; Rabita et al., 2015; Samozino et al., 2015).

These different parameters of the  $F$ - $v$  relationships obtained during pedaling/cycling showed higher absolute power for men than for women (Vandewalle et al., 1985; Maud & Shultz, 1986; Murphy

# Muscle force loss and soreness subsequent to maximal eccentric contractions depend on the amount of fascicle strain *in vivo*

G. Guilhem,<sup>1</sup> V. Doguet,<sup>2</sup> H. Hauraix,<sup>2</sup> L. Lacourpaille,<sup>1,2</sup> M. Jubeau,<sup>2</sup> A. Nordez<sup>2</sup> and S. Dorel<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Laboratory Sport, Expertise and Performance (EA 7370), Research Department, French National Institute of Sport (INSEP), Paris, France

<sup>2</sup> Laboratory 'Movement, Interactions, Performance' (EA 4334), Faculty of Sport Sciences, University of Nantes, Nantes, France

Received 7 October 2015,  
revision requested 6 January  
2016,

accepted 9 January 2016

Correspondence: G. Guilhem,  
PhD, Laboratory Sport, Expertise  
and Performance (EA7370),  
Research Department, French  
National Institute of Sport  
(INSEP), 11, avenue du Tremblay,  
75012 Paris, France.  
E-mail: gael.guilhem@insep.fr

Gaël Guilhem and Valentin  
Doguet have contributed equally  
to this work.

## Abstract

**Aim:** Defining the origins of muscle injury has important rehabilitation and exercise applications. However, current knowledge of muscle damage mechanics in human remains unclear *in vivo*. This study aimed to determine the relationships between muscle–tendon unit mechanics during maximal eccentric contractions and the extent of subsequent functional impairments induced by muscle damage.

**Methods:** The length of the muscle–tendon unit, fascicles and tendinous tissues was continuously measured on the gastrocnemius medialis using ultrasonography, in time with torque, during 10 sets of 30 maximal eccentric contractions of plantar flexors at  $45^{\circ}\text{s}^{-1}$ , in seventeen participants.

**Results:** Muscle–tendon unit, fascicles and tendinous tissues were stretched up to  $4.44 \pm 0.33$  cm,  $2.31 \pm 0.64$  cm and  $1.92 \pm 0.61$  cm respectively. Fascicle stretch length, lengthening amplitude and negative fascicle work beyond slack length were significantly correlated with the force decrease 48 h post-exercise ( $r = 0.51$ ,  $0.47$  and  $0.68$ , respectively;  $P < 0.05$ ).

**Conclusions:** This study demonstrates that the strain applied to human muscle fibres during eccentric contractions strongly influences the magnitude of muscle damage *in vivo*. Achilles tendon compliance decreases the amount of strain, while architectural gear ratio may moderately contribute to attenuating muscle fascicle lengthening and hence muscle damage. Further studies are necessary to explore the impact of various types of task to fully understand the contribution of muscle–tendon interactions during active lengthening to muscle damage.

**Keywords** fascicle lengthening, muscle damage, shear wave elastography, ultrasonography.

Eccentric contractions are recognized as a major cause of cytoskeletal disruptions referred to as exercise-induced muscle damage (EIMD) (Clarkson & Hubal 2002, Guilhem *et al.* 2010). Although it is well documented that EIMD is associated with functional

impairments such as force loss, delayed inflammation, oedema and soreness (Friden & Lieber 2001, Paulsen *et al.* 2012, Guilhem *et al.* 2013), our understanding of the mechanical processes involved in the eccentric contractions that govern the extent of subsequent

## EFFECT OF DAMAGING EXERCISE ON ELECTROMECHANICAL DELAY

LILIAN LACOURPAILLE, PhD,<sup>1,2</sup> ANTOINE NORDEZ, PhD,<sup>2</sup> VALENTIN DOGUET, MSc,<sup>2</sup> FRANÇOIS HUG, PhD,<sup>2,3</sup> and GAËL GUILHEM, PhD<sup>1</sup>

<sup>1</sup>French National Institute of Sport, Research Department, Laboratory "Sport, Expertise and Performance," EA 7370, 11 avenue du Tremblay, 75012 Paris, France

<sup>2</sup>University of Nantes, Faculty of Sport Sciences, Laboratory "Movement, Interactions, Performance," EA 4334, Nantes, France

<sup>3</sup>The NHMRC Centre of Clinical Research Excellence in Spinal Pain, Injury and Health, School of Health and Rehabilitation Sciences, University of Queensland, Brisbane, Australia

Accepted 27 December 2015

**ABSTRACT:** *Introduction:* In this study we aimed to quantify the effect of exercise-induced muscle damage on both the electrochemical and mechanical components of electromechanical delay using very-high-frame-rate ultrasound. *Methods:* Fifteen participants underwent electrically evoked contractions of the medial gastrocnemius muscle with an ultrasound transducer on the muscle belly and on the myotendinous junction, before, 1 hour, and 48 hours after eccentric exercise of the plantar flexor muscles. *Results:* Maximal isometric plantar flexor torque was significantly lower at 1 hour ( $-41.1 \pm 14.9\%$ ;  $P = 0.0001$ ) and 48 hours ( $-11.9 \pm 14.9\%$ ;  $P = 0.038$ ) post-exercise compared with pre-exercise. However, the delay between electrical stimulation and the onset of muscle activation, the delay between electrical stimulation and myotendinous junction motion, and the electromechanical delay were not altered significantly by eccentric exercise ( $P = 0.063$ ). *Conclusions:* These findings suggest that moderate muscle damage does not affect the time for the electrochemical or mechanical components of electromechanical delay.

*Muscle Nerve* 54: 136–141, 2016

**U**naccustomed or repetitive eccentric contractions are recognized as a major cause of destructive changes in muscle ultrastructure.<sup>1,2</sup> It has been hypothesized that disruption of the muscle structures involved in force production and transmission, followed by activation of calcium-dependent degradative pathways (for review, see Warren *et al.*<sup>3</sup>), is the cause, but the exact mechanisms of muscle fiber microinjury are not fully understood. *In vitro* studies have demonstrated that muscle damage may impair excitation-contraction coupling immediately after eccentric contractions, with a slow recovery over the next 7 days.<sup>4</sup> At the same time, the time-courses of protein loss (contractile and cytoskeletal) and extracellular matrix disruption show non-significant changes immediately after exercise, followed by a peak value between 1 and 5 days later, depending on the marker

**Abbreviations:** 1H, 1 hour after exercise; 48H, 48 hours after exercise; ANOVA, analysis of variance; Dr, muscle delay; DOMS, delayed-onset muscle soreness; Dt, tendon delay; EMD, electromechanical delay; I<sub>max</sub>, intensity inducing the maximal plantar flexion force; MDC, minimally detectable change; MVC, maximal voluntary contraction; Pre, pre-exercise test session

**Key words:** eccentric contraction; excitation-contraction coupling; exercise; muscle damage; muscle force transmission; high-frame-rate ultrasound

**Correspondence to:** L. Lacourpaille; e-mail: lillian.lacourpaille@insep.fr

© 2016 Wiley Periodicals, Inc.  
Published online 20 January 2016 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI 10.1002/mus.25024

used.<sup>5–7</sup> These cytoskeletal alterations are classically considered to be the main contributors of strength loss after eccentric exercise.<sup>3,8</sup> However, to date, the consequences of excitation-contraction coupling failure and protein loss after eccentric exercise on the force-generating and/or -transmitting processes have not been investigated *in vivo*.

Electromechanical delay (EMD) corresponds to the time lag between the onset of muscle activation and force production<sup>9</sup> and is influenced by both electrochemical (synaptic transmission, excitation-contraction coupling) and mechanical processes (force transmission).<sup>9,10</sup> The relative contributions of both electrochemical and mechanical components have been quantified *in vivo* using very-high-frame-rate ultrasound<sup>10,11</sup> or mechanomyography.<sup>12,13</sup> More precisely, the delay between muscle electrical stimulation and the onset of muscle fascicle motion is mainly due to electrochemical processes.<sup>10</sup> The delay between the onset of fascicle motion and the onset of force production has been attributed to force transmission along the series-elastic components, which can be split into 2 parts (i.e., aponeurosis and tendon) by detecting the onset of myotendinous junction motion.<sup>10</sup> Using ultrafast ultrasound, Lacourpaille *et al.*<sup>14</sup> showed that patients with Duchenne muscular dystrophy exhibit a longer delay between the onset of muscle fascicle motion and force production compared with healthy, age-matched participants, suggesting altered muscle force transmission. Further characterization of the time required for production and transmission of muscle force could provide a better understanding of electrochemical and mechanical consequences of muscle damage. Thus, the aim of this study was to assess the effect of exercise-induced muscle damage on both the electrochemical and mechanical components of electromechanical delay in the medial gastrocnemius muscle. We used very-high-frame-rate ultrasound to determine the onset of both muscle fascicle and myotendinous junction motion during electrically evoked contractions. We hypothesized that: (1) EMD would be lengthened 1 hour after eccentric exercise, mainly because of a longer delay associated with electrochemical processes; and (2) both electromechanical



# Time-Course of Neuromuscular Changes during and after Maximal Eccentric Contractions

Valentin Doguet<sup>1</sup>, Marc Jubeau<sup>1\*</sup>, Sylvain Dorel<sup>1</sup>, Antoine Couturier<sup>2</sup>,  
Lilian Lacourpaille<sup>1,2</sup>, Arnaud Guével<sup>1</sup> and Gaël Guilhem<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Laboratory "Movement, Interactions, Performance" (EA 4334), Faculty of Sport Sciences, University of Nantes, Nantes, France, <sup>2</sup> Laboratory Sport, Expertise and Performance (EA 7370), Research Department, French Institute of Sport (INSEP), Paris, France

## OPEN ACCESS

### Edited by:

Johnny Padulo,  
University eCampus, Italy

### Reviewed by:

Antonio Dello Iacono,  
The Zinman College of Physical  
Education and Sport Sciences at the  
Wingate Institute, Israel  
Igor Jelaska,  
University of Split, Croatia

### \*Correspondence:

Marc Jubeau  
marc.jubeau@univ-nantes.fr

### Specialty section:

This article was submitted to  
Exercise Physiology,  
a section of the journal  
Frontiers in Physiology

Received: 15 March 2016

Accepted: 29 March 2016

Published: 18 April 2016

### Citation:

Doguet V, Jubeau M, Dorel S, Couturier A, Lacourpaille L, Guével A and Guilhem G (2016) Time-Course of Neuromuscular Changes during and after Maximal Eccentric Contractions.  
*Front. Physiol.* 7:137.

doi: 10.3389/fphys.2016.00137

This study tested the relationship between the magnitude of muscle damage and both central and peripheral modulations during and after eccentric contractions of plantar flexors. Eleven participants performed 10 sets of 30 maximal eccentric contractions of the plantar flexors at  $45^{\circ}\cdot s^{-1}$ . Maximal voluntary torque, evoked torque (peripheral component) and voluntary activation (central component) were assessed before, during, immediately after (POST) and 48 h after (48 h) the eccentric exercise. Voluntary eccentric torque progressively decreased (up to  $-36\%$ ) concomitantly to a significant alteration of evoked torque (up to  $-34\%$ ) and voluntary activation (up to  $-13\%$ ) during the exercise. Voluntary isometric torque ( $-48 \pm 7\%$ ), evoked torque ( $-41 \pm 14\%$ ) and voluntary activation ( $-13 \pm 11\%$ ) decreased at POST, but only voluntary isometric torque ( $-19 \pm 6\%$ ) and evoked torque ( $-10 \pm 18\%$ ) remained depressed at 48 h. Neither changes in voluntary activation nor evoked torque during the exercise were related to the magnitude of muscle damage markers, but the evoked torque decrement at 48 h was significantly correlated with the changes in voluntary activation ( $r = -0.71$ ) and evoked torque ( $r = 0.77$ ) at POST. Our findings show that neuromuscular responses observed during eccentric contractions were not associated with muscle damage. Conversely, central and peripheral impairments observed immediately after the exercise reflect the long-lasting reduction in force-generating capacity.

**Keywords:** central activation ratio, voluntary activation level, evoked torque, plantar flexors, muscle damage

## INTRODUCTION

Eccentric contraction represents a motor action whereby the muscle-tendon unit is forcibly lengthened while the muscle is activated. Such contractions have been recognized to generate greater torque than isometric or concentric modes (Kellis and Baltzopoulos, 1995), thanks to a large contribution of passive structures (Herzog, 2014). In parallel, compared with concentric and isometric contractions, lower surface electromyographic (EMG) activity and voluntary activation have been reported during eccentric contractions (Westing et al., 1991; Babault et al., 2001). This non-maximal motor unit recruitment showed evidences of an unique neural strategy during eccentric contractions (Enoka, 1996), arising from spinal (e.g., facilitation of pre- and post-synaptic inhibitions), and supra-spinal (e.g., cortical excitability enhancement) components (see Duchateau and Baudry, 2014 for a review). Further, it is well-established that unaccustomed or repetitive

## **Influence of isoinertial-pneumatic mixed resistances on force-velocity relationship**

Type of Article: ORIGINAL INVESTIGATION

Simon AVRILLON<sup>1</sup>, Boris JIDOVTSIEFF<sup>2</sup>, François HUG<sup>3</sup>, Gaël GUILHEM<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> French Institute of Sport (INSEP), Research Department, Laboratory Sport, Expertise and Performance (EA 7370) Paris, France

<sup>2</sup> University of Liège, Department of Sport and Rehabilitation Sciences, Liège, Belgium

<sup>3</sup> University of Nantes, Faculty of Sport Sciences, Laboratory Movement, Interactions, Performance (EA 4334), Nantes, France

### **\*Correspondence and reprints:**

Gaël Guilhem, PhD  
Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance  
Département de la Recherche  
Laboratoire Sport, Expertise et Performance (EA 7370)  
11, avenue du Tremblay  
75012 Paris  
France  
Tel: +33 (0)1 41 74 43 36  
Fax: +33 (0)1 41 75 45 35  
e-mail: gael.guilhem@insep.fr

**Preferred running-head: MIXED RESISTANCES TO MODULATE POWER OUTPUT**

**Word count for abstract: 250**

**Word count for main text: 3500**

**Figures: 4**

# Neuromuscular Changes and Damage after Isoload versus Isokinetic Eccentric Exercise

AQ1 VALENTIN DOGUET<sup>1</sup>, KAZUNORI NOSAKA<sup>2</sup>, MATHIEU PLAUTARD<sup>1</sup>, RAPHAËL GROSS<sup>3</sup>, GAËL GUILHEM<sup>4</sup>, ARNAUD GUÉVEL<sup>1</sup>, and MARC JUBEAU<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Laboratory “Movement, Interactions, Performance” (EA 4334), Faculty of Sport Sciences, University of Nantes, Nantes, FRANCE; <sup>2</sup>Centre for Exercise and Sports Science Research, School of Medical and Health Sciences, Edith Cowan University, Joondalup, WA, AUSTRALIA; <sup>3</sup>Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Nantes University Hospital, Saint-Jacques Hospital, Nantes, FRANCE; and <sup>4</sup>Research Department, Laboratory Sport, Expertise and Performance, French National Institute of Sport (INSEP), Paris EA 7370, FRANCE

## ABSTRACT

DOGUET, V., K. NOSAKA, M. PLAUTARD, R. GROSS, G. GUILHEM, A. GUÉVEL, and M. JUBEAU. Neuromuscular Changes and Damage after Isoload versus Isokinetic Eccentric Exercise. *Med. Sci. Sports Exerc.*, Vol. 48, No. 12, pp. 00–00, 2016. **Purpose:** This study compared the effects of isoload (IL) and isokinetic (IK) knee extensor eccentric exercises on changes in muscle damage and neuromuscular parameters to test the hypothesis that the changes would be different after IL and IK exercises. **Methods:** Twenty-two young men were paired based on their strength and placed on the IL ( $N=11$ ) or the IK ( $N=11$ ) group. The IL group performed 15 sets of 10 eccentric contractions with a 150% of predetermined one-repetition maximum load. The IK group performed 15 sets of several maximal eccentric contractions matched set by set for the total amount of work and mean angular velocity with the IL group. Muscle damage markers (voluntary isometric peak torque, muscle soreness, and creatine kinase activity) and neuromuscular variables (e.g., voluntary activation, H-reflex, M-wave, and evoked torque) were measured before, immediately after, and 24, 48, 72, and 96 h postexercise. **Results:** Voluntary isometric peak torque decreased to the same extent ( $P=0.94$ ) in both groups immediately after (IL =  $-40.6\% \pm 13.8\%$  vs IK =  $-42.4\% \pm 10.2\%$ ) to 96 h after the exercise (IL =  $-21.8\% \pm 28.5\%$  vs IK =  $-26.7\% \pm 23.5\%$ ). Neither peak muscle soreness (IL =  $48.1 \pm 28.2$  mm vs IK =  $54.7 \pm 28.9$  mm,  $P=0.57$ ) nor creatine kinase activity (IL =  $12811 \pm 22654$  U·L $^{-1}$  vs IK =  $15304 \pm 24739$  U·L $^{-1}$ ,  $P=0.59$ ) significantly differed between groups. H-reflex (IL =  $-23\%$  vs IK =  $-35\%$ ) and M-wave (IL =  $-10\%$  vs IK =  $-17\%$ ) significantly decreased immediately postexercise similarly between groups. **Conclusion:** The changes in muscle damage and neuromuscular function after the exercise are similar between IL and IK, suggesting that resistance modality has little effects on acute muscle responses. **Key Words:** RESISTANCE MODALITY, FATIGUE, H-REFLEX, VOLUNTARY ACTIVATION, MUSCLE SORENESS

Performing unaccustomed high-intensity eccentric contractions leads to muscle damage characterized by prolonged loss of muscle function, delayed-onset muscle soreness, and increases in muscle proteins in the blood (3,27,30,36). *In vitro* observations stated that the sarcomeres overstretching, or more accurately the nonuniform sarcomeres lengthening during eccentric contractions, would be the main underpinning mechanism of muscle damage (24,26). Several studies demonstrated *in vivo* that the magnitude of fascicle (or muscle) lengthening was associated

with muscle damage symptoms (14,20,28,31). For instance, Guilhem et al. (14) reported a significant positive correlation between the magnitude of gastrocnemius medialis fascicle stretch during maximal eccentric plantarflexions and the decrease in voluntary strength at 2 d postexercise; the greater the fascicle stretching, the greater the long-lasting strength loss. The authors also showed that the long-lasting strength loss was strongly related to the amount of torque generated beyond the optimal fascicle length during eccentric contractions (14). This finding supported the statement that mechanical work dissipated by sarcomeres was one of the main factors of eccentric exercise-induced muscle damage (5).

Guilhem et al. (13) recorded torque and vastus lateralis fascicle length simultaneously during standardized (i.e., in terms of amount of work and angular velocity) isoload (IL) and isokinetic (IK) maximal eccentric contractions of the knee extensors. They found a greater torque production at long muscle lengths during IK, without any differences in fascicle length changes between IL and IK. These results suggest that the magnitude of muscle damage could be greater after IK eccentric contractions because of a greater mechanical stress (i.e., torque production) at long muscle lengths. Alemany et al. (1)

Address for correspondence: Marc Jubeau, Ph.D., Laboratory “Movement, Interactions, Performance” (EA 4334), Faculty of Sport Sciences, University of Nantes, 25 bis Boulevard Guy Mollet, Nantes 44322, France; E-mail: marc.jubeau@univ-nantes.fr.

Submitted for publication February 2016.

Accepted for publication July 2016.

0195-9131/16/4812-0000/0

MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE®

Copyright © 2016 by the American College of Sports Medicine


DOI: 10.1249/MSS.0000000000001042



## SPECIFIC JOINT ANGLE DEPENDENCY OF VOLUNTARY ACTIVATION DURING ECCENTRIC KNEE EXTENSIONS

Journal:	<i>Muscle and Nerve</i>
Manuscript ID	MUS-16-0556.R3
Wiley - Manuscript type:	Research Article
Date Submitted by the Author:	07-Oct-2016
Complete List of Authors:	Doguet, Valentin; University of Nantes, Laboratory "Movement, Interactions, Performance" Rivière, Valentin; University of Nantes, Laboratory "Movement, Interactions, Performance" Guevel, Arnaud; University of Nantes, Laboratory "Movement, Interactions, Performance" Guilhem, Gael ; French National Institute of Sport (INSEP), Laboratory "Sport, Expertise and Performance" Chauvet, Lucile; University of Nantes, Laboratory "Movement, Interactions, Performance" Jubeau, Marc; University of Nantes, Laboratory "Movement, Interactions, Performance"
Keywords:	Central activation ratio, Isometric, Muscle length, Negative work, Positive work, Maximal contractions

SCHOLARONE™  
Manuscripts



## Comparison of Two Methodological Approaches for the Mechanical Analysis of Isoinertial Single-Joint Movement

Journal:	<i>Sports Biomechanics</i>
Manuscript ID	RSPB-2016-0110
Manuscript Type:	Method and Theoretical Perspective
Date Submitted by the Author:	25-May-2016
Complete List of Authors:	PLAUTARD, Mathieu; University of Nantes, Faculty of Sport Sciences - Laboratory "Motricity, Interactions, Performance" (EA 4334) GUILHEM, Gaël; French National Institute of Sport (INSEP), Research Department - Laboratory Sport, Expertise and Performance (EA 7370) FOHANNO, Vincent; Qualisys AB, Nordez, Antoine; University of Nantes, Faculty of Sport Sciences - Laboratory "Motricity, Interactions, Performance" (EA 4334) CORNUT, Christophe; University of Nantes, Faculty of Sport Sciences - Laboratory "Motricity, Interactions, Performance" (EA 4334) GUÉVEL, Arnaud; University of Nantes, Faculty of Sport Sciences - Laboratory "Motricity, Interactions, Performance" (EA 4334)
Keywords:	torque, angular velocity, leg extension, kinematic, isokinetic dynamometer

SCHOLARONE™  
Manuscripts

# Muscle fascicle shortening behaviour of vastus lateralis during a maximal force–velocity test

Hugo Hauraix<sup>1</sup> · Sylvain Dorel<sup>1</sup> · Giuseppe Rabita<sup>2</sup> · Gaël Guilhem<sup>2</sup> · Antoine Nordez<sup>1</sup>

Received: 21 June 2016 / Accepted: 19 December 2016  
 © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017

## Abstract

**Purpose** Muscle fascicles–tendon interactions are the main determinant in production of high joint velocity. Currently, no study has investigated the muscle fascicles behaviour of knee extensor muscles until the highest reachable velocity (e.g., unloaded knee extension). We aimed to track the changes in vastus lateralis fascicles length during knee extensions to quantify muscle fascicles and tendinous tissues contributions to muscle–tendon unit shortening and to determine maximal muscle fascicles shortening velocity.

**Methods** Fifteen participants performed isokinetic and isoinertial knee extensions, and ultrafast ultrasound imaging was used to observe the vastus lateralis fascicles from low to very high joint velocity.

**Results** The muscle fascicles shortening velocity increased linearly with the increase in knee joint velocity up to the maximal joint velocity (mean  $R^2 = 0.93 \pm 0.08$ ). Muscle fascicles contribution to muscle–tendon unit shortening velocity was almost constant regardless of the condition ( $83 \pm 23\%$ ). Using Hill's equation, the maximal velocity of knee joint and muscle fascicles was determined at  $1000 \pm 489^\circ\text{s}^{-1}$  and  $5.1 \pm 2.0 \text{ L}_0 \text{ s}^{-1}$  ( $47.4 \pm 18.7 \text{ cm s}^{-1}$ ), respectively.

**Conclusions** Contribution of muscle fascicles to the muscle–tendon unit shortening velocity was much higher for the vastus lateralis in this study compared to the gastrocnemius

medialis in two previous studies. Moreover, this contribution of muscle fascicles shortening velocity was constant whatever the velocity condition, even at the highest reachable velocity. Thus, the vastus lateralis fascicles shortening velocity increases linearly with the knee joint velocity until high velocities and its behaviour strongly accorded with the classical Hill's force–velocity relationship.

**Keywords** Force–velocity relationship · Ultrafast ultrasound · Fascicles–tendon interactions · High velocity · Knee extension

## Abbreviations

ANOVA	Analysis of variance
$L_0$	Optimal length

## Introduction

Mechanical interactions between muscle fascicles and tendinous tissues (i.e., tendon and aponeurosis) contribute to efficient movements (Ettema et al. 1990). These interactions have been well described in animal (Astley and Roberts 2012; Biewener and Baudinette 1995; Wilson et al. 2003) and human locomotion (e.g., walking and running; Cronin and Lichtwark 2013; Cronin et al. 2013; Fukunaga et al. 2001; Ishikawa et al. 2007; Lichtwark et al. 2007). During exercises involving stretch–shortening cycles, these interactions have been demonstrated to enhance the work produced by the muscle–tendon unit (Ishikawa and Komi 2004; Kawakami et al. 2002; Finni et al. 2001), to improve the efficiency (Lichtwark and Barclay 2010) and to reduce muscle fibre elongation during the eccentric phase, thereby limiting the risk of strain induced injury (Guilhem et al. 2016; Konow et al. 2012).

✉ Sylvain Dorel  
 sylvain.dorel@univ-nantes.fr

<sup>1</sup> Laboratory "Movement, Interactions, Performance" (EA 4334), Faculty of Sport Sciences, University of Nantes, 25 bis Boulevard Guy Mollet, BP 72206, 44322 Nantes Cedex 3, France

<sup>2</sup> Laboratory Sport, Expertise and Performance (EA 7370), Research Department, French Institute of Sport (INSEP), Paris, France

## Differences in trunk and thigh muscle strength, endurance and thickness between elite sailors and non-sailors

Bernd Friesenbichler<sup>a</sup>, Julia F. Item-Glatthorn<sup>a</sup>, Fabian Neunstöcklin<sup>b</sup>, Nicola C. Casartelli<sup>a</sup>, Gaël Guilhem<sup>c</sup> and Nicola A. Maffiuletti<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Human Performance Lab, Schulthess Clinic, Zurich, Switzerland; <sup>b</sup>Department of Performance Diagnostics, Schulthess Clinic, Zurich, Switzerland; <sup>c</sup>Research Department, Laboratory Sport, Expertise and Performance, French National Institute of Sport, Paris, France

### ABSTRACT

Dinghy sailors lean their upper body over the windward side of the boat ('hiking') to keep the boat's balance and maximise its speed. Sustaining the hiking position is essential for competitive performance and this study examined sport-specific differences of muscles relevant for hiking in elite sailors. Knee extensor muscle strength as well as trunk muscle strength, muscle endurance and muscle thickness were assessed in elite dinghy sailors ( $n = 15$ ) and compared to matched, non-sailing controls ( $n = 15$ ). Isometric extensor strength was significantly higher in sailors at  $60^\circ$  (+14%) but not at  $20^\circ$  knee flexion. Sailors showed significantly higher trunk flexor (but not extensor) strength under isometric (+18%) and eccentric (+11%) conditions, which was associated to greater muscle thickness (rectus abdominis +40%; external oblique +26%) and higher endurance for ventral (+66%) and lateral (+61%) muscle chains compared to non-sailors. Greater muscles thickness and the particular biomechanical requirements to maintain the hiking position may drive the increases in isometric and eccentric muscle strength as well as ventral and lateral trunk endurance. The current findings identified sport-specific muscle function differences and provide performance benchmarks for muscle strength and endurance in elite sailors.

### ARTICLE HISTORY

Received 27 May 2016  
Accepted 8 December 2016

### KEY WORDS

Sailing; strength; hiking;  
endurance; muscle thickness

## Introduction

Dinghy sailing can be hard physical work, depending on wind conditions, crew position and competitive level (Bojsen-Møller, Larsson, Magnusson, & Aagaard, 2007; Larsson et al., 1996; Niinimaa, Wright, Shephard, & Clarke, 1977). In moderate and high wind conditions, dinghy sailors adapt the 'hiking' position by leaning the upper body over the windward side of the boat (Figure 1).

This position prevents the boat from tipping over and concomitantly maximises lift force and thus boat speed (Castagna & Brisswalter, 2007). Hiking requires prolonged isometric thigh and trunk muscle contractions, including small amplitude flexion and extension movements. These movements allow to adjust the hiking position to time-varying environmental influences, such as wind gusts and waves (Mackie, Sanders, & Legg, 1999).

# Effects of warm-up on hamstring muscles stiffness: Cycling vs foam rolling

A. J. Morales-Artacho<sup>1,2</sup> | L. Lacourpaille<sup>1,3</sup> | G. Guilhem<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Laboratory “Sport, Expertise and Performance” (EA 7370), Research Department, French Institute of Sport (INSEP), Paris, France

<sup>2</sup>Department of Physical Education and Sport, Faculty of Sport Sciences, University of Granada, Granada, Spain

<sup>3</sup>Laboratory “Movement, Interactions, Performance” (EA 4334), Faculty of Sport Sciences, University of Nantes, Nantes, France

## Correspondence

Gaël Guilhem, Département de la Recherche, Laboratoire Sport, Expertise et Performance (EA 7370), Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, Paris, France  
Email: gael.guilhem@insep.fr

## Funding information

AJ Morales-Artacho was supported by a scholarship funded by the Spanish Ministry of Science and Education (FPU 13/04801).

This study investigated the effects of active and/or passive warm-up tasks on the hamstring muscles stiffness through elastography and passive torque measurements. On separate occasions, fourteen males randomly completed four warm-up protocols comprising Control, Cycling, Foam rolling, or Cycling plus Foam rolling (Mixed). The stiffness of the hamstring muscles was assessed through shear wave elastography, along with the passive torque-angle relationship and maximal range of motion (ROM) before, 5, and 30 minutes after each experimental condition. At 5 minutes, Cycling and Mixed decreased shear modulus ( $-10.3\% \pm 5.9\%$  and  $-7.7\% \pm 8.4\%$ , respectively;  $P \leq .0003$ , effect size [ES]  $\geq 0.24$ ) and passive torque ( $-7.17\% \pm 8.6\%$  and  $-6.2\% \pm 7.5\%$ , respectively;  $P \leq .051$ , ES  $\geq 0.28$ ), and increased ROM ( $+2.9\% \pm 2.9\%$  and  $+3.2\% \pm 3.5\%$ , respectively;  $P \leq .001$ , ES  $\geq 0.30$ ); 30 minutes following Mixed, shear modulus ( $P = .001$ , ES = 0.21) and passive torque ( $P \leq .068$ , ES  $\geq 0.2$ ) were still slightly decreased, while ROM increased ( $P = .046$ , ES = 0.24). Foam rolling induced “small” immediate short-term decreases in shear modulus ( $-5.4\% \pm 5.7\%$  at 5 minutes;  $P = .05$ , ES = 0.21), without meaningful changes in passive torque or ROM at any time point ( $P \geq .12$ , ES  $\leq 0.23$ ). These results suggest that the combined warm-up elicited no acute superior effects on muscle stiffness compared with cycling, providing evidence for the key role of active warm-up to reduce muscle stiffness. The time between warm-up and competition should be considered when optimizing the effects on muscle stiffness.

## KEY WORDS

active warm-up, elastography, passive torque, passive warm-up, risk of muscle injuries

## 1 | INTRODUCTION

Warm-up routines have usually been performed to prepare the body for subsequent specific exercises. Growing evidence is elucidating some of the physiological mechanisms responsible for warm-up effects on muscle performance and injury prevention.<sup>1</sup> Specifically, active (eg, cycling, stretching) and/or passive (eg, passive stretching, foam rolling) warm-up tasks have been shown to acutely increase maximal range of motion (ROM)<sup>2–5</sup> and to decrease muscle stiffness.<sup>6,7</sup> These positive effects are likely attributed to an increase in muscle temperature after an active warm-up<sup>8</sup> and an alteration in the

viscoelastic and thixotropic properties of muscle following passive warm-up tasks (ie, passive movement, massage, foam rolling).<sup>6,9,10</sup> Sport disciplines involving large movement amplitude in which resistive forces contribute to muscle performance (ie, gymnastics, combat sports) may benefit from larger ROM and lower muscle stiffness.<sup>12</sup> Moreover, the fact that ROM<sup>11</sup> and muscle stiffness<sup>12</sup> may be related to muscle strain injury incidence encourages the search for optimal warm-up strategies to minimize the risk of injury. Warm-up strategies that are likely to increase energy absorption capacity would allow the muscle-tendon unit to sustain more external strain, leaving muscle fibers less prone to damage.<sup>13</sup>



## Cryotherapy induces an increase in muscle stiffness

Journal:	<i>Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports</i>
Manuscript ID	SJMSS-O-483-16.R2
Manuscript Type:	Original Article
Date Submitted by the Author:	24-Feb-2017
Complete List of Authors:	Point, Maxime; French Institute of Sport, Research Department, Laboratory "Sport, Expertise and Performance" (EA 7370) Guilhem, Gaël; Institut National du Sport et de l'Education Physique, Research department Hug, François; University of Nantes, Laboratory Motricity, Interactions, Performance, EA 4334 Nordez, Antoine; University of Nantes, "Motricité, Interactions, Performance" (EA 4334), UFR STAPS; Frey, Alain; French Institute of Sport, Medical Department Lacourpaille, Lilian; University of Nantes, Faculty of Sport Sciences, Laboratory "Movement, Interactions, Performance" (EA 4334)
Keywords:	Muscle temperature, supersonic shear imaging, shear modulus, elastography, cooling, ultrasound

SCHOLARONE™  
Manuscripts